

1998



Parc naturel régional de Corse

# Travaux Scientifiques

n° 58



Parc Naturel Régional de Corse  
et  
Réserves Naturelles



TRAVAUX SCIENTIFIQUES DU PARC NATUREL  
REGIONAL DE CORSE  
N° 58

SOMMAIRE

|   |         |
|---|---------|
| -FAGGIO (G.), ROSSI (T.), CANTERA (J.P.): Migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse (Saisons 1994, 1995 et 1996).....                         | 1-58    |
| -FAGGIO (G.), ROSSI (T.): Migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse (Saison 1997).....  | 59-84   |
| -BONACCORSI (G.): Notes au sujet d'un passage pré-nuptial exceptionnel d'anatidés à Capitello et Campo dell'oro de février à avril 1996.....            | 85-90   |
| -PASQUET (E.), THIBAUT (J.C.): Le Venturon de Corse : Quel statut lui conférer?.....  | 91-103  |
| -SEGUIN (J.F.), VIDAL (P.): Données préliminaires sur la répartition et l'effectif de l'Autour des Palombes ( <i>Accipiter gentilis</i> ) en Corse..... | 105-112 |
| -BONACCORSI (G.): Complément à l'avifaune de la basse vallée de la Gravona et du Prunelli.....  | 113-142 |
| -BONACCORSI (G.): Nouveau complément à l'avifaune de la basse vallée de la Gravona.....   | 143-172 |

Les articles publiés dans la revue sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

Photo de couverture : le Balbuzard

Dépôt légal : 4<sup>ème</sup> trimestre 1998



**LA MIGRATION PRINTANIERE  
DES OISEAUX DANS LE CAP CORSE**

**Barcaggio - Ersa, Rogliano  
(Haute Corse)**

**Saisons 1994, 1995 et 1996**

**Par Gilles FAGGIO \*, Tony ROSSI \* et Jean Pierre CANTERA \*\***

*Avec la participation de*  
**Gilles Bonaccorsi,  
Jean-Louis Clavier,  
Nanou Faggio,  
Stéphane Jouaire,  
Cécile Jolin,  
Bernard Recorbet,  
et Jean-Claude Thibault.**

**\* Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse  
(Groupe Ornithologique de Corse ; Conservatoire Régional des Sites de Corse)**

**\*\* Centre Régional de Bagnage de la Corse  
(Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux - CRBPO - ; Muséum National d'Histoire  
Naturelle de Paris)**

**- Résidence Pietramarina, Toga - 20200 BASTIA (Tel/Fax. 04 95 32 71 63)**

**7 536 bagues et 545 fiches de baguage,  
36 kg de pâtes et 22 kg de riz,  
45 tablettes de chocolat (au moins !),  
90 bouteilles de vin et autres spiritueux,  
etc ...  
ont été nécessaire à la réalisation  
de cette grande aventure au cours des trois  
saisons.**

**LA MIGRATION PRINTANIERE  
DES OISEAUX DANS LE CAP CORSE  
Barcaggio - Haute Corse (Ersa, Rogliano)  
saisons 1994, 1995 et 1996**

## Sommaire

**Introduction**

**Déroulement du camp de baguage**

**Participants**

**Liste systématique commentée des espèces observées ou capturées**  
(nombre d'espèces entre parenthèses)

**Non passereaux :**

- Grèbes, puffins, fou et cormorans (6)
- Grands échassiers (10)
- Anatidés (5)
- Rapaces diurnes (19)
- Gallinacés (2)
- Rallidés (5)
- Grue (1)
- Limicoles (24)
- Mouettes et Goélands (3)
- Pigeon, tourterelles et coucou (5)
- Rapaces nocturnes (3)
- Engoulevent, martinets, guêpier, rollier, huppe, torcol (8)

**Passereaux :**

- Alouettes (5)
- Hirondelles (5)
- Pipits, bergeronnettes et Troglodyte (9)
- Turdidés (14)
- Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets (21)
- Gobemouches (3)
- Mésanges et espèces voisines (4)
- Loriot et Pies-gieches (3)
- Corvidés (5)
- Moineaux et Fringilles (8)
- Grosbec et Bruants (4)
- Espèce exotique (1)

**Bilan des poses de bagues par espèce et par jour**

**Renseignements sur le programme "Piccole Isola"**

**Déroulement de la migration en 1994, 1995 et 1996 à Barcaggio**

**Variation du nombre de captures 1991-1996**

**Conclusion**

**Annexe 1 : Informations récentes sur les reprises d'oiseaux bagués**

**Annexe 2 : Références des publications sur la migration des oiseaux dans le Cap Corse**

## Introduction

Initié en 1979, le camp de baguage de Barcaggio a fêté ses quinzième, seizième et dix-septième éditions (pas de séjour en 1985). Il est coordonné par le Groupe Ornithologique de Corse (Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse - Conservatoire Régional des Sites de Corse) dans le but d'étudier la migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse à partir d'observations et de captures d'oiseaux aux filets (ou autres pièges).

## Déroulement du camp de baguage


Le recueil des données sur le terrain (bagueage et observation), leur traitement - notamment leur transmission et leur retranscription à l'"Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" de Bologna (INFS) et au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux de Paris (CRBPO) sur des bordereaux différents -, et la rédaction du rapport reposent en grande partie sur le bénévolat des participants, que nous tenons à remercier.


En 1995 et 1996, la Station Ornithologique n'a pu être utilisée pour des raisons de sécurité, le doublage extérieur des murs, constitué de pierres, menaçant ruine par endroits. Une restauration devra être entreprise prochainement. Des aménagements complémentaires devraient également être réalisés (coin toilette, cheminée, fosse septique,...) grâce au concours financier de la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) et l'Office de l'Environnement de la Corse.

L'hébergement des participants au camp en 1995 et 1996, s'est donc effectué dans une maison du village, louée pour un mois aux frais de l'association.

## Rappels sur le programme "Piccole Isole"

En 1991, le camp s'inscrivait pour la première fois dans un programme international de recherche sur la migration printanière des oiseaux en Méditerranée occidentale, lui même initié en 1988. Elaboré par l'"Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" (INFS) de Bologna (Italie), le programme a réuni 25 stations insulaires et côtières de 1994 à 1996 et 34 depuis 1988 (18 en 1994, 14 en 1995 et 16 en 1996 - voir carte n° 1) en Italie (côte et îles), en Espagne (côte et Baleares), en France (la station Ornithologique de Barcaggio est pour l'instant la seule à participer à ce programme), au Maroc et l'île de Malta. Sur l'ensemble de ces stations, 309 ornithologues ont participé au programme en 1994, 255 en 1995 et 316 en 1996. Ces personnes ont bagué 48.368 oiseaux de 149 espèces différentes en 1994, 40.641 oiseaux de 134 espèces différentes en 1995, et 55.999 oiseaux de 150 espèces différentes en 1996. Ces données représentent 341.468 oiseaux bagués de 206 espèces différentes depuis 1988, date d'initialisation du programme (298.082 pour les stations insulaires, 43.386 pour les stations côtières - voir graphes ci-dessous).





Dans le cadre de cette étude, les opérations de baguage et d'observation doivent se dérouler du 16 avril au 15 mai de chaque année (30 jours), regroupant un certain nombre de filets (environ 200m) afin de pouvoir comparer le nombre de captures effectuées dans chaque station. Grâce à ces méthodes, il sera possible d'analyser le déroulement de la migration sur de mêmes bases, en fonction par exemple des conditions météorologiques. Signalons qu'en 1996 cinq stations (Ventotene, Capraia, Illa de l'Aire, M. Brisighella et Gibraltar) ont bagué durant deux mois.

Tous les relevés effectués sur les oiseaux (longueur d'aile, poids, état d'engraissement, état du plumage, longueur du bec et du tarse,...) sont inscrits sur des fiches que nous renvoyons à Bologna. Après le camp de baguage, les mêmes informations sont recopiées manuellement (ou sur support informatique) sur d'autres bordereaux, qui sont envoyés cette fois-ci au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris - Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO), qui coordonne les opérations de baguage en France et qui fournit les bagues.

La Corse occupe une position privilégiée en Méditerranée pour l'étude de la migration des oiseaux. Barcaggio se situant à la pointe du Cap Corse, les oiseaux s'y rassemblent avant de traverser la mer en direction de leurs lieux d'origine.

Sur le site de Barcaggio, les filets (de 150 à 288 mètres linéaires) sont disposés dans la saulaie, près de l'embouchure de la rivière (Acqua Tignese), dans le maquis, ainsi qu'à la lagune, sur les petites mares situées le long du chemin de la vallée (jusqu'à la station ornithologique) ou près de la plage, lorsque l'effectif suffisamment important des bagueurs le permet. (voir carte n° 2).

En 1995 et 1996, deux matoles confectionnées, notamment par Jean-Louis Clavier, avec des matériaux de récupération ont été installées, ce qui a permis la capture de certains oiseaux d'eau. En 1996, ce dispositif a été renforcé par une nasse, piège qui s'est avéré efficace pour la capture de quelques biphoreaux. Ces différents systèmes de capture servent uniquement d'appoint, les recherches étant menées essentiellement sur les passereaux. En 1996, le rendement de ces pièges n'a pas atteint les espérances en raison du niveau d'eau très haut des plans d'eau qui recouvraient complètement les vasières.



Barcaggio présente, en outre, par rapport aux autres stations, des conditions favorisant la capture de certaines espèces, grâce principalement à son milieu humide (embouchure de ruisseau, marais, saulaie, lagune) comme par exemple pour les hirondelles (lorsqu'elles viennent s'abreuver) et au maquis fournissant une zone fabuleuse d'alimentation pour les oiseaux (baies et insectes).



Carte n° 1

**Programme "Piccole Isole"  
Stations participantes 1994-1996**

- 1 - Bergeggi (94)
- 2 - Palmaria (94)
- 3 - Monte Brisighella (94-96)
- 4 - Capraia (94-96)
- 5 - Barcaggio (94-96)
- 6 - Giannutri (94, 95)
- 7 - Aiguemoll's Empodà (94-96)
- 8 - Castelporziano (94-96)
- 9 - Columbrete (94-96)
- 10 - San Pietro (94)
- 11 - Ventotene (94-96)
- 12 - Capri (94-96)
- 13 - Illa de l'Aire (94-96)
- 14 - Cabrera (94, 95)
- 15 - Formentera (94)
- 16 - Capo San Elia (94-96)
- 17 - Malta (94-96)
- 18 - Kerbacha (94)
- 19 - Gibiltera (96)
- 20 - Orti Bottagone (96)
- 21 - Canal Vell (96)
- 22 - Albulera de Aicudia (96)
- 23 - San Antiocco (96)
- 24 - Monte Gianola (95)



Carte n°2

## Participants au camp de Barcaggio 1994, 1995 et 1996

BACCOT Pierre et Armelle (96), BARBRAUD Jean Claude (94), BIRON Henri et Liliane (94), BONACCORSI Gilles (95, 96), BORGUETTI Camille (94, 95, 96), BOTO Alberto (96), BUZZI Thomas (94, 95, 96), CAMOIN Alain (94, 95), CANTERA Jean-Pierre, Martine et leurs enfants (94, 95, 96), CENTRE AERE P.T.T. Marana (sortie d'environ 40 personnes - 94), CHRISTOPHERSEN Erik (95), CLAVIER Jean-Louis (94, 95, 96), CRISPI Alexandre (95), DESNOS Alain, Martine et leurs enfants (94, 96), DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT-CORSE (journée de formation, 9 personnes - 94), DUBOIS Philippe (95), FAGGIO Gilles et Nanou (94, 95, 96), FICARRA Gisèle, Michel et leurs enfants (94), FRIDLENDER Cécilia et Alain (94, 95), FRODELLO Jean-Pierre (96), GALLETTI Marie Claire (94), GIANNINI Patrice (94, 95, 96), GIROLA Gilles (94, 95, 96), GRAZIANI Jean et ses enfants (94, 96), GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE CORSE (sortie d'environ 30 personnes en 94 et 15 personnes en 96), GUYOT Isabelle et Amandine (94, 95), HERBERIGS M. et Mme (94), JOLIN Cécile (95), JOUAIRE Stéphane (95, 96), LASSALE Pierre (94, 96), LAURANS Marilyn (96), LEFORESTIER Cyril (96), LEPERLIER Daniel et Annie (94), L.I.P.U. (BAGHINO Luca, groupe d'une quinzaine d'ornithologues italiens, 94), PERROT Renzo (95), MARTINI Gilles, Corinne, Aurélia et Sonia (96), MILANI Cristina (95, 96), MONEGLIA Pasquale et Dumenicu (96), MOUTON Coralie (95), MUSSEAU Raphaël et Sophie (96), OBERSON Joëlle (96), ORSONNEAU Sylvie (95), PERFETTINI Julien (94, 95, 96), PIACCENTINI Joseph (95), PITROU Anne-Laure (96), RECORBET Bernard (94, 95, 96), RICHE Laurent (96), ROSSI Tony (94, 95, 96), ROSSI Béatrice et leurs enfants (94, 96), ROUALET Eric (96), SEGUIN Jean-François (96), THORHAUGE-RASK Henrick (95), TURVANI Emma (95), VUILLAMIER Jean-Marcel (96), Anne-Sophie, Corinne, Alice, Suzan, ... et tous les anonymes !

Durant le séjour de 1994, quelques 145 personnes ont participé au camp, avec des séjours variables. Parmi eux, signalons le groupe d'enfants du Centre Aéré PTT de la Marana (environ 40 personnes le 27 avril), la sortie du Groupe Ornithologique de Corse (environ 30 personnes le 8 mai) et un groupe d'une quinzaine d'ornithologues italiens de la *Liga Italiana per la Protezione degli Ucelli* (LIPU) les 24 et 25/04. En 1995, une cinquantaine de personnes ont pris part au camp, dont 24 personnes ayant séjourné plus d'un jour. La présence de deux ornithologues danois (dont un bagueur) a permis d'échanger des renseignements sur les programmes de baguage conduits dans les deux pays. En 1996, 35 participants (séjour de plus de 24 heures) sont comptabilisés, ainsi qu'environ 70 visiteurs, sans compter les touristes, curieux et habitants du village. Signalons en outre une sortie du Groupe Ornithologique de Corse (15 personnes), mais aussi le passage d'un groupe d'une quinzaines d'ornithologues du Centre Ornithologique Ile de France (CORIF) et du BIRDING (15 ornithologues anglais), preuves de la renommée internationale du site.

### Quelques chiffres

Les participants directs au camp (bagueurs et observateurs) ont totalisé, en 1994, 129 journées de travail cumulé (sur la base de 8 heures par jour, alors que la journée fait facilement le double : de 5h à 23h y compris samedis, dimanches et jours fériés !). Pour chaque année 1995 et 1996, le nombre de journées s'élève à plus de 200. Cela constitue l'équivalent de 7 mois de travail pour une personne sur le terrain, auxquels il faut ajouter le temps passé pour rédiger les rapports et analyser les données. Un mois de travail collectif au camp de baguage représente ainsi presque un an de travail d'une personne à temps complet (terrain et traitement des données) à raison de 39h par semaine.

Les filets, disposés dans la végétation ou sur des zones humides (mare, rivière), sont visités en moyenne 20 fois par jour (une "tournée" environ tous les 3/4 d'heure pour récupérer les oiseaux capturés). Ceci représente en un jour, un parcours d'environ 30 km, qu'il faut multiplier par le nombre moyen de participants (soit 6 personnes, observateurs et bagueurs), en tenant compte du fait que l'ensemble des tournées est réalisé par moitié à chaque fois par chaque participant. Bref, après ces savants calculs, le déplacement cumulé pour l'ensemble des participants durant les trois saisons s'élève à plus de 2700 km à pied ou en vélo tout terrain, soit l'équivalent de pratiquement trois fois le linéaire côtier de la Corse !

Alors que l'association ne dispose d'aucun financement spécifique pour ces camps de baguage, que tous les bénévoles ayant participé à ces opérations soient une nouvelle fois vivement remerciés.

**Liste des espèces observées à Barcaggio durant la migration de printemps du 15 avril au 15 mai 1994, 1995 et 1996** (ordre systématique selon la *Liste LPO des oiseaux de l'ouest Paléarctique* - 1996). {le nom italien est indiqué en raison de notre participation au programme de recherche italien "Piccole Isole"}. Les commentaires sont parfois complétés d'observations réalisées en dehors de la période de baguage ou dans d'autres localités proches de Barcaggio (notamment le secteur de Macinaggio). Lorsque le lieu d'observation n'est pas précisé dans le texte, il est sous-entendu qu'il s'agit de Barcaggio.

## NON PASSEREAUX

### Grèbes, puffins et cormorans

#### Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* Tuffetto

En 1994, un à deux oiseaux sont observés durant tout le séjour à la lagune où il niche probablement car plusieurs chants ont été entendus : 2 chants le 26/03, présent le 26/04, 2 le 29/04, 1 le 7/05, 1 chant le 10/05. En 1995, des observations similaires sont enregistrées du 15/04 au 7/05/95, sauf le 5/05 où 3 chanteurs (+ parades) sont entendus à la lagune à 6h30 et le 6/05 où 6 oiseaux sont vus. En 1996, les observations sont également toutes répertoriées à la lagune (2ème plan d'eau) : 1 le 15/04, 3 le 16/04, 1 le 18/04, 1 le 19/04, un couple le 3/05, deux chants distincts le 6/05.

#### Puffin cendré *Calonectris diomedea* Berta maggiore

Nicheur à la Giraglia, en 1994 plusieurs mentions sont signalées en mer, mais uniquement au mois d'avril : 10 à 15 oiseaux le 17/04, environ 20 le 20/04, 2 le 21/04, 5 à 10 le 24/04, plusieurs dizaines le 26/04, environ 10 oiseaux pêchant le 30/04. En 1995, seule une observation est répertoriée : plusieurs dizaine d'oiseaux avec des Puffins yelkouans (> 50 oiseaux avec les deux espèces). La seule observation répertoriée en 1996 est datée du 1/05, reflétant peut être une faible pression de "sea watching". Un trentaine de couples niche sur l'îlot de la Giraglia.

#### Puffin de Méditerranée *Puffinus puffinus yelkouan* Berta minore

5 à 7 oiseaux sont notés le 20/04/94, 10 en vol vers le nord-ouest le 26/04/94. Pour 1995, à part l'observation signalée plus haut, une autre est mentionnée : env. 20 le 16/04 au large de la Giraglia. Aucune observation en 1996.

#### Puffin sp.

3 à 5 puffins indéterminés sont observés en mer le 18/04/94.

#### Fou de Bassan *Sula bassana* Sula

Un immature est observé le 11/05/96 en train de pêcher au large de la Giraglia.

#### Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Cormorano

Migrateur tardif, un oiseau est mentionné le 17/04/94, un autre le 10/05/94 devant l'hôtel de la Giraglia, un le 25/04/95 et une quarantaine en formation de V le 12/04/96.

#### Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotellii* Marangone dal ciuffo

Bien qu'il soit nicheur aux îles Finocchiarolla, un seul oiseau est observé le 26/04/94. Aucune observation n'est effectuée en 1995 et une seule en 1996 : 1 oiseau le 5/05.

## Grands échassiers

#### Butor étoilé *Botaurus stellaris* Tarabusio

Deux observations sont signalées en 1994, mais elles concernent certainement le même oiseau : 1 le 24/04 en vol au dessus de la saulaie, 1 le 27/04 à la lagune. Un oiseau est vu le 26/04/96.

#### Blongios nain *Ixobrychus minutus* Tarabusino

En 1994, un oiseau est noté le 4/05 à la lagune (de 12h à 13h), 1 le 9/05 près de la rivière (6h30), mais là aussi, il est probable qu'il s'agisse du même. En 1995, les observations sont de même ordre avec un oiseau le 5/05, un adulte le 6/05, mais 2 oiseaux le 9/05, 1 les 1 et 8/05 à Macinaggio. En 1996, quatre observations sont répertoriées : 1 le 21/04 à la mare, 2 le 30/04 à 15h30 dans la saulaie, puis 1 immature, 1 femelle le 7/05 dans la

saulaie entre 7h30 et 8h30 puis à 19h30, 1 mâle le 12/05 à 12h30 dans la saulaie. 4 oiseaux sont capturés en 1996 : 28 et 30/04, 1 et 6/05.

#### **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* Nitticora

En 1994 comme en 1995 et en 1996, nous disposons pratiquement d'une mention chaque soir (ou matin) entre le 12/04 et le 13/05. Parmi les observations concernant le plus grand nombre d'oiseaux, signalons en 1994 : 7 le 25/04, 6 le 1/05 et 10 le 8/05 ; en 1995 : 10 le 29/04 à 21h, 9 le 6/05 en vol vers la mer à 14h (tous adultes) + 3 adultes à 14h05, tous ces oiseaux sont revus le soir où ils partent vers le nord à 21h ; en 1996 : 5 le 15/04, 3 le matin, 5 le soir et 6 dans la nuit du 19/04, 7 le 4/05 à 6h (se posent dans le maquis) et 8 partent à 20h12 en direction de la Giraglia, 9 le 12/05 dérangés par le berger (matin), certainement les mêmes à 19h30 qui partent vers la mer, en étant rejoints par un retardataire (on notera que le groupe des 9 a attendu le dernier venu en accomplissant plusieurs tours au dessus de la mer). Trois oiseaux sont capturés en 1996 grâce à l'installation d'une nasse à la lagune (26, 30/04 et 2/05).

#### **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* Sgarza ciuffetto

Un oiseau est observé durant quatre jours sur le marais du 12 au 15/05/94, alors que deux oiseaux sont vus à Macinaggio entre le 11 et le 14/05/94. En 1995, un oiseau est vu le 30/04, puis un presque tous les jours du 7/05 au 14/05 et 3 le 1/05. Un autre oiseau est signalé le 8/05/95 à Macinaggio. En 1996 nous disposons de 13 mentions d'un oiseau ou deux (2 les 26 et 29/04) du 8/04 au 3/05. Un crabier est également noté les 26 et 27/04, ainsi que 3 les 30/04 et 1/05 à Macinaggio. Un oiseau est capturé le 28/04/96.

#### **Héron gardeboeufs** *Bulbucus ibis* Airone guardabuoi

Un oiseau est observé le 10/04/94 à Macinaggio et un le 19/04/95 à Barcaggio. Il s'agit à notre connaissance des seules mentions de l'espèce pour le Cap Corse.

#### **Aigrette garzette** *Egretta garzetta* Garzetta

Un à deux oiseaux sont signalés tous les jours en 1994, avec comme maximum : 8 le 4/05 à la lagune, 3 le 5/05, 4 le 14/05. Deux aigrettes sont observées à Macinaggio (entre le 11 et le 14/05), l'une d'elle ayant un corps plus ou moins noir ou gris et la tête blanche (forme mélanique ?). En 1995, les mentions concernent le plus souvent 1 oiseau sauf les 7/05 : 3 oiseaux, 8/05 : 6, 10/05 : 3, 11/05 : 7, 13/05 : 6. Les observations concernant la saison 1996 sont aussi nombreuses : au moins une observation par jour au mois d'avril, plus rarement en mai (seulement trois mentions les 1, 12 et 13). 1 à 2 oiseaux sont généralement observés, sauf le 29/04 où 3 à 4 oiseaux sont notés. Des observations sont également signalées à Macinaggio : 6 le 26/04, 27 le 27/04, 7 le 30/04, 9 le 1/05.

#### **Héron cendré** *Ardea cinerea* Airone cenerino

Un à deux oiseaux sont régulièrement observés en 1994, exceptionnellement 6 le 26/03 à la lagune, 3 le 9/05, 4 le 15/05. Par ailleurs, un héron cendré est signalé le 1/05 en vol au dessus de la lagune dans la direction du nord-ouest. En 1995, on relève 11 mentions d'un oiseau entre le 14/04 et le 9/05 ainsi que 2 oiseaux le 17/04 (lagune), 4 immatures le 2/05 en vol vers le large, 2 le 11/05. Les observations sont elles-aussi nombreuses en 1996 avec 17 mentions, généralement de 1 à 2 oiseaux. Notons 4 oiseaux en vol le 17/04 (17h45), 3 en vol le 5/05 (11h25), 3 à l'embouchure du ruisseau le 12/05.

#### **Héron pourpré** *Ardea purpurea* Airone rosso

De la même façon que l'espèce précédente, nous disposons pour les trois années d'observations quasi quotidiennes de 1 à 2 oiseaux. En 1994, 3 sont vus partant de la lagune vers le nord, au dessus de la mer le 26/04 à 20h, confirmant la migration nocturne de cet oiseau. Deux Hérons pourprés sont également observés à Macinaggio du 4 au 10/05, où l'espèce est régulière. 1995 : 27 mentions ; un oiseau avec un trou dans l'aile gauche est vu les 23/04 et 30/04 ; entre ces deux dates, au moins un autre oiseau sans trou dans l'aile est observé. 1996 : 17 mentions d'un oiseau et 2 oiseaux les 20/04 (un adulte, un immature) et 1/05. Un oiseau est capturé dans la nasse le 21/04/96.

#### **Cigogne noire** *Ciconia nigra* Cicogna nera

Un oiseau est observé le 12/05/95 à 5h à la lagune. Les observations sont plus nombreuses en 1996 : un oiseau les 8, 12 et 17/04, deux le 13/04.

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* Cicogna bianca

Six oiseaux sont longuement observés le 4/05/94 vers 13h : arrivées du nord-ouest, à peine à une vingtaine de mètres d'altitude au-dessus du campement, elles se sont éloignées vers le Sud-est en recherchant des courants ascendants, un moment en compagnie d'une Buse variable. 1995 : 2 oiseaux sont signalés à Macinaggio le 2/04 (à 15h) et 4 le 16/04/95 (à 15h) à Barcaggio en direction du nord. 1996 : 2 le 10/04, 2 le 21/04 (qui se posent devant la maison), 2 le 22/04 (vues plusieurs fois dans la journée : marais, saulaie, petite mare de la plage), 2 le 23/04 au marais ; il s'agit certainement du même groupe pour ces trois dernières observations.

**Anatidés****Oie cendrée** *Anser anser* Oca selvatica

Une seule mention est répertoriée le 21/04/95 : 2 oiseaux arrivent du large à 17h30 et se posent dans la mer, puis "accostent" au bouf de la grande plage de sable. Un d'entre eux est blessé à la patte gauche (elle pend en vol). Les oiseaux repartent à 19h direction ouest.

**Canard colvert** *Anas platyrhynchos* Germano reale

Nous disposons de quatre mentions à la lagune en 1994 : 1 mâle le 18/04, 1 oiseau le 22/04, un couple le 24/04, revu le 26/04. Aucun oiseau n'est signalé en 1995, mais un est vu le 17/04/96.

**Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* Alzavola

Nous disposons d'une seule mention d'un mâle le 8/04/96 à Macinaggio.

**Sarcelle d'été** *Anas querquedula* Marzaiola

Un oiseau est noté le 10/04/94 à Barcaggio, ainsi qu'un mâle les 18/04/96 (mare plage), 20/04/96 (se pose sur la rivière) et 22/04/96 (mare), ainsi qu'un oiseau le 26/04/96 à Macinaggio.

**Canard souchet** *Anas clypeata* Mestolone

Un mâle est vu tous les jours du 22/04 au 3/05/95, le plus souvent à la lagune, ainsi qu'à la mare, et une fois sur la rivière. 2 oiseaux sont par ailleurs signalés le 17/04/96 en vol au dessus de la rivière.

**Rapaces diurnes****Bondrée apivore** *Pernis apivorus* Falco pecchiaiolo

En 1994, un seul oiseau est observé à Barcaggio le 10/05 à 6h du matin. Deux oiseaux sont vus le 13/05 à Macinaggio, prenant leur vol vers le nord-est en direction de la Tour d'Agnello. Un oiseau est observé près de Sisco le 23/04. Les mentions ne sont guère plus nombreuses en 1995 : 1 oiseau le 29/04 (lagune), 1 le 3/05 (en vol vers le large), 1 le 11/05. Les mentions sont par contre plus satisfaisantes en 1996 : 3 le 29/04 (18h), 1 le 30/04, 1 le 1/05 (7h15), 1 le 2/05 (avec une Buse et un Milan royal en ascendance), 4 le 10/05 (17h), 1 le 11/05 (saulaie, 12h), 4 (saulaie, 6h30), puis 2 (13h30) puis 1 (18h30) le 14/05, 2 le 15/05 (7h30). L'expérience nous montre que la migration de cette espèce peut être très différente d'une année à l'autre : aucune mention en 1992, une dizaine en 1993, avec un relevé d'au moins 70 oiseaux en trois jours du 28 au 30/04/93.

**Milan noir** *Milvus migrans* Nibbio bruno

Cinq observations sont signalées en 1994 : 2 oiseaux le 19/04 sur les crêtes, 1 le 21/04 (avec une rémige abîmée sur l'aile gauche), 1 le 24/04 au dessus de la mer, 1 le 25/04 près du sémaphore, 1 le 3/05 à 8h sur la Giraglia. Elles sont plus nombreuses en 1995 : 1 les 16, 20 et 23/04, 2, 8 et 11/05 et deux autres oiseaux ensemble le 11/05. 1996 : un oiseau est signalé les 6, 12, 14, 17/04 et 1/05 et 2 oiseaux le 8/04.

**Milan royal** *Milvus milvus* Nibbio reale

Seulement 4 observations sont mentionnées en 1994 : 1 oiseau le 19/04 sur les crêtes, 1 le 21/04, 1 le 23/04 (10h), 1 le 12/05 auquel quelques rémiges secondaires manquent aux deux ailes. En 1995, un oiseau est observé le 18/04, 1 le 8/05 puis 3 le même jour. 1996 : 1 oiseau les 17, 18/04, 2/05 (avec une buse et une bondrée en ascendance), 2 les 20/04 et 1/05 (avec 3 Busards des roseaux).

**Busard des roseaux *Circus aeruginosus* Falco di palude**

Des observations sont signalées pratiquement tous les jours durant les trois séjours. Parmi les plus remarquables : en 1994, 20 oiseaux différents sur les crêtes le 19/04 ainsi que 4 dans la plaine de Tollare, 4 oiseaux sur les crêtes le 20/04, puis 7 au dessus du maquis, 11 oiseaux dans l'après-midi du 23/04. Sur 30 observations, seulement 4 signalent la mention d'un mâle parmi les oiseaux, les autres n'étant pas spécifiées ou indiquées "femelle". En 1995, les mentions concernant les plus gros effectifs sont les suivantes : au moins 10 (dont un mâle immature) le 14/04 en vol ascendant, au moins 20 le 15/04 à la lagune, 10 qui se suivent le 16/04 (18h30, avec un Milan noir). En 1996, les observations sont plus nombreuses en avril (13 mentions) qu'en mai (4 mentions), généralement 1 à 2 oiseaux sauf : env. 10 le 16/04, 4 le 19/04, passage de 11 oiseaux durant la journée pour chaque jour des 20 et 21/04, 3 le 22/04, 3 le 1/05.

**Busard Saint Martin *Circus cyaneus* Albanella reale**

Un seul oiseau est observé le 19/04/94 sur les crêtes. Quatre mentions d'une femelle sont répertoriées en 1995 les 22/04, 25/04 (16h30, lagune), 1/05 (en vol direction nord), 4/05 (9h, lagune). Une femelle est vue du 7/04 au 13/04/96.

**Busard pâle *Circus macrourus* Albanella pallida**

Un immature est observé le 2/05/95 par C. CHRISTOPHERSEN et H. THORAUGE-RASK (observation homologuée par le C. H. N.).

**Busard cendré *Circus pygargus* Albanella minore**

Deux observations sont signalées en 1994 : 1 femelle ou immature le 24/04 à 17h, 1 mâle le 7/05 à 16h à la lagune, puis aperçu prenant la direction de l'est. Trois mentions concernent 1995 : 1 le 4/05 (lagune), 1 mâle le 16/04 (lagune, après-midi), 1 femelle le 22/04. En 1996, une femelle est observée les 23, 29/04 et 10/05 (à 14h 40 pour cette dernière mention).

**Busard sp. *Circus* sp.**

Un busard "à croupion blanc" non identifié est observé le 21/04/94 à 11h30 et un autre le 22/04/96.

**Autour des palombes *Accipiter gentilis* Astore**

Rarement observé à Barcaggio, 1 oiseau est vu le 24/04/94.

**Epervier d'Europe *Accipiter nisus* Sparviero**

Un oiseau est vu le 1/05/94, dont le comportement laisse supposer qu'il s'agissait d'un migrateur. Par ailleurs, une femelle est capturée le 27/04/94. En 1995, un mâle est mentionné le 25/04 avec une proie (+ brins d'herbe), un autre est signalé le 7/05. Les observations sont plus nombreuses en 1996 : 1 oiseau les 11, 13, 14, 16, 17 et 21/04 (une femelle pour les deux dernières mentions).

**Buse variable *Buteo buteo* Poiana**

Six observations sont signalées en 1994 : 1 oiseau le 17/04, noté le 19/04, 1 le 22/04, 1 le 1/05, 2 le 3/05, 1 le 4/05 en vol avec un groupe de 6 Cigognes blanches. Un oiseau est par ailleurs observé le 26/03 près de la décharge de Rogliano et 2 le 19/04 au Sémaphore. En 1995, un oiseau est vu à quatre reprises les 16/04, 27/04, 4/05 et 6/05. 2 oiseaux phase claire sont vus le 8/05 et des cris sont entendus le 9/05. En 1996, les mentions suivantes sont répertoriées : 1 le 15/04, 1 le 19/04 longeant la plage, 1 attaquant un Aigle pomarin (ou criard) + 2 en vol ascendant le 20/04, 1 le 2/05 en ascendance avec un Milan royal et une Bondrée, 1 le 14/05.

**Aigle pomarin *Aquila pomarina* Aquila anatraia minore**

Un aigle répondant à la description du pomarin est observé plusieurs fois en 1996 : 13/04, 17/04, 20/04 (peut-être le même que l'observation précédente : plumage très abîmé), 1/05, avec 2 grands corbeaux (15h). Pour la dernière mention, certains observateurs ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un Aigle criard, peut-être le même vu le 9/05/95 dans les Agriate, mais l'observation a été rejetée par le C.H.N. ; toutes ces mentions concernent donc l'Aigle pomarin. Un Aigle pomarin avait été vu à Barcaggio le 10/04/81 (détermination supposée) et le 3/05/89 (observation homologuée par le C.H.N.).

**Aigle royal *Aquila chrysaetos* *Aquila reale***

Un adulte est vu le 13/05/96 à 11h au dessus de la chapelle San Antonino. Il s'agit peut être d'un des adultes du couple nichant dans le Cap Corse.

**Aigle sp. *Aquila sp.***

Un aigle de petite taille est noté le 16/04/95 (lagune après midi) et un autre le 23/04 à 17h à la lagune, puis à 17h30 au dessus du camp (assez haut) dont voici la description : dessous brun uniforme, dessus idem, noir sur les rémiges primaires, tête plus claire striée de brun. Environ trois fois la grosseur d'un crécerelle (Aigle botté ?).

**Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* *Falco pescatore***

Un couple a occupé le nid artificiel du Capo Bianco en 1994, mais la nidification a échoué à cause de l'immaturité d'un des oiseaux (bagué à Scandola). Un oiseau est observé les : 17/04, 19/04, 20/04 (pêchant devant l'embouchure de l'Acqua Tignese à 18h), 22/04, 5/05 (au dessus de la lagune). En 1995, la nidification a également échoué. Un oiseau est signalé le 15/04 avec une bague orange. Un autre est noté le 6/05. En 1996, les observations suivantes sont répertoriées : 1 le 7/04 (en migration), 1 le 8/04 (en migration), 3 le 12/04 (en migration), 1 le 17/04 (qui longe la plage), 1 le 20/04 (qui pêche, puis avec un poisson), 1 le 25/04 (vu toute la matinée en train de pêcher, apparemment pas bagué), 1 le 30/04 (à 10h avec un gros poisson).

**Faucon crécerellette *Falco naumanni* Grillaio**

Un oiseau est déterminé de façon certaine le 12/04/96, deux autres oiseaux y ressemblant sont également vus en même temps (détermination aléatoire). La dernière mention de cet oiseau pour la pointe du Cap Corse date du 24/04/92, mais l'espèce semblait plus fréquente durant les premiers camps de baguage (début des années 80).

**Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Gheppio**

Comme chaque année, le couple nichant dans le Palazzu est signalé plusieurs fois (en 1994 : 7 mentions uniquement durant le mois d'avril, une le 26/03, couple régulier en 1995 et en 1996). Un oiseau est vu transportant une branche le 30/04/94. Un oiseau est noté sur Giraglia le 16/04/95. Un oiseau est capturé le 28/04/96 dans un filet à grandes mailles, en même temps qu'un Faucon hobereau.

**Faucon kobez *Falco vespertinus* *Falco cuculo***

Une femelle est signalée les 6 et 8/05/95. 4 oiseaux (1 mâle adulte, 1 mâle sub-adulte et 2 femelles) sont vus le 26/04/96 vers 16h dans les champs en face de la maison, une femelle le 30/04/96 et 2 autres oiseaux sont notés le 8/05/96.

**Faucon émerillon *Falco columbarius* Smeriglio**

Un oiseau est capturé le 1/05/95. Un oiseau est également mentionné le 20/04/96 au dessus du camp. L'espèce avait été signalée lors des séjours 1991, 1992 et 1993.

**Faucon hobereau *Falco subbuteo* Lodolaio**

Trois mentions d'un oiseau sont signalées à Barcaggio en 1994 : le 4/05 à 6h dans la saulaie, le 10/05 à 19h30 dans la saulaie, le 19/05 remontant la vallée, et une mention à Macinaggio : 1 le 13/05. Une capture est également réalisée le 28/04. Le même nombre d'observations est noté en 1995 : 1 oiseau le 15/04, 1 le 16/04, 1 le 29/04, tous à la lagune. En 1996, 1 oiseau est vu le 10/04, 4 le 18/04 sur les crêtes du radar, 1 le 1/05 haut dans le ciel à 17h30, 1 le 3/05 à la lagune à 6h, puis 1 à 18h30 au ras des saules, 1 le 15/05 à 20h25 dans la saulaie. Un ex. est capturé le 28/04/96 en même temps qu'un Faucon crécerelle.

**Faucon pèlerin *Falco peregrinus* *Falco pelegrino***

Un oiseau est vu au sémaphore le 25/04/94. Un adulte avec un jeune au nid est noté le 29/04/95 dans la falaise près de la Tour. Un oiseau est signalé les 15/04/95 (lagune) et 5/05/95 (à 19h10). En 1996, nous disposons de quatre observations concernant à chaque fois un oiseau : 13, 19, 20/04 et 4/05 (à 20h près de la Tour). La même année, trois couples ont niché dans le secteur (entre Finocchiarola et le sémaphore).

**Faucon sp. *Falco sp.***

Un faucon de grande taille est observé le 26/03/94, ainsi qu'un autre le 16/04/95 (lagune, après-midi).

## Gallinacées

### Perdrix rouge *Alectoris rufa* Pernice rossa

L'espèce est notée le 6/05/95 sur la route d'Ersa. En 1996, 2 oiseaux sont mentionnés les 16/04, 2 autres le 20/04 sur les crêtes au dessus de la tour, 1 le 2/05, 1 le 4/05 au radar.

### Caille des blés *Coturnix coturnix* Quaglia

Deux mentions attestent de sa présence en 1994 : 1 près des rochers après les dunes le 24/04, 1 levée près des filets du marais. Elle est plus souvent notée en 1995 : chant entendu le 20/04, 1 le 23/04 (maquis), 14 levées à la lagune le 25/04 (migration ?), un chant entendu les 28/04, 5/05 et 15/05. Deux contacts sonores sont réalisés en 1996 (le 5/05 à 11h près de la mare et le 9/05 à 7h dans la prairie clôturée de la plage) ; 1 oiseau est par ailleurs vu le 1/05 et un autre est levé le 13/05 à 15h15 dans le maquis au sud de la première lagune.

## Rallidés

### Râle d'eau *Rallus aquaticus* Porciglione

Les mentions concernent uniquement 1995 : 1 le 18/04 dans la saulaie (vu + cris et capturé dans une matole), cris entendus les 22 et 23/04 dans la saulaie et près de la rivière.

### Marouette ponctuée *Porzana porzana* Voltolino

Une capture est effectuée à la lagune, le 1/05/94. Un oiseau (le même ?) est vu, également à la lagune, le 4/05. Une seule mention est signalée en 1995 : le 17/04 à 17h sur la rivière, ainsi qu'une capture le 29/04. En 1996, 1 oiseau est vu les 6 et 30/04, ainsi que le 10/05, toutes à la lagune. Pour cette dernière mention, notons la prose que Jean-Louis Clavier a consigné sur le cahier d'observation : "7h30. presque marché sur une Marouette ponctuée qui s'envole au ras de l'eau en décrivant un bel arc de cercle avant de se poser vers une matole".

### Marouette poussin *Porzana parva* Schiribilla

Un mâle et une femelle sont observés le 4/05/94 à la lagune (avec une Marouette ponctuée). La femelle est revue le lendemain. Un oiseau est également vu à la lagune le 14/04/95. Plusieurs observations sont également réalisées à Macinaggio : 1 femelle le 4/05/94, 1 femelle le 8/05/95, 2 femelles les 30/04 et 1/05/96.

### Rallidés sp.

Une marouette qu'il n'a pas été possible de déterminer (observation furtive) est signalée à la lagune le 1/05/94. Une autre est mentionnée le 28/04/95. Un rallidé s'échappe d'un filet le 29/04/95 (saulaie).

### Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* Gallinella d'acqua

Elle a toujours été présente sur le site sauf en 1989, année de sécheresse. Elle est également régulièrement observée au marais de Macinaggio. En 1994, un seul oiseau est observé du 28/04 au 11/05 à la lagune, à la rivière ou à la mare près de la maison, mais deux oiseaux ensemble sont notés le 30/04 à la lagune.

En 1995, entre le 14/04 et le 15/05 les observations sont quasi quotidiennes, avec 5 oiseaux ensemble à la lagune le 5/05, et un maximum de 6 au même endroit le 17/04. Cependant à ce jour aucune preuve certaine de reproduction n'a été apportée. 6 oiseaux ont par ailleurs été capturés en 1995. On notera que plusieurs oiseaux capturés ou observés étaient des immatures (bec vert).

De nombreuses observations sont notées en 1996, concernant 1 ou 2 oiseaux (sauf 3 le 17/04 à la mare), sur les sites de la rivière, de la lagune et de la mare. Le 30/04, un adulte bagué et un immature ("bec vert") sont vus sur la rivière. 7 oiseaux sont également capturés en 1996, notamment grâce aux matoles et à la nasse (5 captures en avril, 2 en mai). Signalons le contrôle d'un oiseau bagué le 25/04 et repris le 14/05.

### Foulque macroule *Fulica atra* Folaca

Sa présence est assez irrégulière à Barcaggio. En effet, si en 1993 et 1994 l'espèce a été observée à de nombreuses reprises, notamment en 1994 où jusqu'à 5 oiseaux ont été notés ensemble avec une présence constante du 26/03 au 10/05, en 1995, une seule observation d'un oiseau est signalée le 8/05, ainsi que deux ind. aux marais de Macinaggio le 6/05. A Barcaggio, les oiseaux ont toujours été observés à la lagune sauf en 1994 où

pour la première fois un ex. est vu le 22/04 au marais. Son retour est noté en 1996 à la lagune, certainement en raison du niveau d'eau élevé : 1 oiseau les 18 et 19/04, un couple dans la scirpaie de la deuxième lagune le 3/05, entendue le 6/05 à 7h, ainsi que 2 oiseaux le 26/04 à Macinaggio.

## Grue

### Grue cendrée *Grus grus grus*

La seule observation concerne un oiseau vu le 17/04/96 à 16h50, puis à 18h45. On relève qu'il manque des tertiaires sur l'aile gauche. Il s'agirait de la première observation de cette espèce dans le Cap Corse.

## Limicoles

### Echasse blanche *Himantopus himantopus* Cavaliere d'Italia

Pour cette espèce les observations sont très irrégulières d'une année à l'autre. Ainsi, en 1994 on a pu observer 2 oiseaux le 22/04 (au marais à 8h, puis en vol au dessus de la saulaie à 11h30), 2 le 23 (au marais), 4 le 24 (sur la plage, à l'embouchure du ruisseau puis au marais), 2 le 25, 2 le 26 (à la lagune), 1 le 14/05 (à la lagune, ainsi qu'à Macinaggio, le même ?). En 1995, un seul ex. est noté le 14/04 à Barcaggio, ainsi que 6 le 11/04 à Macinaggio. En 1996, 1 oiseau est vu les 19/04 (à la lagune puis à l'embouchure du ruisseau), 20/04 (lagune), 4 oiseaux le 29/04 (lagune), 1 oiseau le 9/05 en vol au dessus de la mer près de la lagune.

### Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* Occhione

Un oiseau est observé le 7/04/96, après la plage de galets, dans le champ près de la mare, puis en vol vers la Giraglia où il s'est posé. Il s'agit de la quatrième mention pour Barcaggio (déjà noté en 1980, 1981 et 1992).

### Petit Gravelot *Charadrius dubius* Corriere piccolo

Il est noté chaque année en petit nombre, de 1 à 3 oiseaux ensemble. Il est probable qu'un couple puisse nicher dans le secteur, en plus des observations se rapportant à des sujets migrants. Les observations semblent plus continues en 1996 où 1 à 2 oiseaux sont vus régulièrement du 13/04 au 12/05. Un oiseau est capturé le 18/04/95. 3 oiseaux sont capturés en 1996 (2 le 18/04, 1 le 24/04).

### Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* Corriere grosso

Il est plus fréquent que l'espèce précédente. En 1994, un oiseau (au moins) est noté le 24/04, 2 le 3/05 (13h15) sur la plage, 3 le 7/03 sur des rochers en bordure de mer, 1 le 8/05 à l'embouchure de la rivière, 4 à Capandula (entre le 11 et le 14/05). En 1995, jusqu'à 5 oiseaux sont vus sur la plage le 15/05 puis deux groupes distincts de 6 et 7 oiseaux la même date. En 1996 1 à 2 oiseaux sont notés du 6/05 au 14/05. 5 oiseaux sont capturés en 1996 (1 en avril, 4 en mai).

### Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrius* Fratino

Aucune observation en 1994. En 1995, un seul oiseau est noté du 22/04 au 13/05 à la plage ou à la lagune. Ces observations pourraient se rapporter à un oiseau nicheur. Une seule mention est signalée en 1996 : un oiseau le 15/04.

### Gravelot sp. *Charadrius sp.*

Comme en 1994 où un gravelot non déterminé est observé le 29/04 sur la plage, un ind. est vu le 14/05/95 dont la détermination n'a pas été possible.

### Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* Pivieressa

La seule observation concerne un oiseau vu à Capandula (entre le 11 et le 14/05/94).

### Vanneau huppé *Vanellus vanellus* Pavoncella

La seule observation pour ces trois années consécutives est un oiseau vu les 18 et 19/04/96.

**Bécasseau maubèche *Calidris canutus* Piovanello maggiore**

Un oiseau est déterminé sur photo (P. Giannini et C. Borghetti) en compagnie d'un cocorli sur des rochers en bord de mer le 8/05/94.

**Bécasseau minute *Calidris minuta* Gamberchio**

Alors qu'en 1994 les observations ont eu lieu au mois de mai : 1 le 9 à 8h à la lagune, 1 le 11 à la lagune, 3 le 12 sur la rivière dont 1 capturé au filet, 1 le 14 où un autre oiseau est bagué, en 1995 seulement 2 ind. sont notés le 25/04 sur la plage et 1 autre le 26/04 au même endroit. Un seul ex. est noté en 1996 : le 17/04 (à la mare). 2 oiseaux sont capturés en 1994 et 1 en 1995.

**Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* Gamberchio nano**

Un oiseau est observé les 26 et 27/04/96 à Macinaggio.

**Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Piovanello**

Le passage semble bien localisé dans le temps puisqu'en 1994 et 1995, les observations ont eu lieu entre le 6 et le 12 mai. 1994 : 1 oiseau est observé le 8/05 à l'embouchure de la rivière, puis 2 sur les rochers puis 1 à la lagune, 1 oiseau 9/05, 4 le 10/05 (dont 3 en plumage nuptial), plus qu'un seul le 11/05. 1995 : 2 le 6/05 à Macinaggio, 3 le 8/05 à Macinaggio, 1 le 12/05 (17h30, mare). 1 oiseau est capturé le 6/05/95. Aucune observation en 1996.

**Bécasseau sp. sp.**

2 bécasseaux non déterminés sont vus le 24/04/94.

**Combattant varié *Philomachus pugnax* Combattente**

Toutes les mentions concernent en 1994 et 1995 des oiseaux signalés au mois de mai, alors qu'elles sont toutes situées en avril pour la dernière année. 1994 : 1 (supposé) le 3/05, 4 le 6/05 (2 à la lagune + 2 au bord de mer), 1 femelle le 8/05 à la lagune, 3 le 14/05, 3 le 4/05 à Macinaggio. 1995 : 5 le 1<sup>er</sup> à la lagune, ainsi qu'un vol d'environ 18 à 9h30, 1 à l'embouchure puis 2 à la lagune le 2, 3 le 3 sur la mare du chemin allant à la lagune, 2 puis 3 le 5 à la lagune, 3 les 6, 7, 9 et 10 à la lagune, 2 le 11, toujours à la lagune, 1 à Capandula (entre le 11 et le 14/05). En 1996, 3 oiseaux sont vus le 15/04, 3 le 23/04, 1 avec une bague le 24/04, 2 le 25/04 (rivière, 10h), 1 le 26/04. Les efforts développés par les participants au camp concernant la disposition tactique des filets et l'efficacité des rabatteurs ont permis la capture de 3 oiseaux en 1994 (1 le 1/05, 2 le 4/05), mais aucun en 1995. 1 oiseau est capturé le 21/04/96.

**Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* Frullino**

Alors qu'elle n'avait pas été observée en 1993, nous disposons de quelques mentions pour chaque saison. 1994 : 1 le 18/04, 1 le 7/05 ; 1995 : 1 capture le 16/04, 1 oiseau vu le 25/04 (le même ?), 1 le 11/04 à Macinaggio. Toutes ces observations ont été réalisées à la lagune. Deux sujets sont vus le 5/05/96, également à la lagune (19h).

**Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Beccaccino**

Pour 1994, un oiseau est noté le 14/05 à la lagune ; en 1995 (lagune et saulaie) : 1 les 14/04, 25/04 et 12/05, ainsi qu'une capture réalisée le 9/05. En 1996, 2 oiseaux sont observés le 17/04 (marais du chemin des crêtes), 2 le 20/04 (marais), 1 le 21/04 (marais), 1 le 22/04, 1 le 24/04 (lagune), 1 le 28/04 (pré aux chevaux, devant la maison). Le passage est faible pour cette espèce hivernant pourtant en grand nombre en Corse.

**Bécassine double *Gallinago media* Croccolone**

Une seule observation de cet oiseau est réalisée le 8/05/95 à Macinaggio (1 ex.).

**Bécasse des bois *Scolopax rusticola* Beccaccia**

Très rarement observée à Barcaggio. Aucune observation en 1994 et 1996. En 1995, 1 ind. est observé le 3/05 à 17h15 dans la saulaie, puis à 18h30 sur le chemin de la saulaie.

**Courlis corlieu *Numenius phaeopus* Chiurlo piccolo**

Un oiseau est vu du 6 au 13/04/96, puis le 17/04.

**Courlis cendré *Numenius arquata* Chiurlo**

La seule mention concerne un oiseau observé le 28/04/96.

**Chevalier gambette** *Tringa totanus* Pettegola

Le passage est régulier tous les ans mais pas en grand nombre. 1994 : une dizaine d'observations, toutes en avril, signalent la présence de 1 oiseau (20, 25, 26 et 27) à 2 (17, 18, 19, 22, 23 et 24) le plus souvent près de la mer ou à la lagune, voire au marais ou sur la rivière. 1995 : scénario pratiquement identique puisque 1 à 2 ind. sont notés (7 observations) du 25/04 au 14/05 (migration un peu plus tardive). 1996 : 1 le 1/05, 1 le 2/05 (lagune 6h30), 1 le 7/05 (13h, rivière, avec une bague au tarse droit, alors que ceux capturés le 4/05 avaient été bagués à gauche), puis 2 (18h30, mare), 1 le 8/05 (10h30 au dessus de la mer, puis revu dans la journée). 4 oiseaux sont bagués en 1996 (1 le 29/04, 2 le 4/05 et 1 le 9/05).

**Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis* Albastrello

Très rarement noté à Barcaggio. Deux oiseaux sont observés le 11/05/95 par des ornithologues danois.

**Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* Pantana

En 1995 comme en 1994, un seul oiseau est observé à la fois. 1994 : un oiseau est mentionné les 20, 21, 22 et 23/04, 3, 5, 6, 7 et 9/05, le plus souvent à la lagune ou près de la mer, ainsi qu'à Capandula (entre le 11 et le 14/05). 1995 : 1 ex. est noté les 14, 25 et 26/04. En 1996, 1 oiseau est vu les 26/04, 1<sup>er</sup> et 4/05, 2 oiseaux les 29 et 30/04 ; toutes les observations ont eu lieu à la lagune. Une capture est réalisée le 3/05/94 et une le 30/04/96.

**Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* Piro piro culbianco

En 1994, un oiseau est observé à l'embouchure de l'Acqua Tignese le 28/04 où il est ensuite capturé au filet. Un oiseau est également signalé sur la rivière en amont de la maison le 30/04. En 1995, 2 ex. sont vus à la mare le 15/04 puis 1 ex. le 20/04 et 1 le 29/4 à la lagune. Une capture est également réalisée le 16/04/95. En 1996, 1 oiseau est noté le 17/04 (mare), 1 le 19/04 (gué oliviers), 1 puis 2 le 21/04, 2 le 5/05 (11h, mare).

**Chevalier sylvain** *Tringa glareola* Piro piro boschereccio

Cette espèce est signalée presque tous les jours en 1994 (19 jours où elle est mentionnée), le plus souvent à la lagune (seulement deux fois sur la mare de la maison, trois fois sur la mare du chemin allant à la lagune, une fois près de l'embouchure du ruisseau), ainsi qu'à Macinaggio (dont 15 le 4/05). Les mentions concernent en majorité des observations de 1 à 4 oiseaux ensemble, parfois entre 5 et 8. Observations remarquables : environ 20 oiseaux le 1/05, environ 20 le 7/05 et 19 le 9/05. Par ailleurs 40 captures sont réalisées (3 en avril, 37 en mai), avec un maximum de 16 le 1/05 et 13 le 4/05.

En 1995, les observations (14 mentions) sont presque aussi régulières qu'en 1994, bien que les effectifs observés soient nettement inférieurs, le plus souvent 1 à 3 oiseaux. Effectifs maximaux : 5 oiseaux le 29/04, 9 le 4/05 et 8 le 11/04 à Macinaggio ; 11 captures (2 en avril, 9 en mai).

Nous comptabilisons 21 mentions en 1996 (du 9/04 au 15/05), le plus souvent 1 à 3 oiseaux, avec des maximum les 12 et 14/04 : 4 oiseaux, 21/04 : 18 oiseaux, 22/04 : 6 oiseaux, 23/04 : 4 oiseaux et 14 oiseaux le 1/05 à Macinaggio ; 13 captures (11 en avril, dont 5 le 24/04 et 2 en mai). Un oiseau bagué le 7/05 est repris le 10/05.

**Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* Piro piro piccolo

Les observations de 1994 (au nombre d'une quinzaine) ne signalent que 1 ou 2 oiseaux ensemble (lagune, mare du chemin y menant, mare de la maison ou rivière, Macinaggio), alors que jusqu'à 6 guiguettes sont pris au filet le 7/05. Le nombre des captures en 1994 est de 37 (14 en avril, 23 en mai), atteignant presque le même nombre que pour le Chevalier sylvain, ce dernier étant pourtant observé en effectif supérieur.

En 1995, les observations sont aussi régulières qu'en 1994, avec les effectifs maximaux suivants : 7-8 le 25/04 (plage 20h), 5-10 le 13/05 (plage). Un grand nombre d'observations ont eu lieu à proximité du rivage où on pense que ces oiseaux ont pu trouver une grande partie de leur nourriture. Ils sembleraient ainsi moins tributaires de la présence de milieux humides à eau douce (printemps 1995 sec) que d'autres limicoles, comme le Chevalier sylvain. 25 captures sont réalisées en 1995.

En 1996, les mentions sont moins nombreuses : 1 à 3 oiseaux de façon discontinue du 9/04 au 11/05, avec cependant 10 ex. observés le 12/05 à 6h du matin à l'embouchure du ruisseau, mais un record de captures égal à celui de 1991, soit 52 captures. Le passage le plus important semble se situer entre le 8 et le 13/05. Plusieurs oiseaux sont contrôlés le

lendemain de leur capture, d'autres ont séjourné quelques jours : 1 bagué le 30/04, repris le 2/05, 1 bagué le 8/05, repris le 12/05.

Une reprise est effectuée le 1/05/95 (bague belge). Cet oiseau avait été bagué le 17/07/86 à BEERSE (littoral de la Belgique) comme un oiseau de plus d'un an. Il s'agirait donc d'un oiseau ayant vécu au moins 10 ans !

#### **Chevalier sp. sp.**

Un chevalier qui pourrait être un gambette est signalé le 15/04/94.

### **Mouettes et goélands**

#### **Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* Gabbiano corallino**

Très rarement signalée dans le Cap Corse, un oiseau est observé le 15/05/94 à Barcaggio. Pour information, un adulte en plumage nuptial a également stationné du 21/06 au 4/07/95 au sein de la colonie de nidification du Goéland d'Audouin sur Giraglia, ainsi qu'un oiseau dès la fin du mois de mars 1996, puis un second à partir de la fin du mois de mai (A. CAMOIN & J.-C. THIBAUT).

#### **Goéland d'Audouin *Larus audouinii* Gabbiano corso**

En 1994, 1995 et 1996, la colonie de nidification des îles Finocchiarola s'est déplacée pour s'installer sur la Giraglia. Six observations sont mentionnées en 1994 : 3 oiseaux le 24/04, 1 le 28/04, 3 le 30/04, puis un observé en train de boire à la lagune, 2 le 2/05 à l'embouchure de l'Acqua Tignese, 1 le 10/05 à Tollare, 2 le 15/05. En 1995 et 1996, les observations sont de même importance, avec un maximum de 5 ex. le 3/05/95 et également 5 le 20/04/96 (les deux observations à la tour d'Agnello).

#### **Goéland leucophée *Larus cachinnans* Gabbiano reale**

Durant les trois années, entre 10 et 50 oiseaux sont généralement observés tous les jours. A noter : environ 50 goélands le 10/05/94 dans les oliviers et près d'une centaine le 15/05/94 toujours dans les oliviers face à la maison où ils se nourrissent de leurs fruits, 50 le 20/04/95 à la lagune puis sur la plage (en compagnie d'au moins 2 Goélands d'Audouin), env. 100 le 13/04/96.

### **Pigeons, tourterelles et coucou**

#### **Pigeon biset *Columba livia* Piccione selvatico**

Nicheur local dans les falaises de Giraglia et du Capo Bianco.

#### **Pigeon ramier *Columba pallumbus* Colombaccio**

Cette espèce n'avait pas été signalée depuis le printemps 1991 (à cette période de l'année). Un oiseau est observé le 17/04/94 puis le 4/05/94 près de la lagune. Aucune mention en 1995, mais un oiseau est noté le 8/05/96 à 9h30 dans la saulaie.

#### **Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* Tortora dal collare orientale**

Un seul chant est entendu le 1/05/94. Un chant est également entendu le 16/04/95 (saulaie) et 3 oiseaux sont vus le 8/05/95. Les observations sont un peu plus nombreuses en 1996 : 1 oiseau le 16/04, 1 chanteur le 19/04 dans le village, 1 oiseau le 1/05, 1 oiseau le 5/05 (15h20, saulaie) et 2 le 14/05. On ignore toujours si cette espèce en expansion niche dans la localité ou si les observations concernent des oiseaux erratiques.

#### **Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* Tortora**

Elle est observée tous les jours, le plus souvent entre 1 et 3 oiseaux. Parmi les observations remarquables signalons en 1994 : 14 oiseaux le 15/04, 28 le 29/04 dans les champs, environ 30 le 9/05, puis 20 le lendemain dans les champs labourés ; 1995 : 9 le 23/04, 10 le 28/04, env. 10 le 6/05 à Macinaggio. 10 prises au filet ont été réalisées en 1994 (4 en avril, 6 en mai) et également 10 en 1995 (5 en avril, 5 en mai) ; 1996 : 20 le 23/04, 15 le 26/04, 32 le 6/05 (18h15), env. 12 le 10/05 ; 11 captures (dont 8 en mai).

**Coucou gris** *Cuculus canorus* Cuculo

Le passage est régulier mais en nombre limité. En 1994 au moins un chanteur est entendu les 19, 20, 24, 25 et 30 avril. Un oiseau est également vu le 19/04, ainsi que les 7 et 14/05. Deux captures sont réalisées les 24/04 et 9/05/94. En 1995 le scénario est pratiquement identique : 1 ex. les 16/04, 3, 9 et 10/05, avec 3 captures les 25, 27/04 et 7/05. Les contacts sont plus nombreux en 1996 : 1 oiseau noté (vu ou entendu) les 12, 21, 23, 25/04, 5, 6, 9, 10 et 11/05.

**Rapaces nocturnes****Effraie des clochers** *Tyto alba* Barbagianni

Sédentaire et nicheuse sur le site. Des cris répétés sont entendus le 4/05/94 vers 1h du matin près du lit asséché de la rivière (au niveau du marais). Elle est notée assez régulièrement du 16/04 au 8/05/95, le plus souvent près du Palazzu, de la maison ou de la saulaie, ainsi qu'une fois à la lagune (28/04/95, 22h30). Elle aurait également niché en 1996 dans le Palazzu. Un oiseau est capturé le 6/05/96 à la tombée de la nuit dans un filet à grandes mailles.

**Petit-duc scops** *Otus scops* Assiolo

A la petite population nicheuse se joignent les migrateurs au printemps. Leur passage à Barcaggio est régulier. En 1994, un à quatre oiseaux chanteurs sont entendus tous les soirs, parfois dans la journée. Trois oiseaux sont par ailleurs bagués, tous en avril. En 1995 et 1996, des mentions similaires sont effectuées (1 à 4 chanteurs tous les soirs) et 5 captures réalisées en avril 95 et 3 en avril 1996. Un oiseau bagué le 22/04 est contrôlé le 25/04. 10 chanteurs sont par ailleurs recensés le 29/07/96 entre Granaggiolo et Barcaggio.

**Hibou moyen-duc** *Asio otus* gufo

Une capture est réalisée dans la nuit du 2/05/94, grâce à Jean-Louis Clavier (encore lui !) qui a passé sa nuit devant le filet. Il s'agit à notre connaissance de la première mention de cet oiseau pour le Cap Corse.

**Nocturne sp.**

Un cri (ou chant ?) est signalé le 17/04/95, mais cet oiseau nocturne n'a pas pu être identifié.

**Engoulevent, martinets, guêpier, huppe, torcol****Engoulevent d'Europe** *Caprimulgus europaeus* Succiacapre

Son passage est régulier. En 1994, des chants sont entendus les 14, 18, 23, 24 et 28/04, ainsi que le 9/05. Un oiseau est vu le 8/05. En 1995, les mentions d'un ou deux oiseaux chanteurs sont plus régulières (11 soirs), avec un maximum de 2 à 5 oiseaux le 25/04. Il est plus rare en 1996, où il est seulement contacté durant trois soirs : 1 les 30/04 et 15/05, 2 le 4/05. Deux captures sont réalisées en 1995 (3 et 5/05) et 1 en 1996 (10/05), alors qu'aucune n'a été effectuée en 1994.

**Martinet noir** *Apus apus* Rondone

En 1994, des oiseaux sont observés à partir du 19/04 (plusieurs centaines sur les crêtes), puis jusqu'à la fin du séjour par groupes dépassant rarement une quinzaine. 8 captures sont réalisées sur la rivière, toutes en mai.

En 1995, des ind. sont notés dès le 14/04 quasi quotidiennement. Une centaine d'oiseaux est mentionnée le 25/04 à 11h30. 5 captures sont par ailleurs réalisées.

En 1996, des passages sont notés durant tout le séjour, avec en particulier : moyen passage le 20/04, nombreux passages le 26/04 dans l'après-midi et le soir en hauteur par groupes d'environ 30, une centaine le 13/05 se nourrissant autour des eucalyptus du Palazzu vers 11h (sortie d'insectes), passage assez important le 15/05. 20 oiseaux sont par ailleurs capturés cette année là, dont 8 le 4/05.

Chose exceptionnelle un martinet bagué lors du camp de baguage de Barcaggio de 1992 (le 15/05) est contrôlé en 1994 (le 4/05) par nos soins ! Même chose pour un martinet contrôlé le 4/05/96 et bagué également le 15/05/92 (les deux oiseaux avaient été bagués l'un après l'autre !). Nous avons d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de nicheurs locaux (fidélité au territoire), mais la nidification du Martinet noir est inconnue dans ce secteur

(village de Barcaggio et Giraglia). L'hypothèse que ces oiseaux soient uniquement de passage, restant fidèles à leur route de migration, serait finalement plutôt envisagée, bien que les probabilités d'une telle citation soient très faibles, surtout lorsqu'il y en a deux.

#### **Martinet pâle** *Apus pallidus* Rondone pallido

La distinction entre cette espèce et la précédente est souvent difficile, notamment lorsqu'il s'agit de vols rapides à une altitude assez haute. Les oiseaux suivants ont pu être déterminés avec certitude : 1 le 14/05/94, 1 le 29/04/95, 1 le 8/05/95 (une observation le matin, une l'après-midi pour cette dernière date), 1 le 1/05/96, 1 le 13/05/96. L'espèce niche sur la Giraglia.

#### **Martinet à ventre blanc** *Apus melba* Rondone alpino

Ce grand martinet est présent tous les ans sur le site, notamment au dessus de la rivière où il frôle l'eau à grande vitesse pour venir s'abreuver. Une bonne dizaine de mentions sont consignées sur le carnet d'observations en 1994 : 1 oiseau les 17 et 29/04, 8, 10 et 14/05 ; 2 oiseaux les 21 et 22/04, 1er, 5, 6 et 12/05 ; 3 oiseaux le 28/04 et 4 le 19/04 au Sémaphore. En 1995, il est noté 9 fois du 16/04 au 15/05 avec un maximum de 4 oiseaux le 27/04 (14h45). Les mentions sont plus nombreuses en 1996 (16 fois) avec notamment env. 30 oiseaux le 13/04, 15 le 16/04, 7 le 15/05 les autres observations concernent 1 ou 2 oiseaux.

#### **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* Gruccione

En 1994, les premières observations sont réalisées le 21/04 : d'abord 3 au dessus de la saulaie, 6 à 14h30 au dessus du village, 12 à 15h30, 5 puis 10 posés dans les oliviers et dans les saules. En 1995, les plus précoces sont notés le 17/04, alors qu'en 1996, les premiers sont vus dès le 6/04. Par la suite et pour les trois années, les passages de quelques ind. au début du séjour deviennent de plus en plus fréquents et quotidiens, par groupes de 10 à 20 oiseaux à chaque fois, exceptionnellement 25 le 1/05/94 à 15h30 (3 à 6h30 et 19 à 11h le même jour), 34 entre 12h et 13h le 4/05/94 à la lagune, 21 le 27/04/95 (14h45), 30 à 40 le 3/05/95 en vol bas au dessus de la saulaie et du maquis (8h30, avec une dizaine de martinets noirs), plus d'une quinzaine de passages par groupes de 15 à 30 oiseaux notée le 4/05/95, un vol de 50 (assez haut) le 5/05/95 en direction du sud (!) à 19h45, 25 le 18/04/96, nombreux passages les 29/04, 3, 4 et 7/05/96. Un guêpier avec une bague italienne est trouvé avec une aile brisée à Macinaggio le 4/05/96 (oiseau mort le lendemain) ; la localité de baguage ne nous a pas encore été transmise.

#### **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* Ghiandaia marina

Un oiseau est observé les 13 et 14/05/94 près de Tamarone. En 1995, un oiseau a stationné à Barcaggio du 8 au 13/05 (peut être même deux oiseaux le 8), suivi d'une autre mention le 15/05 ; s'agit-il du même oiseau ? Par ailleurs, un oiseau est vu à Macinaggio le 8/05/95 et un le 7/05/96.

#### **Huppe fasciée** *Upupa epops* Upupa

Bien qu'elle soit observée tous les ans, il semble que son passage soit assez irrégulier : en 1994, 1 à 3 oiseaux sont signalés régulièrement du 14/04 au 11/05 (ainsi que 3 le 26/03) ; en 1995 l'espèce est également notée régulièrement en nombre similaire, sauf le 15/04 où 14 oiseaux en deux groupes de 8 et 6 sont bien identifiés. 10 oiseaux sont observés le 6/04/96, alors que les autres observations (au nombre de 11) concernent seulement 1 oiseau à chaque fois, sauf le 5/05 où 3 ex. sont notés (dont un capturé sur les trois). 4 captures sont réalisées en 1994 (21 et 27/04, 2 et 14/05), 5 en 1995 (16, 17 - deux oiseaux dans la journée -, 20 et 23/04) et 5 en 1996 (17 et 27/04 et 5, 8 et 9/05).

#### **Torcol fourmilier** *Jynx torquilla* Torcicollo

La seule observation dont nous disposons en 1994 concerne un oiseau bagué le 4/05. En 1995, les mentions sont plus nombreuses : 1 oiseau le 21/04 dans les dunes, 1 le 29/04, 1 chant le 4/05 à 6h30 dans le maquis, 1 chant le 5/05 (9h15 près du parking), suivi le même jour d'une capture (maquis/oliviers). Cet oiseau avait une plaque incubatrice, indice d'une reproduction probable sur le site (le mâle et la femelle ont une plaque incubatrice). Un oiseau est noté le 19/04/96 près de l'enclos des oliviers (en face de la maison), ainsi qu'une capture le 24/04/96.

## PASSEREAUX

### Alouettes

#### **Ammomane sp. *Ammomanes sp.***

Egaré d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, un oiseau répondant aux caractéristiques des ammomanes est observé les 26 et 27/04/96 par Bernard RECORBET au marais de Macinaggio. Une fiche d'observation a été transmise au Comité National d'Homologation, qui a rejeté l'observation (sous prétexte que l'espèce n'a pas été identifiée, mais seulement le genre). Il s'agirait de la première mention du genre pour la France.

#### **Alouette calandre *Melanocorypha calandra calandra***

Ces observations constituent la seconde mention pour le Cap Corse (1<sup>ère</sup> mention : un oiseau le 27/04/86 lors du camp de baguage de Barcaggio) et confirme la présence occasionnelle de cette espèce en Corse. La première observation est relevée le 26/04/94 à la lagune où un oiseau est vu. Une femelle (avec une possible plaque incubatrice !) est capturée au filet le 28/04. Deux oiseaux sont ensuite vus le 3/05 à la lagune (18h), enfin un chant bref est entendu le 4/05. Aucune observation n'est signalée en 1995 ni en 1996, malgré d'intenses prospections.

#### **Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* Calandrella**

Six oiseaux sont vus le 4/05/94. 3 oiseaux en migration sont signalés le 29/04/95 au dessus de la Giraglia et 2 posés le même jour sur un chemin à Barcaggio. En 1996, 4 ex. sont notés à Macinaggio le 8/04, 6 près des dunes le 16/04, 10 le 21/04 à la petite pointe à l'ouest du village, 1 le 26/04 à Macinaggio, 3 le 1/05, 1 le 11/05 sur le parking (7h35), 1 le 13/05 (parking). Un oiseau est capturé le 9/05/96.

#### **Alouette lulu *Lulula arborea* Tottavilla**

Des oiseaux sont notés durant tout le séjour, avec un maximum de 3 à 4 chants le 30/04/94. Des chanteurs isolés sont signalés à plusieurs reprises au mois d'avril 95, mais aucune observation n'est consignée en 1996 hormis une capture réalisée le 27/04.

#### **Alouette des champs *Alauda arvensis* Allodola**

Des oiseaux sont signalés en 1994 le 24/04, puis 2 le 12/05 et 1 le 15/05. En 1995, une seule observation d'environ 30 oiseaux est rapportée à Barcaggio, dans le champ près de la plage. En 1996, env. 15 oiseaux sont notés le 11/04, 10 le 18/04 (champs) et 1 le 1/05.

### Hirondelles

#### **Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Topino**

31 oiseaux sont capturés en 1994 au cours de 11 journées, 59 en 1995 au cours de 16 journées et 58 en 1996 (dont 54 en trois jours) pour 7 journées. Il ne semble pas se dégager de période de passage plus forte les deux premières années, sauf les 20 et 21/04/94 (17 oiseaux en deux jours), et du 4 au 6/05/95 (29 oiseaux en trois jours). Par contre on note une forte migration durant trois jours en 1996 : les 28, 29 et 30/04 avec respectivement 5, 38 et 10 oiseaux capturés.

#### **Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Rondine**

Cette espèce reste toujours en tête des captures réalisées à Barcaggio, même si 1994 et 1995 peuvent être considérées comme des "années médiocres", avec 725 oiseaux en 1994, 825 en 1995, contrairement aux 1385 oiseaux bagués en 1996 (voir déroulement de la migration par ailleurs). On a supposé que le nombre de captures relativement faible en 1994 et 1995 pouvait être expliqué par l'utilisation de filets moins performants pour la capture de ces oiseaux (filets "italiens" à grandes mailles et fil épais). Cette hypothèse est de toute évidence rejetée en 1996 compte tenu du nombre important de captures réalisé en utilisant les mêmes filets (néanmoins un peu plus endommagés chaque année).

En 1994, on remarque le plus gros passage du 19 au 23/04, interrompu le 22 par un coup de vent fort du sud-est. En 4 jours (sans prendre en compte la journée du 22) 365 oiseaux sont bagués, représentant la moitié du total de la saison.

En 1995, deux pics migratoires semblent se différencier, le premier du 28/04 au 1/05 (407 oiseaux en quatre jours), le second, moins important, du 4 au 6/05 (165 oiseaux en trois

jours). Des observations de milliers d'oiseaux sont signalées le 29/04/95 en mer et sur terre à Macinaggio, Bargaggio et la Giraglia.

En 1996, 1385 oiseaux ont été bagués (1101 en avril, 284 en mai). Un seul pic de migration est visible du 27/04 au 2/05 (1180 oiseaux en 6 jours - soit 85% des captures de cette espèce), avec son point culminant le 29/04 où 574 hirondelles sont baguées. Ce record d'hirondelles rustiques capturées en un jour vient pulvériser celui du 29/04/91 où "seulement" 266 hirondelles avaient été baguées.

Les reprises suivantes sont effectuées :

- bagues anglaises : 4/05/94 et 28/04/95
- bague espagnole : 21/04/94
- bagues italiennes : 16/04/95, 29/04/95, 29/04/96
- bague croate : oiseau capturé le 29/04/96 et bagué le 7/09/95 à Karlovac (45° 34 N ; 15° 38 E).

#### **Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* Rondine rossiccia**

La seule mention pour 1994 concerne un oiseau capturé le 4/05. Les observations sont plus nombreuses les deux années suivantes ; en 1995 : 2 le 14/04 (rivière), 1 le 16/04 (14h), 1 le 19/04, 1 le 25/04 (17h45), 1 le 29/04 (maquis), 2 le 10/05 (9h), deux oiseaux sont également capturés le 9/05/95 ; en 1996 : 5 le 12 et le 13/04, 3 le 18/04 entre Barcaggio et Tollare, 1 le 19/04, 1 le 1/05, 1 le 1/05 à Macinaggio, 2 le 4/05 (deux mentions de deux oiseaux : le matin et à 15h30), 1 le 13/05 ; 5 captures sont enregistrées : 1 le 28/04, 3 le 29/04, 1 le 1/05.

#### **Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* Balestruccio**

Seulement 4 oiseaux sont capturés en 1994, 34 en 1995 (4 en avril, 30 en mai) et 22 en 1996 (dont 15 le 29/04). Les années précédentes avaient donné des tableaux de capture plus importants : 43 en 1993, 110 en 1992, 129 en 1991. Signalons également une observation précoce de deux oiseaux le 4/02/96 au dessus des toits du village de Macinaggio.

#### **Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* Rondine montana**

2 oiseaux sont observés le 29/04/95 à la Giraglia où l'espèce niche. 1 ex. est vu à la tour d'Agnello le 16/04/96 et 1 le 17/04/96.

### **Pipits, bergeronnettes et troglodyte**

#### **Pipit rousseline *Anthus campestris* Calandro**

Cette espèce est très régulièrement observée tant en 1994 qu'en 1995, même si les registres d'observations ne révèlent que quelques données. Nous considérerons que ce défaut de mentions est dû à une certaine lassitude des ornithologues à noter des oiseaux "communs". Deux oiseaux sont toutefois capturés les 2 et 8/05/95. En 1996, les mentions semblent avoir été plus rigoureuses : 1 le 13/04, puis 3, notés le 14/04, 4 près de la tour d'Agnello le 21/04, 1 le 2/05 à 19h sur la plage de galets près de la mare, 1 le 15/05 sur la plage à 6h30. Un oiseau est également capturé le 7/05/96.

#### **Pipit des arbres *Anthus trivialis* Prispolone**

Quelques oiseaux sont notés le 28/04/94 et plusieurs passages le 1/05/94. Cette même année, 9 captures sont enregistrées, toutes en avril. En 1995, 1 oiseau est entendu le 29/04 à Capandula et 2 à Barcaggio ; 4 oiseaux sont signalés le lendemain en migration à Barcaggio ; 24 oiseaux sont capturés (10 en avril, 14 en mai). En 1996, des mentions sont signalées uniquement au mois d'avril (1 ou "quelques" oiseaux) ; 14 captures sont enregistrées (10 en avril, 4 en mai).

#### **Pipit farlouse *Anthus pratensis* Pispola**

Un oiseau est observé le 28/04/94 près de la mare du chemin, alors qu'une capture est réalisée le 4/05/94. En 1995, 1 oiseau est vu le 16/04, 4 le 29/04 à Barcaggio et 1 le 28/04 à Macinaggio, 2 oiseaux sont par ailleurs capturés. En 1996, env. 20 oiseaux sont vus le 14/04 et l'espèce est notée le 18/04. 4 oiseaux sont par ailleurs capturés dans le courant du mois d'avril 1996.

**Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus* Pispola golarossa

Un oiseau est vu à la lagune les 30/04, 4/05/94. En 1995, 1 oiseau est noté à la lagune le 20/04, 2 le 29/04, 1 les 3, 4 et 6/05, 2 à la lagune (6h-8h) puis 5 (10h10) le 8/05. Un oiseau est capturé le 23/04. En 1996, 1 oiseau est mentionné le 21/04 (lagune), 1 le 22/04, 2 le 24/04 à la lagune + 1 sur le chemin du maquis, 1 le 26/04 et 6 le 1/05. Des observations complémentaires ont été réalisées à Macinaggio : 5 le 26/04/94 et 10 le 4/05/94, 1 le 8/05/95, 11 le 26/04/96, 9 le 27/04/96, 6 le 30/04/96, 6 le 1/05/96.

**Pipit spioncelle** *Anthus spinoletta* spioncello

Seules quelques observations sont signalées : 2 oiseaux (migrateurs) le 29/04/95, ainsi que quelques captures (2 le 16, 1 le 17/04/95 ; 1 le 20/04 et 1 le 3/05/96) et l'espèce est notée le 18/04/96.

**Pipit sp.** *Anthus sp.*

Un pipit non déterminé est noté le 26/03, 4 autres le 16/04/94. On nous a signalé le passage de plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux le 11/04/96 à 23h, pendant 1h. On pense que cette mention se rapporte à des pipits plutôt qu'à des pinsons, tel que nous l'avait indiqué l'observateur qui n'est pas ornithologue.

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* Cutrettola

Observée tous les jours en nombre très variable, les observations suivantes méritent d'être reportées :

1994 : 10 le 10/04 (ainsi que 10 le même jour à Macinaggio), 25 à 30 le 29/04, plus de 20 le 30/04, environ 70 le 4/05 à 6h30 dans le champ labouré, puis plus de 200 dans la matinée au même endroit, 20 à 30 le 9/05

1995 : 5 le 2/04 à Macinaggio, nombreuses le 15/04, environ 70 le 4/05 avec les vaches, environ 25 en vol le 12/05

1996 : 1 le 23/03, 3 le 10/04, env. 10 le 20/04, env. 60 le 10/05 qui s'envolent du pré aux vaches à 6h30 en direction de la mer (nord).

Par ailleurs, 23 captures sont réalisées en 1994 : 15 en avril, 8 en mai ; 30 en 1995 : 17 en avril, 13 en mai ; 100 en 1996 : 27 en avril, 73 en mai.

La sous-espèce largement majoritaire dans les observations serait la ssp. *cinereocapilla* ou un intermédiaire entre *flava* et *cinereocapilla*. 3 *flava* type ainsi qu'un mâle *thunbergi* sont toutefois observés le 28/04/95 à Macinaggio, 2 *flava* et 1 *cinereocapilla* le 13/04, ssp. *cinereocapilla*, *flava* et *iberiae* le 1/05/96, 1 mâle de *feldegg* le 10/05/96 à 14h30.

Un oiseau (ssp. *iberiae*) avec une bague italienne est capturé le 6/05/96.

**Bergeronnette grise** *Motacilla alba* Ballerina bianca

Hivernant attardé, un oiseau (le même ?) est observé en 1994 du 27/04 au 11/05, ainsi qu'une capture réalisée le 21/04. Une observation en date du 26/03/94 (un oiseau) nous est rapportée. En 1995, 1 oiseau est vu les 16 et 25/04, ainsi que 2 le 29/04 à la lagune. En 1996, 1 oiseau est noté les 17, 22, 30/04 et 15/05, toujours sur le parking ou à proximité. Un oiseau est capturé le 7/05/96.

**Bergeronnette des ruisseaux** *Motacilla cinerea* Ballerina gialla

La seule observation concerne une capture réalisée le 27/04/95. Il s'agit peut être d'un oiseau nichant en amont dans le torrent, qui aurait été perturbé par la crue dont les premiers signes ont été visibles le 25/04, les marais se remplissant par la suite alors qu'ils étaient secs auparavant.

**Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* Scricciolo

Des chanteurs sont entendus durant les trois séjours. Une capture est réalisée le 30/04/94, 4 en 1995 (1 oiseau les 23 et 29/04, 2 le 28/04). Aucune bague n'est posée en 1996, mais un oiseau bagué le 28/04/95 est contrôlé le 15/05/96 et un autre bagué le 23/04/95 est repris plusieurs fois en 1996 : 16 et 18/04 et 9/05.

**Turdidés****Accenteur mouchet** *Prunella modularis* Passera scopaiola

Rare à cette époque de l'année, un sujet est capturé au filet le 19/04/94. 5 oiseaux sont également capturés en 1995 : 3 le 16/04, 1 les 17 et 18/04, ainsi que 2 les 16 et 17/04/96.

**Rougegorge familier *Erithacus rubecula* Pettiroso**

Il est noté régulièrement en avril, moins souvent en mai (les observations du mois de mai correspondraient peut être à des nicheurs ?). 13 captures sont réalisées en 1994 (11 en avril, 2 en mai) et 131 en 1995, dont 115 du 16 au 19/04, indice d'un passage très important durant cette période, bien qu'elle soit tardive. 41 oiseaux sont capturés en 1996. Un oiseau bagué le 1/05/94 est contrôlé le 2/05/95 (nicheur ou en migration ?)

**Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* Usignolo**

Des chanteurs sont répertoriés tous les jours. En 1994, 16 captures sont réalisées, dont 10 en avril. 27 oiseaux sont capturés en 1995, dont 24 en avril (maximum de 5 captures le 19/04). 1996 : 32 captures sont effectuées (dont 25 en avril).

**Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* Codirosso spazzacamino**

Les seules mentions réalisées concernent 4 oiseaux le 8/04/96 à Macinaggio et une femelle (détermination certaine) observée le 21/04/96 sur le parking de Barcaggio, ce qui constitue une date relativement tardive pour cette espèce.

**Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* Codirosso**

Cette espèce est observée régulièrement durant tout les séjours. En 1994, la première observation est datée du 26/03. 35 captures sont réalisées : 16 en avril, 19 en mai, avec un maximum de 5 oiseaux le 4/05. 56 oiseaux sont capturés en 1995 (34 en avril, 22 en mai) et 38 en 1996, de manière assez régulière.

**Tarier des prés *Saxicola rubetra* Stiaccino**

En 1994, les observations sont régulières, par groupes de quelques oiseaux à plusieurs dizaines. Il semble que des passages importants soient notés les 24/04 et 1/05. 14 captures sont faites, dont 8 en avril.

En 1995, des observations remarquables sont réalisées : une centaine le 24/04 dans la plaine, plus de 50 le 5/05 sur le chemin de la lagune. 82 oiseaux sont capturés (34 en avril, 48 en mai), avec des pics de 15 captures le 25/04, 14 le 5/05 et 15 le 6/05.

En 1996, les mentions paraissent plus rares (première mention le 24/03), mais le nombre de captures est voisin de celui de l'année précédente (81 captures, dont 52 en avril). On note un nombre de captures important les 28 et 30/04 avec respectivement 17 et 18 oiseaux.

Malgré le nombre relativement important de captures en 1995 et 1996, un seul oiseau a pu être repris au filet dans le cadre de nos contrôles, hormis les oiseaux bagués et repris le même jour (bagué le 25/04/95, repris le lendemain). Compte tenu de cela on pourrait penser que ces oiseaux ne stationnent pas plus d'une journée, ou même de quelques heures sur le site.

**Tarier pâtre *Saxicola torquata* Saltipalo**

Seulement 4 mentions sont relevées en 1994 (1 oiseau les 19, 20 et 27/04 et 7/05), alors que les observations réelles doivent être plus nombreuses. Mêmes remarques pour 1995 et 1996, où le registre d'observations ne mentionne qu'un oiseau le 18/04/95 et 1 le 18/04/96.

**Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Culbianco**

Observé du 15/04 au 9/05/94, le passage le plus important est relevé le 1/05/94. 3 captures sont réalisées : 2 le 28/04, 1 le 4/05. L'espèce est observée régulièrement en 1995 ; à noter : 1 mâle très blanc le 19/04. 4 oiseaux sont également capturés. En 1996, nous disposons également de mentions régulières durant tout le séjour de 1 à 3 oiseaux, mais ils ont été "très nombreux" le 14/04. 3 oiseaux sont capturés en 1996.

**Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* Monachella**

Seules deux observations sont signalées : une femelle le 1/05/96 à Macinaggio et un oiseau près de la plage de galets le 12/05/96 à 9h et à 18h30. La dernière mention de cet oiseau pour Barcaggio date, à notre connaissance, de 1993. L'espèce était beaucoup plus fréquente lors des premiers camps de baguage (début des années 80).

**Merle bleu *Monticola solitarius* Passero solitario**

Un oiseau est répertorié sur le Giraglia le 2/05/94. L'espèce est notée les 29/04 et 3/05/95 à la Tour. Un à deux mâles chanteurs sont observés sur Giraglia le 29/04/95, ainsi qu'un mâle sur Finocchiarola à la même date. En 1996, un oiseau est vu trois fois à la tour d'Agello où on pense qu'il niche : 7, 16 et 20/04.

**Merle à plastron** *Turdus torquatus* Merlo dal collare

Un oiseau est observé le 19/04/94 dans la vallée, près de la rivière (en amont de la maison) et un couple le 16/04/95 près de la Tour, site que l'espèce semble affectionner, puisque plusieurs mentions concernent cette localité les années précédentes. Une observation est relevée en 1996, le 12/04.

**Merle noir** *Turdus merula* Merlo

13 captures sont réalisées en 1994 + 4 contrôles (10 mâles et 7 femelles), 20 en 1995 + 2 contrôles (9 femelles, dont une jeune de l'année et 13 mâles dont des 2<sup>ème</sup> année) et 6 en 1996 + 1 contrôle. Il est probable que les captures ne concernent que des locaux, comme en témoignent les contrôles suivants :

- 1 mâle bagué le 15/04/91, contrôlé les 21, 22/04 et 6/05/95
- 1 mâle (+ de 2 ans) bagué le 22/04/91, contrôlé le 2/05/94
- 1 femelle baguée le 15/05/92 (plaque incubatrice) contrôlée le 20/04/94
- 1 femelle baguée le 17/04/93, contrôlée le 5/05/94
- 1 mâle bagué le 23/04/94, contrôlé les 19/04 et 11/05/95, ainsi que le 18/04/96.

Signalons également le contrôle d'un oiseau bagué à Ville di Pietrabugno le 12/03/91 (mâle de plus de deux ans) et contrôlé le 23/04/94 à Barcaggio. Cette mention met en évidence le déplacement d'un mâle adulte d'une quarantaine de kilomètres (en ligne droite) vers le nord entre une période hivernale et une période de probable reproduction.

Compte tenu des captures et des contrôles, on peut dire qu'il y avait au moins 9 couples sur le site en 1994 et 13 couples en 1995 (saulaie, maquis et marais, sauf lagune : 1 oiseau capturé chaque année) ; les informations ne semblent pas assez nombreuses en 1996 pour estimer la population de nicheurs.

**Grive musicienne** *Turdus philomelos* Tordo bottaccio

En 1994, nous relevons six observations entre le 18/04 et le 10/05. Alors qu'un chant est entendu les 27/04 et 10/05, 50 oiseaux sont observés le 19/04, révélant un passage important ce jour là. Les trois autres mentions concernent des oiseaux isolés. 4 captures sont réalisées : 19, 24, 26/04 et 15/05. En 1995 de nombreux oiseaux sont observés le 15/04 derrière la maison. Seulement 4 oiseaux sont capturés. Nous ne relevons que deux observations en 1996 : env. 20 ex. le 13/04 et 1 le 18/04, alors que 7 captures ont été réalisées.

**Grive mauvis** *Turdus iliacus* Tordo sassello

Deux oiseaux sont observés le 24/04/96 (oliviers en face de la maison, 10h20). Un oiseau est capturé le 21/04/96.

**Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets****Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* Usignolo di fiume

Un oiseau chanteur est entendu les 21 et 22/04/96. Il faut remonter à 1983 pour retrouver une mention de cette espèce (plusieurs chanteurs et 2 captures), alors qu'elle est omniprésente en Corse dans les ripisylves. Le fait qu'elle n'ait pas été entendue plus fréquemment, et notamment en mai, laisse perplexe quant à sa reproduction sur le site. Pourrait-il s'agir d'un oiseau erratique ou d'un migrateur, alors qu'elle est réputée comme sédentaire ?

**Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* Beccamoschino

Un oiseau est vu et entendu les 18 et 19/04/96 dans le champ devant la maison, ce qui correspond tout à fait à son biotope. Pourtant, les mentions de cet oiseau sont très rares à Barcaggio (quelques mentions en 1989 et irrégulièrement les années précédentes). On pense que les observations concernant cette espèce à Barcaggio pourraient se rapporter (jusqu'à présent) à des oiseaux non sédentaires. L'espèce est par ailleurs mentionnée à Macinaggio (1 les 10 et 23/04/94, ainsi qu'une le 8/05/95).

**Locustelle tachetée** *Locustella naevia* Forapaglie macchiettato

17 mentions sont consignées entre le 18/04 et le 12/05/94, concernant le plus souvent un chanteur entendu tôt le matin, entre 6h et 8h. Maximums relevés : 2 chants le 27/04, 2 à 4 le 30/04, 3 le 4/05, 2 le 5/05. Deux captures sont réalisées : 30/04 et 7/05. En 1995, le

premier chant est entendu le 19/04, le dernier le 11/05. Deux chanteurs distincts sont entendus les 28/04 et 3/05. 3 oiseaux sont capturés : 28, 30/04 et 1/05. En 1996 des chanteurs sont notés à plusieurs reprises : 1 les 30/04, 4, 8, 13 et 14/05, toujours entre 6h et 8h30 du matin, le plus souvent dans le maquis. 2 oiseaux sont bagués : 18/04 et 7/05.

**Locustelle luscinoïde** *Locustella luscinioides* Salciaiola

Les seules mentions concernent deux oiseaux capturés les 5/05/95 et 20/04/96. Il s'agit des premières mentions certaines de cette espèce à Barcaggio (locustelles signalées comme indéterminées certaines années). Un chanteur aurait été identifié le 6/05/91 à Macinaggio.

**Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* Forapaglia

En 1994, un chanteur est noté les 27 et 28/04, plusieurs les 15/04 et 15/05. 14 captures sont réalisées, réparties équitablement sur avril et mai. En 1995, 27 oiseaux sont capturés (10 en avril, 17 en mai). Plusieurs observations concernant des oiseaux chanteurs sont rapportées pour 1996 : 1 le 13/04, 1 le 5/05 (maquis, 7h15), cris le 6/05 (maquis 6h-8h), 1 le 7/05, 1 le 8/05, 1 le 15/05 (rivière, 11h). 42 captures sont réalisées en 1996, ce qui constitue un record pour cette espèce à Barcaggio. On note un passage plus fort les 28 et 29/04/96 (respectivement 7 et 9 captures). Un oiseau bagué le 28/04/96 est contrôlé les 3, 4 et 6/05, indiquant le stationnement de cet oiseau durant au moins 9 jours. L'essentiel des captures est réalisé à la lagune.

Nous observons que quelques oiseaux capturés sont touchés par des excroissances sur les tarses (papillomatose) à l'instar des pinsons.

**Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* Cannaiola

En 1994, un chant est entendu les 10/05 et 15/05 et 6 oiseaux sont bagués : 1 en avril, 5 en mai. 13 oiseaux sont capturés en 1995 (dont 12 en mai) et 8 en 1996 (dont 7 en mai).

**Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* Cannareccione

13 mentions, concernant des contacts auditifs sont répertoriées en 1994 entre le 15/04 et le 14/05. Il s'agit presque exclusivement d'un seul chanteur, sauf le 14/05 où trois oiseaux différents sont localisés, dont un est "poussé" dans un filet. Un contact (le 10/05 à 9h30) concerne un oiseau entendu à Tollare. 15 captures sont réalisées : 3 en avril, 12 en mai. 8 oiseaux sont bagués entre le 4 et le 9/05, attestant d'un passage relativement important entre ces deux dates. En 1995, 1 ou 2 chanteurs sont notés pratiquement tous les jours et 30 captures sont réalisées (10 en avril, 20 en mai). Les mentions sont moins nombreuses en 1996 : 1 chanteur le 7/04 à Tollare, 2 le 14/04, 1 le 19/04, 2 le 21/04, noté les 3 et 7/05 ; 20 oiseaux sont capturés (dont 15 en avril). L'oiseau ayant stationné le plus longtemps a été bagué le 25/04/96 et repris le 2/05, soit 8 jours après.

**Hypolaïs icterine** *Hippolais icterina* Canapino maggiore

En 1994, plusieurs oiseaux sont observés dans les saules le 14/05, date à laquelle 8 d'entre eux sont capturés au filet. 6 autres captures sont réalisées le 7/05. Toutes les captures, 21 au total, sont effectuées en mai (première capture le 5/05, dernière le 14/05). En 1995, 19 captures sont répertoriées, également toutes en mai (la première le 5/05). Seulement 5 oiseaux sont capturés en 1996 (27 et 28/04, 4, 11 et 12/05).

**Hypolaïs polyglotte** *Hippolais polyglotta* Canapino

Deux oiseaux sont capturés les 26/04 et 8/05/96. Les mentions de cette espèce sont assez rares pour Barcaggio : entendu en 1982, 1 capture en 1993.

**Fauvette sarde** *Sylvia sarda* Magnanina sarda

Nicheur local, des oiseaux sont observés régulièrement. Un nourrissage est noté le 30/04/94 et un transport de matériaux le 3/05/95 à la Tour. Deux oiseaux sont capturés le 22/04/95.

**Fauvette pitchou** *Sylvia undata* Magnanina

Seules de rares observations sont mentionnées, mettant certainement en évidence l'absence de prospection des territoires favorables à l'espèce : 1 le 26/04/94, 3 le 8/05/95, 2 couples le 19/04/96.

**Fauvette à lunettes** *Sylvia conspicillata* Sterpazzola di Sardegna

La seule mention de cette espèce concerne un oiseau vu à Tamarone le 2/04/95.

**Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* Sterpazzolina**

En 1994, un mâle territorial est observé à Tollare le 10/05 à 9h30. Deux autres mâles territoriaux sont repérés entre le parking et le camp, du 8 au 11/05. 11 captures sont réalisées : 8 en avril, 3 en mai. 46 oiseaux sont capturés en 1995 (23 pour chaque quinzaine). En 1996, 44 oiseaux sont bagués, dont 32 dans le courant du mois de mai. Un oiseau bagué le 24/04/96 est repris le 3/05 (10 jours après).

**Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* Occhiocotto**

Nicheur local, plusieurs oiseaux sont vus chaque jour. Un nourrissage est à noter le 30/04/94. 17 captures sont réalisées en 1994 + 4 contrôles d'oiseaux bagués antérieurement (14 mâles et 7 femelles), 20 en 1995 + 5 contrôles (14 mâles et 11 femelles) et 25 en 1996 (12 mâles et 13 femelles). Certains des oiseaux bagués durant chaque séjour, sont contrôlés assez régulièrement.

En plaçant les filets aux mêmes endroits durant les trois années (saulaie et maquis, en excluant la lagune et la mare), au moins 13 couples différents (bague ou contrôle du mâle ou de la femelle) sont recensés en 1994, 14 en 1995 ainsi qu'en 1996. La superficie du site de capture a été évaluée à moins de 10 ha, ce qui donnerait une densité très importante par rapport à ce qui est connu pour la nidification de cette espèce en Corse. Reste à savoir si tous ces couples sont bien nicheurs dans le secteur délimité incluant les filets ou s'il s'agit aussi d'oiseaux venant de plus loin (nicheurs ou pas), réalisant un chevauchement important de territoire avec les nicheurs de la zone (recherche de nourriture ?).

Les contrôles suivants ont été réalisés :

- 1 mâle bagué le 5/05/93, contrôlé le 24/04/94, le 5/05/95 et les 7 et 8/05/96
- 1 mâle bagué le 16/04/93, contrôlé les 19/04, 7/05/94, 3 et 10/05/95
- 1 femelle baguée le 16/04/92, contrôlée les 18/04 et 15/05/94
- 1 femelle baguée le 19/04/92, contrôlée le 6/05/94
- 1 mâle bagué le 8/05/92, contrôlé le 4/05/95
- 1 femelle baguée le 20/04/94, contrôlée le 23/04/95
- 1 mâle bagué le 27/04/92, contrôlé le 9/05/95.
- 1 femelle baguée le 16/04/95, contrôlée les 17, 23/04 et 1/05/96
- un mâle bagué le 18/04/88, contrôlé le 15/05/96, soit une longévité d'au moins 9 ans, ce qui peut être considéré comme un record pour cette espèce.

**Fauvette grisette *Sylvia communis* Sterpazzola**

48 captures sont réalisées en 1994 : 14 en avril, 34 en mai. Elle a été contactée au filet au cours de 6 jours en avril et 12 jours en mai, avec notamment 24 captures du 5 au 12/04 et 7 oiseaux le 1/05.

En 1995, les résultats sont nettement supérieurs puisque le nombre de captures s'élève à 139 (29 en avril, 110 en mai). Le maximum du passage migratoire est enregistré du 5 au 9/05 où 92 oiseaux sont bagués en cinq jours. En 1995, on note une grosse arrivée le 5/05 (observations), corroboré par le nombre de captures enregistré ces jours là : 13 le 5/05, 35 le 6/05, 25 le 7/05, soit 73 oiseaux en trois jours, pour un nombre total de captures de 139 (plus de 50%).

En 1996, 49 oiseaux sont bagués dont 31 en avril avec une maximum de 10 captures le 30/04. Les reprises dans le courant de cette saison montrent que les oiseaux ne stationnent pas plus de trois jours sur le site.

**Fauvette des jardins *Sylvia borin* Beccafico**

73 oiseaux sont bagués en 1994 (60 en mai) dont 17 le 14/05. En 1995, 98 oiseaux sont bagués, dont 84 en mai. Un pic de migration est bien visible les 9, 10 et 11/05 où 47 oiseaux sont capturés en trois jours. En 1996, nous comptabilisons 136 captures, le précédent record étant de 103 oiseaux en 1992. En 1996, les captures sont réparties du 24/04 au 15/05, avec un passage plus marqué entre le 25 et le 30 avril (67 captures en 6 jours). Les contrôles de cette espèce durant la saison 1996 (au nombre de 10) montrent que les oiseaux restent 1 ou 2 jours sur le site, sauf pour deux oiseaux qui sont restés 3 et 5 jours.

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* Capinera

223 captures sont comptabilisées en 1994 : 194 en avril, 29 en mai, dont 32 le 19/04 et 24 le 21/04. Le passage semble continu tout le mois d'avril, avec un flux migratoire plus important du 17 au 21/04 (107 oiseaux en cinq jours). La dernière capture est effectuée le 9/05.

En 1995, 107 oiseaux sont bagués (82 en avril, 25 en mai), mais le passage paraît plus étalé sur la durée du séjour, même si deux pics peuvent se dégager, du 17 au 21/04 (34 oiseaux en cinq jours) et du 28 au 30/04 (30 oiseaux en trois jours), et deux jours au mois de mai : 5 captures le 2/05, 6 le 5/05. Il est noté que les oiseaux capturés au début du séjour, aussi bien en 1994 qu'en 1995, avaient une adiposité élevée.

En 1996, nous notons 151 captures (41 mâles, 109 femelles, 1 non noté) dont 122 en avril (dont 15 le 17/04 et 21 le 26/04). On notera particulièrement le contrôle de trois oiseaux, l'un bagué le 16/04 et repris le 27/04, le second bagué le 16/04 et repris le 26/04 et enfin un bagué le 17/04 et repris le 27/04. Ces trois oiseaux sont ainsi restés une dizaine de jours à Barcaggio (plusieurs contrôles d'oiseaux repris deux ou trois jours après leur baguage sont également mentionnés).

**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* Lui verte

1994 : 39 captures (17 en avril, 22 en mai)

1995 : 81 captures (39 en avril, 42 en mai)

1996 : 176 captures (155 en avril, 21 en mai)

La migration de cette espèce semble être homogène durant la période considérée en 1994 et 1995, avec cependant un record de capture le 23/04/95 avec 16 oiseaux. En 1996, on note un passage très important du 24 au 29/04 (120 oiseaux en 6 jours, avec le point culminant le 26 : 32 captures). Des effectifs similaires avaient été notés en 1992 (138 captures) et en 1993 (166 captures). Si le passage migratoire le plus fort était également signalé en avril pour 1993, il l'était en mai pour 1992.

En 1996, 23 oiseaux ont été repris une ou plusieurs fois durant le séjour. L'analyse de ces données montre que pour 21 cas sur 23 (dont 17 bagués uniquement les 24, 25, 26 et 27/04), ces oiseaux ont été repris le lendemain ou le surlendemain de leur baguage. Les deux "trainards" sont restés 4 et 6 jours. Ce dernier, bagué le 29/04, a été repris les 30/04, 2, 3 et 5/05, même parfois à plusieurs reprises dans la journée.

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* Lui piccolo

1994 : 20 captures (16 en avril, 4 en mai)

1995 : 13 captures (10 en avril, 3 en mai)

1996 : 21 captures (18 en avril, 3 en mai)

Les captures s'étalent durant tout le mois d'avril, pour n'être plus qu'anecdotique en mai (fin du passage migratoire pour cette espèce). Le dernier oiseau est bagué les 8/05/94, 7/05/95 (aucune mention du 22/04 au 5/05/95) et 12/05/96 (aucune mention du 5 au 11/05).

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* Lui grosso

1994 : 292 captures (235 en avril, 57 en mai) avec comme maximum : 26 le 21/04, 30 le 23/04, 39 le 28/04, 42 le 30/04 (beaucoup de pouillots sont observés dans les arbres ce jour là), 19 le 1/05. Un flux migratoire continu est visible du 19/04 au 1/05 où 249 oiseaux sont bagués en 13 jours, avec un trou le 22/04 (2 oiseaux bagués) à cause du vent fort, et le 26/04 (4 oiseaux bagués) peut-être en raison du déplacement vers le sud d'une perturbation qui a occasionné une pluie intermittente forte la veille.

1995 : 176 captures : 95 en avril, 81 en mai. Hormis le 19/04 (11 oiseaux bagués) et le 22/04 (14 oiseaux bagués), il semble que la migration ait battu son plein entre le 28/04 et le 6/05 où 107 oiseaux ont été bagués en 9 jours.

1996 : 179 captures : 93 en avril, 86 en mai. Le passage le plus important semble s'être déroulé du 24 au 29 avril (72 oiseaux en 6 jours). De nombreux oiseaux sont également notés le 14/04 dans la saulaie, sans que cela ne se fasse ressentir au niveau des captures.

Deux oiseaux avec une bague norvégienne sont capturés les 28/04/94 et 6/05/95. Il s'agissait dans les deux cas d'un oiseau pâle avec une aile pliée de 69 mm pour le premier et 65 mm pour le second.

**Roitelet triple bandeau** *Regulus ignicapillus* Fiorrancino

Un oiseau est entendu le 10/05/94 à 9h30 près de Tollare, plusieurs le 11/05/94 dans la vallée. Un chant est également entendu les 18/04, 6 et 9/05/95. Aucune observation n'a été consignée dans le cahier pour 1996 (bizarre !...).

## Gobemouches

### Gobemouche gris *Muscicapa striata* Pigliamosche

En 1994, la première mention de l'espèce est relevée le 23/04 (2 oiseaux), date à laquelle la première capture est réalisée. 54 oiseaux ont été bagués en 1994 (12 en avril, 42 en mai), avec au maximum 15 oiseaux le 9/05 et 12 le 14/05. En 1995, la première capture est faite également le 23/04. 48 oiseaux sont bagués durant le séjour. 1996 : 61 captures (44 oiseaux en avril et 17 en mai). La première capture est réalisée le 25 avril. On note un passage plus important les 26, 27 et 28 avril avec 32 captures en 3 jours, soit plus de la moitié de l'effectif total du séjour.

### Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* Balia nera

40 captures sont réalisées en 1994 : 28 en avril, 12 en mai, avec un maximum de 7 oiseaux le 25/04. En 1995, une observation remarquable d'une centaine d'oiseaux dans la plaine est à signaler le 24/04 ; cette date correspond également à l'observation d'une centaine de tariers des prés au même endroit. 62 oiseaux sont capturés durant le séjour, avec un maximum de 10 le 25/04. 1996 : le premier oiseau est vu dès le 13/04. 104 captures sont par ailleurs comptabilisées. Sur 6 oiseaux reconstrôlés en 1996 (ce qui est peu par rapport au nombre de captures), la plupart des oiseaux sont restés 1 à 3 jours, parfois 5 jours, et l'un d'entre eux bat le record avec 10 jours (oiseau contrôlé à 6 reprises !).

### Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* Balia dal collare

Un oiseau est capturé le 2/05/95 et les 24 et 27/04/96. Les précédentes mentions de cette espèce à Barcaggio concernent les années 1979, 1982, 1984, 1987, 1988 et 1991.

## Mésanges et espèces voisines

### Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* Codibugnolo

Nicheur local. Un oiseau est vu le 21/04/94 dans la saulaie, alors que 5 captures sont réalisées durant le séjour. En 1995, 4 oiseaux sont capturés (2 le 17/04, 1 les 20 et 22/04). 1996 : aucun oiseau bagué, mais un oiseau bagué le 17/04/95 est contrôlé le 28/04/96.

### Mésange bleue *Parus caeruleus* Cinciarella

Nicheur local. Seulement deux observations sont consignées en 1994 les 15 et 16/04, mais ces mésanges sont en réalité observées durant tout le séjour. Un oiseau nourrissant des jeunes sortis du nid est observé le 4/05. 5 captures sont réalisées en 1994, 11 en 1995 et 8 en 1996.

#### Contrôles :

- 1 mâle bagué en 1992, contrôlé le 6/05/94
- 1 mâle bagué le 25/04/92, contrôlé le 24/04/94
- 1 mâle bagué le 16/04/95, contrôlé les 24/04 et 5/05/96
- 1 femelle baguée le 16/04/95, contrôlée le 2/05/96 avec une plaque incubatrice
- 1 mâle bagué le 16/04/95, contrôlé les 17/04 et 2/05/96

### Mésange charbonnière *Parus major* Cinciallegra

4 oiseaux sont bagués en 1994, tous en avril, 14 en 1995 et 7 en 1996.

#### Contrôles :

- 1 mâle bagué en 1990 est contrôlé les 15/05/94, 20 et 25/04/95, soit une longévité d'au moins 5 ans.
- 1 femelle baguée le 17/04/93 est contrôlée le 20/04/94
- 1 mâle bagué le 20/04/94 est contrôlé le 30/04/95
- 1 mâle bagué le 17/04/93 est contrôlé le 12/05/95
- 1 mâle bagué le 17/04/95 est contrôlé le 17/04/96

### Rémiz penduline *Rémiz pendulinus* Pendolino

Deux observations sont signalées : 2 oiseaux le 30/04/95 à 14h, dont un vu depuis le matin ; 6 le 7/04/96.

## Loriot et Pies grièches

### Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* Rigogolo

L'espèce est signalée du 20/04 au 14/05/94 au cours de 17 journées (une ou plusieurs observations), le plus souvent localisée grâce à son chant. L'effectif record est d'au moins 7 oiseaux en vol au dessus de la saulaie le 27/04. 8 captures sont réalisées, dont une seule en mai. En 1995, la première observation est notée le 19/04 (chant) ; l'espèce est mentionnée au cours de 12 journées. Un maximum de 4 oiseaux est signalé le 24/04. 4 oiseaux sont capturés en 1995. En 1996, la première mention est notée le 19/04, puis régulièrement jusqu'à la fin du camp (vu ou chants), avec notamment 4 oiseaux (3 mâles, 1 femelle) le 23/04, au moins 4 le 1/05 (3 mâles, 1 femelle).

### Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* Averla piccola

Le premier oiseau de l'année 1994 (un mâle) est noté le 27/04 devant la maison, mais peu d'observations sont retranscrites sur le cahier de terrain : 1 le 9/05 (marais), 1 le 11/05, 2 le 14/05 (noté nicheur en été). En 1995, la première observation est notée le 29/04, puis régulièrement à partir de cette date. Un couple est vu le 4/05, ainsi qu'un accouplement le 9/05. En 1996, l'espèce semble être arrivée plus tardivement : 1 le 4/05. Une parade est par ailleurs observée le 6/05. 3 captures sont réalisées en 1994 (1 le 1/05, 2 le 15/05) et 4 en 1995 (6, 8, 10 et 12/05) et 10 en 1996 (1 les 6, 8, 10, 11 et 14/05, 2 le 15/05, 3 le 13/05).

Un mâle bagué le 15/05/94 est contrôlé le 11/05/95. Les deux captures ont été effectuées dans le maquis, indiquant peut être une fidélité au site de reproduction. Étant en présence d'un oiseau né au moins en 1993, les critères suivants ont été relevés (le 11/05/95), permettant ainsi de distinguer un oiseau de plus de deux ans (code EURING 6) : alula et grandes couvertures primaires neuves (muées). Grandes couvertures internes, petites couvertures, couvertures médianes, tertiaires et scapulaires largement bordées de brun roux. Vertex gris uniforme. 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> rémiges secondaires liserées comme les tertiaires, les autres beaucoup plus légèrement.

### Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* Averla capirossa

Six observations sont mentionnées en 1994, à chaque fois un seul oiseau : 18, 23, 25/04, 1, 10, 11/05. Deux oiseaux sont bagués les 27/04 et 9/05. En 1995, seules quatre observations sont retranscrites : 1 oiseau les 24 et 28/04, et 1 les 6 et 12/05. 5 oiseaux sont par ailleurs capturés (*L. s. senator* pour les captures des 12 et 15/05). La première observation pour 1996 est mentionnée le 1/05 (un mâle) et 7 oiseaux sont bagués (3 en avril, 4 en mai : *L. s. senator* pour les 5 premiers, non noté pour les deux autres).

## Corvidés

### Geai des chênes *Garrulus glandarius* Ghiandaia

Un oiseau est observé le 6/05/94 près de Granaggiolo, plusieurs sont notés le 11/05/94, une seule observation est relatée en 1995, le 4/05 (1 oiseau) et aucune à Barcaggio en 1996. L'absence de cette espèce dans la zone est certainement liée à la végétation (rareté des chênes), alors qu'il suffit de faire quelques kilomètres pour retrouver ces oiseaux (fréquents entre Macinaggio et Granaggiolo).

### Cornelle mantelée *Corvus corone cornix* Cornacchia grigia

Nous disposons de 5 mentions en 1994 : 3 oiseaux le 26/03, notée le 17/04, 5 le 18/04, 1 le 19/04, 3 le 20/04, 2 ou 3 le 23/04. Huit observations sont signalées en 1995, généralement 1 à 2 oiseaux, avec une exception le 26/04 où 7 oiseaux sont vus ensembles. L'espèce est notée une seule fois en 1996, 4 oiseaux le 2/05.

### Grand Corbeau *Corvus corax* Corvo imperiale

En 1994, un oiseau est observé les 17, 21 et 23/04, et 9/05, deux oiseaux les 10/05 (à Tollare) et 12/05. 5 oiseaux sont vus le 26/03 près de la décharge de Rogliano. 4 à 5 oiseaux venant d'éclore sont découverts le 24/04 dans le nid situé dans la falaise entre la plage et la tour d'Agnello (ce nid n'a pas été fréquenté en 1995 et 1996). Une observation remarquable pour la saison de 50 oiseaux (en amont de la maison) est signalée le 26/04/94. 1 à 2 oiseaux sont très régulièrement observés en 1995 (3 le 3/05), comme en 1996 (excepté le 18/04/96 avec env. 12 oiseaux sur les crêtes du radar).

**Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Storno**

Un oiseau est vu le 29/04/94 près de la plage. Un étourneau supposé sansonnet est vu le 26/04/95 et un adulte le 29/04 dans la saulaie. 30 oiseaux sont observés le 24/03/96 et 3 les 25 et 26/04/96.

**Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* Storno nero**

L'espèce est notée une seule fois le 17/04/94 à Barcaggio et les 30/04 et 1/05 à Macinaggio.

**Moineaux et fringilles****Moineau cisalpin *Passer italiae* Passera d'Italia**

Nicheur local. 4 captures sont réalisées en 1994, 1 en 1995 et 6 en 1996. L'oiseau capturé en 1995 présentait des traces grises sur la tête qui ont fait tout d'abord supposer à un hybride *domesticusXitaliae*, mais qui, après mûre réflexion, serait plutôt un mâle de seconde année. Un oiseau de type *espaniolensis* est par ailleurs observé le 2/05/95 sur le parking (19h) en compagnie de cisalpins.

**Moineau soulcie *Petronia petronia* Passera laggia**

Un oiseau est noté le 1/05/96 dans le village.

**Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Fringuello**

Des oiseaux sont observés quotidiennement. 21 captures sont réalisées en 1994 dont 4 seulement en avril et 17 en mai (6 mâles, 14 femelles, 1 non noté). 1995 : 6 en avril, 14 en mai, 10 mâles et 10 femelles. 1996 : 21 captures : 13 en avril et 8 en mai avec 12 mâles et 7 femelles.

**Serin cini *Serinus serinus* Verzellino**

Les principales mentions concernent des captures réalisées les 11/05/94, 27, 28/04 et 11/05/95, un oiseau à chaque fois ; un oiseau est vu le 1/05/96 et 2 captures sont réalisées les 17/04 et 15/05.

**Venturon corse *Serinus corsicanus* Venturone corso**

L'espèce est notée en 1994 les 26/03 (lagune), 17, 18 (lagune), 24/04 et 7/05. Une observation de 10 oiseaux est signalée le 26/04 à 8h à la lagune. 2 captures sont effectuées : 5/05 et 9/05. En 1995, seules deux observations sont répertoriées à Barcaggio le 29/04 : 2 oiseaux à la lagune (11h30), 3 le 8/05. 10 oiseaux sont par ailleurs notés le 2/04 à Tamarone. 3 oiseaux sont bagués. En 1996 l'espèce est notée le 14/04, 8 oiseaux sont vus le 21/04 à la tour et l'espèce est à nouveau notée le 1/05. Bien que les observations concernant cette espèce soient rarement reportées sur le carnet, le venturon est fréquent près des dunes.

**Verdier d'Europe *Carduelis chloris* Verdone**

9 oiseaux sont capturés et bagués en 1994 (6 en avril, 3 en mai), 4 en 1995 et 5 en 1996.

**Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* Cardellino**

Des groupes d'oiseaux sont observés régulièrement, sans que l'on sache s'il s'agit des mêmes, locaux ou migrants. 34 captures sont réalisées en 1994 : 16 en avril, 18 en mai (14 mâles, 16 femelles et 4 juvéniles), avec un maximum de six oiseaux le 20/04. En 1995, 71 oiseaux sont capturés, 34 en avril, 37 en mai (45 femelles dont 7 avec une plaque incubatrice, 24 mâles et 2 oiseaux non sexés), avec un maximum de captures les cinq premiers jours du camp (23 oiseaux en 5 jours). Signalons une observation d'environ 30 oiseaux le 11/05/95 dans le champ près de la plage où les chardons étaient en fleur. En 1996, les effectifs de cette espèce semblent avoir été plus faibles que les deux années précédentes : noté le 14/04, noté "+++" le 22/04 - ce qui veut certainement dire qu'il y en avait beaucoup par rapport aux autres jours - et 32 oiseaux capturés

**Contrôles :**

- une femelle baguée le 1/05/93 est contrôlée le 8/05/94
- une autre femelle baguée le 16/04/93 est contrôlée le 18/04/94
- une femelle baguée le 22/04/93 est contrôlée le 22/04/95
- un mâle bagué le 9/05/94 est contrôlé le 30/04/95
- un mâle bagué le 1/05/94 est contrôlé le 18/04/95
- une femelle baguée le 27/04/95 est contrôlée le 27/04/96

- une femelle baguée le 26/04/93 est contrôlée le 17/04/96

Une femelle baguée le 19/04/94 à Barcaggio est contrôlée le 1/05/94 à Capraia. Cette donnée, ainsi que le nombre relativement important de captures, contribue à penser que ces oiseaux sont certainement migrateurs en Méditerranée.

#### **Tarin des aulnes *Carduelis spinus* Lucherino**

Les observations suivantes sont réalisées en 1994 : environ 15 oiseaux le 19/04, 3 femelles et 1 mâle le 20/04, 3 oiseaux le 27/4, un groupe de 10 le 9/05, une dizaine durant toute la journée du 10/05, un groupe de 10 à 15 le 14/05 dans la saulaie. 7 captures sont effectuées : 2 en avril, 5 en mai. En 1995, environ 15 oiseaux sont observés le 15/04, environ 5 le 17/04 et 2 le 29/04. Deux oiseaux sont bagués les 17 et 18/04. 1996 : seule une mention concernant un oiseau bagué le 7/05 est signalée.

#### **Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* Fanello**

Les seules observations concernent un groupe d'une dizaine d'oiseaux le 21/04/94 dans le champ labouré, 2 oiseaux le 2/04/95 à Macinaggio et 20 à Tamarone, 2 le 25/04/95 et 5 le 6/05 à Barcaggio, ainsi qu'une capture le 6/05/95, et pour 1996 : 3 le 11/04, 1 le 13/04, 2 le 18/04 (maquis), le 20/04 et 1 le 1/05.

### **Grosbec et Bruants**

#### **Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* Frosone**

Deux captures sont réalisées en 1994 : 17/04 et 5/05, aucune en 1995 ni en 1996. Un oiseau est observé les 24/04/95 (dans la plaine) et le 25/04/95 (à la lagune).

#### **Bruant zizi *Emberiza cirrus* Zigolo nero**

Nicheur local. Des oiseaux sont régulièrement observés autour du camp. 5 captures sont effectuées en 1994 (toutes en avril), 5 en 1995 (3 en avril, 2 en mai) et 7 en 1996 (toutes en avril). Une femelle baguée le 30/04/93 est contrôlée le 10/05/94.

#### **Bruant ortolan *Emberiza hortulana* ortolano**

Nous disposons de quelques observations pour 1995 : 1 mâle et 1 femelle le 26/04 (13h, chemin saulaie), 1 mâle le 6/05 (champ plage), 1 femelle le 8/05 (lagune) et de deux captures les 25/04 et 4/05 (deux mâles) ; une observation le 1/05/96 à Macinaggio (un mâle) et une capture le 23/04/96 (une femelle).

#### **Bruant proyer *Miliaria calandra* Strilozzo**

Nicheur local, les observations sont très régulières notamment sur le chemin de la plage. 5 chanteurs distincts sont entendus le 27/04/95 dans le champ de la mare. Un oiseau est aussi prédaté dans un filet par un Busard des roseaux en 1995. Une capture est réalisée le 5/05/94, deux les 7 et 8/05/95 et 5 captures en 1996.

### **Espèce exotique**

#### **Merle métallique pourpré *Lamprotornis purpureus* Storno splendente**

Date de la capture : 9 mai 1995 (10h30). [observation homologuée par le Comité d'Homologation National (CHN)].

Comme l'espèce n'avait pu être déterminée de façon certaine lors de la capture, cet oiseau n'a pas été bagué. Par contre un oiseau de la même espèce a été capturé et bagué à Giannutri (Italie) la même année, dans le cadre du programme Piccole Isole.

#### Description de l'oiseau :

Aile pliée : 157 ; tarse : 35,4 ; bec : 31,35 ; adiposité : 3 (code EURING) ; masse : 112.

L'aile pliée arrive 1 cm en deça de la pointe des rectrices ; iris jaune vif ; tarses et bec noirs. Il manque l'ongle droit (doigt le plus externe) de la patte droite.

Couvertures auriculaires noires ; tête bleue "électrique ou métallique" ; vertex à reflets violets, reflets bleus à l'arrière du crâne. Gorge bleue à reflets violets. Poitrine bleue "métallique". Dessous de la même couleur que la tête ; base des plumes du ventre gris-noir ; croupion de la même couleur que la tête. Rectrices bleues à reflets violets ; rémiges, grandes couvertures internes et couvertures médianes vertes "métalliques" sur le dessus. Dessous des rémiges, des rectrices et des grandes couvertures sous-alaires noir délavé. Sous caudales, couvertures axillaires et couvertures médianes bleues "métallique". Couvertures primaires, alula, petites couvertures bleu foncé "métallique". Couvertures médianes et grandes couvertures internes avec des pointes sombres. Vexille interne des grandes couvertures bleu (plus sombre que "métallique"). Vexille externe des grandes couvertures vert. Plumage entièrement neuf.

L'oiseau a poussé un cri bref rauque, quelques instants avant de se prendre au filet. Des fientes ont été recueillies et sont conservées (analyse du régime alimentaire ?).


Oiseau d'origine de l'Afrique de l'ouest, il existerait deux mentions précédentes de cette espèce en Corse : 6 et 7 avril 1989 à Ailsgiu (Cap Corse) par Jean GRAZIANI (détermination de l'oiseau sur photo par le CHN) ; Girolata (juin 1992). Par ailleurs, un autre exemplaire a été observé durant tout l'été 1996 à Barcaggio et Tollare (observation transmise par Thomas BUZZI). Nous pensons qu'il s'agit plutôt d'oiseaux échappés de captivité que de déplacements atypiques.

### Tableaux pages suivantes :


#### - Bilan des poses de bagues par espèce et par jour en 1994, 1995 et 1996

[ligne du haut = mois d'avril, ligne du bas = mois de mai]

### Photographies (voir par ailleurs) :



- 1 : Lorient d'Europe *Oriolus oriolus*
- 2 : Guêpier d'Europe *Merops apiaster*
- 3 : Merle métallique pourpre *Lamprolornis purpureus*
- 4 : Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*
- 5 : Torcol fourmilier *Jynx torquilla*
- 6 : Coucou gris *Cuculus canorus*



- 7 : Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
- 8 : Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
- 9 : Marouette de Baillon *Porzana pusilla* (capturée en 1993)
- 10 : Faucon hobereau *Falco subbuteo*
- 11 : Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

clichés :  
Gilles FAGGIO,  
Cécilia FRIDLENDER,  
Guillaume POYET,  
Bernard RECORBET.

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2  | 18<br>3  | 19<br>4   | 20<br>5  | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8  | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 94 |
|--|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Epervier d'Europe<br><i>Accipiter nisus</i>        |         |          |          |           |          |         |         |          |         |          |          | 1        |          |          |          | 1          | 1            |
| Faucon hobereau<br><i>Falco subbuteo</i>           |         |          |          |           |          |         |         |          |         |          |          |          | 1        |          |          | 1          | 1            |
| Marouette ponctuée<br><i>Porzana porzana</i>       | 1       |          |          |           |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Bécasseau minute<br><i>Calidris minuta</i>         |         |          |          |           |          |         |         |          |         |          |          | 1        |          | 1        |          | 2          | 2            |
| Combattant varié<br><i>Philomachus pugnax</i>      | 1       |          |          | 2         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |          | 3          | 3            |
| Chevalier gambette<br><i>Tringa totanus</i>        |         |          |          |           |          |         | 1       | 1        |         |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |
| Chevalier aboyeur<br><i>Tringa nebularia</i>       |         |          | 1        |           |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Chevalier culblanc<br><i>Tringa ochropus</i>       |         |          |          |           |          |         |         |          |         |          |          |          | 1        |          |          | 1          | 1            |
| Chevalier sylvain<br><i>Tringa glareola</i>        | 16      | 2        | 4        | 13        | 2        |         |         |          |         |          | 1        | 1        | 1        |          |          | 3<br>37    | 40           |
| Chevalier guignette<br><i>Actitis hypoleucos</i>   |         |          | 2        | 3<br>2    | 1        | 2       | 1<br>6  | 2<br>2   | 1       | 3<br>2   | 2        | 1<br>2   | 1<br>2   |          | 2        | 14<br>23   | 37           |
| Tourterelle des bois<br><i>Streptopelia turtur</i> |         | 1<br>1   |          |           |          |         |         | 1<br>1   | 1       |          |          | 1        |          | 1        | 1<br>1   | 4<br>6     | 10           |
| Coucou gris<br><i>Cuculus canorus</i>              |         |          |          |           |          |         |         |          | 1<br>1  |          |          |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Petit-duc scops<br><i>Otus scops</i>               |         |          |          |           |          | 1       |         | 1        |         |          |          |          |          | 1        |          | 3          | 3            |
| Hibou moyen-duc<br><i>Asio otus</i>                |         | 1        |          |           |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Martinet noir<br><i>Apus apus</i>                  | 1       |          |          | 1         | 1        |         | 1       |          |         | 1        | 2        | 1        |          |          |          | 8          | 8            |
| Huppe fasciée<br><i>Upupa epops</i>                |         | 1        |          |           |          | 1       |         |          |         |          | 1        |          |          | 1        |          | 2<br>2     | 4            |
| Torcol fourmillier<br><i>Jynx torquilla</i>        |         |          |          | 1         |          |         |         |          |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Alouette calandre<br><i>Melanocorypha calandra</i> |         |          |          |           |          |         |         |          |         |          |          |          | 1        |          |          | 1          | 1            |
| Hirondelle de rivage<br><i>Riparia riparia</i>     |         | 3        | 1        | 1         | 10<br>1  | 7       | 1       | 3<br>2   | 1       | 1        |          |          |          |          |          | 26<br>5    | 31           |
| Hirondelle rustique<br><i>Hirundo rustica</i>      |         | 38<br>11 | 32<br>23 | 124<br>34 | 98<br>17 | 74<br>8 | 6<br>4  | 69<br>13 | 4<br>17 | 5<br>38  | 21<br>24 | 4<br>4   | 11<br>1  | 8<br>3   | 4<br>13  | 498<br>227 | 725          |

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 94 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Hirondelle rousseline<br><i>Hirundo daurica</i>            |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Hirondelle de fenêtre<br><i>Delichon urbica</i>            |         |         |         | 1<br>2  |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 1<br>3     | 4            |
| Pipit des arbres<br><i>Anthus trivialis</i>                |         |         |         | 3       | 1       | 3       |         | 1       |         |          |          |          |          |          | 1        | 9          | 9            |
| Pipit farlouse<br><i>Anthus pratensis</i>                  |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Bergeronnette printanière<br><i>Motacilla flava</i>        | 1       | 4<br>1  | 2       | 2<br>1  | 2<br>3  |         |         | 1       |         | 1        | 1        | 1        |          | 2        | 1        | 15<br>8    | 23           |
| Bergeronnette grise<br><i>Motacilla alba</i>               |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Troglodyte mignon<br><i>Troglodytes troglodytes</i>        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 1          | 1            |
| Accenteur mouchet<br><i>Prunella modularis</i>             |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 2          | 2            |
| Rougegorge familier<br><i>Erithacus rubecula</i>           | 1       | 1<br>1  |         | 3       | 1       | 2       |         | 2       | 1       | 1        |          |          |          |          |          | 11<br>2    | 13           |
| Rossignol philomèle<br><i>Luscinia megarhynchos</i>        |         |         | 1       | 2<br>1  | 2<br>1  | 3       | 1       | 1       | 2       | 2        |          |          |          |          |          | 10<br>6    | 16           |
| Rougequeue à front blanc<br><i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 2       |         | 1<br>1  |         | 4       | 1<br>2  |         | 2<br>2  | 2<br>1  | 3<br>1   | 1        | 2        | 2        | 2<br>1   | 2<br>3   | 16<br>19   | 35           |
| Tarier des prés<br><i>Saxicola rubetra</i>                 |         |         | 2       | 1       | 1       |         |         | 1       | 1       |          | 1        | 2        | 3        |          | 1        | 8<br>6     | 14           |
| Traquet motteux<br><i>Oenanthe oenanthe</i>                |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          |          | 2        |          |          | 2<br>1     | 3            |
| Merle noir<br><i>Turdus merula</i>                         | 3       | 1       | 2       | 1       | 1       |         |         | 1       | 1       |          | 1        | 2        |          |          |          | 6<br>7     | 13           |
| Grive musicienne<br><i>Turdus philomelos</i>               |         |         |         | 1       |         |         |         |         | 1       |          | 1        |          |          |          | 1        | 3<br>1     | 4            |
| Locustelle tachetée<br><i>Locustella naevia</i>            |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 1<br>1     | 2            |
| Phragmite des joncs<br><i>Acrocephalus schoenobaenus</i>   | 1       |         |         |         |         | 1       |         | 1       | 1       | 1        |          |          |          | 2<br>3   | 3<br>1   | 7<br>7     | 14           |
| Rousserolle effarvate<br><i>Acrocephalus scirpaceus</i>    |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 1       |         | 1       |          |          |          | 1        |          |          | 1<br>5     | 6            |
| Rousserolle turdoïde<br><i>Acrocephalus arundinaceus</i>   | 1       | 1       |         | 1       | 2       | 1       | 2       |         | 1<br>2  |          |          |          | 1        | 1<br>2   |          | 3<br>12    | 15           |
| Hypolaïs icterine<br><i>Hippolaïs icterina</i>             |         |         |         |         | 1       |         | 6       | 2       | 1       | 3        |          |          |          |          | 8        | 21         | 21           |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat. Fr. n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

| ESPECE  | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 94 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Fauvette passerinette<br><i>Sylvia cantillans</i>     |         | 1       | 2       | 1       | 1       |         |         | 1       |         | 1        |          | 2        | 1        |          | 1        | 8<br>3     | 11           |
| Fauvette mélanocéphale<br><i>Sylvia melanocephala</i> | 1       | 2       | 1       | 1       |         |         | 1       | 3       |         | 1        | 1        |          | 2        |          | 2<br>1   | 13<br>4    | 17           |
| Fauvette grisette<br><i>Sylvia communis</i>           | 7       |         | 1<br>1  | 1       | 4<br>2  | 1       | 3       | 2<br>5  | 6       | 4<br>3   | 2        | 2        |          | 2<br>1   | 1        | 14<br>34   | 48           |
| Fauvette des jardins<br><i>Sylvia borin</i>           | 3       | 2<br>1  | 2       | 2       | 1       | 3       | 5       | 9       | 3       |          | 1<br>3   | 2<br>9   | 2        | 2<br>17  | 3<br>2   | 13<br>60   | 73           |
| Fauvette à tête noire<br><i>Sylvia atricapilla</i>    | 6       | 18<br>2 | 15<br>1 | 32<br>5 | 24<br>4 | 18<br>5 | 7<br>3  | 16<br>1 | 10<br>2 | 6        | 6        | 7        | 18       | 9        | 8        | 194<br>29  | 223          |
| Pouillot siffleur<br><i>Phylloscopus sibilatrix</i>   |         | 2       |         | 4<br>1  | 2       | 1<br>1  |         | 1<br>4  | 1<br>5  |          |          |          |          | 4<br>3   | 2        | 17<br>22   | 39           |
| Pouillot véloce<br><i>Phylloscopus collybita</i>      | 1       | 3       | 1       | 1<br>1  | 2       | 2<br>1  |         |         |         | 1        | 1        | 1        | 2        | 1        | 1        | 16<br>4    | 20           |
| Pouillot fitis<br><i>Phylloscopus trochilus</i>       | 19      | 4<br>6  | 1<br>2  | 15<br>6 | 10<br>4 | 26<br>3 | 2<br>7  | 30<br>4 | 17<br>3 | 15<br>1  | 4        | 13       | 39       | 17<br>1  | 42<br>1  | 235<br>57  | 292          |
| Gobemouche gris<br><i>Muscicapa striata</i>           |         |         |         | 1       | 2       |         | 2       | 1<br>2  | 2<br>15 | 2<br>2   | 1<br>1   |          | 5<br>4   | 1<br>12  |          | 12<br>42   | 54           |
| Gobemouche noir<br><i>Ficedula hypoleuca</i>          | 1       | 2       | 3       | 2       | 3<br>4  | 1       | 3       | 1       | 1<br>1  | 7        | 4        | 1        | 3        | 1<br>2   |          | 28<br>12   | 40           |
| Mésange à longue queue<br><i>Aegithalos caudatus</i>  |         |         |         |         |         |         | 2       |         |         |          |          |          |          |          |          | 2<br>3     | 5            |
| Mésange bleue<br><i>Parus caeruleus</i>               | 1       |         | 1       |         |         |         | 1       |         |         |          | 1        |          |          |          |          | 2<br>3     | 5            |
| Mésange charbonnière<br><i>Parus major</i>            |         |         |         |         |         |         | 1       | 1       | 2       |          |          |          |          |          |          | 4          | 4            |
| Loriot d'Europe<br><i>Oriolus oriolus</i>             |         |         |         |         |         | 1       |         |         | 1       |          |          |          | 2        |          | 3        | 7<br>1     | 8            |
| Pie-grièche écorcheur<br><i>Lanius collurio</i>       | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          | 2        | 3          | 3            |
| Pie-grièche à tête rousse<br><i>Lanius senator</i>    |         |         |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          | 1        |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Moineau cisalpin<br><i>Passer italiae</i>             | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 2        |          |          |          | 1        | 3<br>1     | 4            |
| Pinson des arbres<br><i>Fringilla coelebs</i>         | 1       | 1       | 1       | 1       | 1<br>3  | 1<br>3  | 1       | 1       | 1       | 1        | 1        |          |          |          | 4        | 4<br>17    | 21           |
| Serin cini<br><i>Serinus serinus</i>                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 1        |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Venturon corse<br><i>Serinus corricanus</i>           |         |         |         |         | 1       |         |         |         | 1       |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |

Istan. sci. Parc. nat. vég. Corse & Rés. nat. Fr. n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1994

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 94 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Verdier d'Europe<br><i>Carduelis chloris</i>                 | 1       | 1       |         | 3<br>1  | 2       | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 6<br>3     | 9            |
| Chardonneret élégant<br><i>Carduelis carduelis</i>           | 3       | 1       | 2       | 6       | 1<br>4  | 2<br>1  |         | 1       | 3       |          |          |          | 3        |          | 3<br>3   | 16<br>18   | 34           |
| Tarin des aulnes<br><i>Carduelis spinus</i>                  | 1       |         | 1       |         |         |         |         | 1<br>1  |         |          |          |          |          |          | 1        | 2<br>5     | 7            |
| Grosbec casse-noyaux<br><i>Coccothraustes coccothraustes</i> |         | 1       |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Bruant zizi<br><i>Emberiza cirius</i>                        |         |         |         | 1       |         |         |         | 1       |         |          |          | 1        | 1        | 1        |          | 5          | 5            |
| Bruant proyer<br><i>Miliaria calandra</i>                    |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |

Tran. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat. Fr. n°58 (1998)

37

|                          | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total du mois |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Total/jour avril 1994    | 0       | 84      | 61      | 208     | 164     | 146     | 23      | 144     | 48      | 50       | 48       | 40       | 102      | 55       | 84       | 1257          |
| Total/jour mai 1994      | 92      | 30      | 46      | 82      | 63      | 34      | 50      | 0       | 69      | 62       | 40       | 30       | 7        | 58       | 33       | 746           |
| <b>Total 1994 : 2003</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |               |

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Tot./esp. 95 |          |    |   |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----|---|
| Blongios nain<br><i>Ixobrychus minutus</i>           |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1            | 1        |    |   |
| Epervier d'Europe<br><i>Accipiter nisus</i>          |         |         |         |         |         |         | 1       | 1       |         |          |          |          |          |          |          |              | 2        | 2  |   |
| Faucon émerillon<br><i>Falco columbarius</i>         | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Marouette ponctuée<br><i>Porzana porzana</i>         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          | 1        |          |              | 1        | 1  |   |
| Râle d'eau<br><i>Rallus aquaticus</i>                |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Gallinule poule-d'eau<br><i>Gallinula chloropus</i>  |         |         |         | 1       | 1       | 1       |         |         | 1       |          |          |          | 1        |          | 1        |              | 3        | 3  | 6 |
| Petit Gravelot<br><i>Charadrius dubius</i>           |         |         | 1       |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Bécasseau cocorli<br><i>Calidris ferruginea</i>      |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Bécasseau minute<br><i>Calidris minuta</i>           |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Bécassine sourde<br><i>Limnocryptes minimus</i>      | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Bécassine des marais<br><i>Gallinago gallinago</i>   |         |         |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Chevalier culblanc<br><i>Tringa ochropus</i>         | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 1        | 1  |   |
| Chevalier sylvain<br><i>Tringa glareola</i>          | 1<br>1  |         |         |         | 2       | 2       | 1       | 1       |         |          | 1        | 1        |          |          |          |              | 2<br>9   | 11 |   |
| Chevalier guignette<br><i>Actitis hypoleucos</i>     |         |         | 1<br>3  | 1<br>1  | 1       | 1       |         | 2       | 1       | 1        | 4        | 1        | 3        |          | 2<br>2   |              | 10<br>15 | 25 |   |
| Tourterelle des bois<br><i>Streptopelia turtur</i>   | 1       | 1       | 2       |         |         | 3       |         | 1       |         |          |          |          |          | 1        | 1        |              | 5<br>5   | 10 |   |
| Coucou gris<br><i>Cuculus canorus</i>                |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         | 1        |          | 1        |          |          |          |              | 2<br>1   | 3  |   |
| Petit-duc scops<br><i>Otus scops</i>                 |         |         | 2       |         |         | 1       | 1       |         |         |          |          |          |          | 1        |          |              | 5        | 5  |   |
| Engoulevent d'Europe<br><i>Caprimulgus europaeus</i> |         |         | 1       |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          |              | 2        | 2  |   |
| Martinet noir<br><i>Apus apus</i>                    |         |         |         |         |         |         | 1       | 1       |         |          |          |          | 2        |          | 1        |              | 2<br>3   | 5  |   |
| Buppe fasciée<br><i>Upupa epops</i>                  | 1       | 2       |         |         | 1       |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          |              | 5        | 5  |   |

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

| ESPECE   | 16<br>1  | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4  | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 95 |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Torcol fourmilier<br><i>Jynx torquilla</i>                 |          |         |         |          | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Hirondelle de rivage<br><i>Riparia riparia</i>             | 1<br>1   |         |         | 4        | 18      | 7       | 2       | 1<br>2  | 2       | 4<br>1   | 1        | 4        | 9        | 1        | 1        | 21<br>38   | 59           |
| Hirondelle rustique<br><i>Hirundo rustica</i>              | 22<br>59 | 1<br>28 | 2<br>13 | 10<br>39 | 89      | 37      | 3<br>12 | 9<br>11 | 1<br>18 | 29<br>21 | 14<br>17 | 31<br>1  | 243      | 51       | 54<br>10 | 470<br>355 | 825          |
| Hirondelle rousseline<br><i>Hirundo daurica</i>            |          |         |         |          |         |         |         |         | 2       |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |
| Hirondelle de fenêtre<br><i>Delichon urbica</i>            |          | 1       | 1       |          | 4       | 1       | 1       | 2       | 2       | 5        | 1<br>4   |          | 3        |          | 9        | 4<br>30    | 34           |
| Pipit rousseline<br><i>Anthus campestris</i>               |          | 1       |         |          |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |
| Pipit des arbres<br><i>Anthus trivialis</i>                | 1        |         | 1       | 1        | 4       | 3       | 3       | 1<br>1  |         | 4        |          | 1        | 2        | 1<br>1   |          | 10<br>14   | 24           |
| Pipit à gorge rousse<br><i>Anthus cervinus</i>             |          |         |         |          |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Pipit farlouse<br><i>Anthus pratensis</i>                  |          |         |         |          |         |         |         |         |         |          | 1        | 1        |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Pipit spioncelle<br><i>Anthus spinoletta</i>               | 2        | 1       |         |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 3          | 3            |
| Bergeronnette printanière<br><i>Motacilla flava</i>        | 4        | 1       | 1<br>1  | 6        | 2<br>1  |         | 1<br>3  |         | 1       | 2<br>3   | 2        |          | 1        | 1        |          | 17<br>13   | 30           |
| Bergeronnette des ruisseaux<br><i>Motacilla cinerea</i>    |          |         |         |          |         |         |         |         |         |          |          | 1        |          |          |          | 1          | 1            |
| Troglodyte mignon<br><i>Troglodytes troglodytes</i>        |          |         |         |          |         |         |         | 1       |         |          |          |          | 2        | 1        |          | 4          | 4            |
| Accenteur mouchet<br><i>Prunella modularis</i>             | 3        | 1       | 1       |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 5          | 5            |
| Rougegorge familier<br><i>Erithacus rubecula</i>           | 41       | 36<br>1 | 23      | 15       | 5       | 2<br>1  | 2<br>1  | 1       |         |          |          |          |          | 1        | 2        | 128<br>3   | 131          |
| Rossignol philomèle<br><i>Luscinia megarhynchos</i>        | 3<br>1   | 2       | 2       | 5        |         | 1       | 4       |         | 2       |          |          |          | 1        | 3        | 3        | 24<br>3    | 27           |
| Rougequeue à front blanc<br><i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 1<br>3   | 1       | 2<br>5  | 4<br>5   | 3<br>4  | 2<br>1  | 2<br>1  | 1<br>2  | 1<br>1  | 5        |          | 2        | 3        | 5        | 2        | 34<br>22   | 56           |
| Tarier des prés<br><i>Saxicola rubetra</i>                 |          | 1       | 2<br>4  | 9        | 1<br>14 | 15      | 3<br>2  | 2<br>1  | 4<br>1  | 15<br>1  | 2        | 1        | 1        | 1        | 2        | 34<br>48   | 82           |
| Traquet motteux<br><i>Oenanthe oenanthe</i>                |          |         |         |          | 1       |         | 2       |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 1<br>3     | 4            |
| Merle noir<br><i>Turdus merula</i>                         | 3<br>1   | 2       |         | 2        | 1<br>1  |         | 1<br>1  | 4       | 1       | 1        | 1        | 1        |          |          | 1        | 9<br>11    | 20           |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr. n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4  | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 95 |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Grive musicienne<br><i>Turdus philomelos</i>             | 1       |         | 1       |          |         | 1       |         |         |         |          |          | 1        |          |          |          | 3<br>1     | 4            |
| Locustelle tachetée<br><i>Locustella naevia</i>          | 1       |         |         |          |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          | 1        | 2<br>1     | 3            |
| Locustelle luscinoïde<br><i>Locustella luscinioides</i>  |         |         |         |          | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Phragmite des joncs<br><i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | 2       | 1       | 1       |          | 2       | 5       | 1       | 1       | 1       | 4        | 1        |          |          | 4<br>1   | 2<br>1   | 10<br>17   | 27           |
| Rousserolle effarvate<br><i>Acrocephalus scirpaceus</i>  |         |         |         | 2        |         | 1       |         |         |         | 2        |          | 3        | 1        | 2        | 2        | 1<br>12    | 13           |
| Rousserolle turdoïde<br><i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 2       | 1       |         | 1        | 2       | 4       |         | 1       | 2       | 3<br>3   | 2        | 2        | 2        | 2<br>1   | 2        | 10<br>20   | 30           |
| Hypolais ictérine<br><i>Hippolais icterina</i>           |         |         |         |          | 2       | 3       | 3       | 2       | 2       | 1        | 3        |          |          |          | 3        | 19         | 19           |
| Fauvette sarde<br><i>Sylvia sarda</i>                    |         |         |         |          |         |         | 2       |         |         |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |
| Fauvette passerinette<br><i>Sylvia cantillans</i>        | 1<br>3  | 2<br>2  | 2       | 1        | 5       | 3       | 1<br>3  | 5<br>2  | 1       | 1<br>3   | 1        |          |          | 8        | 1        | 23<br>23   | 46           |
| Fauvette mélanocéphale<br><i>Sylvia melanocephala</i>    | 2       | 1       | 1       | 4        | 2<br>1  |         | 4<br>1  |         |         | 1        |          |          | 1        | 1        |          | 17<br>3    | 20           |
| Fauvette grisette<br><i>Sylvia communis</i>              | 2<br>8  | 1<br>1  | 5       | 1        | 2<br>13 | 2<br>36 | 3<br>25 | 2<br>6  | 12      | 2<br>2   | 1<br>1   | 3        | 4        | 4<br>1   | 2        | 29<br>110  | 139          |
| Fauvette des jardins<br><i>Sylvia borin</i>              | 1       | 3       | 1       | 1        | 6       | 5       | 2<br>7  | 3<br>1  | 1<br>13 | 1<br>22  | 12       | 1<br>3   | 3        | 1<br>3   | 1<br>6   | 14<br>84   | 98           |
| Fauvette à tête noire<br><i>Sylvia atricapilla</i>       | 3<br>1  | 6<br>5  | 5<br>1  | 15<br>1  | 4<br>6  | 4<br>3  | 4<br>3  | 3<br>2  |         | 5        | 4<br>2   | 3        | 13       | 9        | 8<br>1   | 82<br>25   | 107          |
| Pouillot siffleur<br><i>Phylloscopus sibilatrix</i>      | 1<br>1  | 2<br>2  | 1<br>1  | 2        | 1<br>6  | 1<br>2  | 2<br>5  | 16<br>6 | 4<br>4  | 6<br>7   |          |          | 2        | 1        | 1        | 39<br>42   | 81           |
| Pouillot véloce<br><i>Phylloscopus collybita</i>         | 3       | 4       |         | 1        | 1       | 1<br>1  | 2       |         |         |          |          |          |          |          |          | 10<br>3    | 13           |
| Pouillot fitis<br><i>Phylloscopus trochilus</i>          | 5<br>7  | 6<br>16 | 5<br>8  | 11<br>13 | 3<br>16 | 1<br>8  | 14<br>1 | 3<br>1  | 2       | 5<br>4   |          | 3        | 15       | 17       | 7<br>5   | 95<br>81   | 176          |
| Gobemouche gris<br><i>Muscicapa striata</i>              |         |         |         | 3        | 1       | 6       | 6       | 1<br>1  | 3       | 6<br>5   | 13       | 2        |          | 1        |          | 7<br>41    | 48           |
| Gobemouche noir<br><i>Ficedula hypoleuca</i>             | 2       | 2       | 3       | 2<br>3   | 1<br>3  | 2       | 4       | 3<br>1  | 5       | 10       | 3<br>1   | 1<br>1   | 2        | 4        | 8<br>1   | 43<br>19   | 62           |
| Gobemouche à collier<br><i>Ficedula albicollis</i>       |         | 1       |         |          |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Mésange à longue queue<br><i>Aegithalos caudatus</i>     |         | 2       |         |          | 1       |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 4          | 4            |

Trav. sci. Parc. nat. rég. (Orse & Rés. nat., Fr. n°58 (1998))

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1995

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 95 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Mésange bleue<br><i>Parus caeruleus</i>            | 4       | 1       |         |         | 1       |         | 1       |         | 1       |          | 1        |          | 1        |          |          | 7<br>4     | 11           |
| Mésange charbonnière<br><i>Parus major</i>         | 1       | 3<br>1  | 1       |         | 1<br>1  | 1       | 1       |         |         |          |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 10<br>4    | 14           |
| Loriot d'Europe<br><i>Oriolus oriolus</i>          | 1       | 1       |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          | 1        |          |          |          | 1<br>3     | 4            |
| Pie-grièche écorcheur<br><i>Lanius collurio</i>    |         |         |         |         |         | 1       |         | 1       |         | 1        |          | 1        |          |          |          | 4          | 4            |
| Pie-grièche à tête rousse<br><i>Lanius senator</i> |         |         | 1       |         |         |         | 1       |         |         | 1        |          | 1        |          |          | 1        | 3<br>2     | 5            |
| Moineau cisalpin<br><i>Passer italiae</i>          |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Pinson des arbres<br><i>Fringilla coelebs</i>      | 1<br>1  |         | 1       | 1       | 1<br>1  | 2       | 1<br>3  |         | 1       | 1<br>3   |          |          | 1        | 1        | 1        | 6<br>14    | 20           |
| Serin cini<br><i>Serinus serinus</i>               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 1        | 1        | 1        |          |          | 2<br>1     | 3            |
| Venturon corse<br><i>Serinus corsicanus</i>        |         | 1       |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          | 1        | 1<br>2     | 3            |
| Verdier d'Europe<br><i>Carduelis chloris</i>       | 3       |         | 1       |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 4          | 4            |
| Chardonneret élégant<br><i>Carduelis carduelis</i> | 5<br>3  | 8<br>2  | 1<br>3  | 3<br>5  | 6<br>2  | 5       | 1<br>4  | 1<br>4  | 3       | 1<br>1   |          | 3        |          | 3<br>2   | 2<br>3   | 34<br>37   | 71           |
| Tarin des aulnes<br><i>Carduelis spinus</i>        |         | 1       | 1       |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |
| Linotte mélodieuse<br><i>Carduelis cannabina</i>   |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1          | 1            |
| Bruant zizi<br><i>Emberiza cirulus</i>             |         |         |         |         | 1       |         | 1<br>2  |         |         | 1        |          |          |          |          |          | 3<br>2     | 5            |
| Bruant ortolan<br><i>Emberiza hortulana</i>        |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         | 1        |          |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Bruant proyer<br><i>Miliaria calandra</i>          |         |         |         |         |         |         | 1       | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 2          | 2            |

Thau. sci. Parc. nat. rég. (oise & Rés. nat. Fr. n°58 (1998))

|                       | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total du mois |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Total/jour avril 1995 | 118     | 82      | 58      | 86      | 37      | 17      | 57      | 63      | 19      | 106      | 27       | 59       | 320      | 121      | 104      | 1274          |
| Total/jour mai 1995   | 99      | 74      | 51      | 86      | 205     | 160     | 112     | 57      | 76      | 91       | 70       | 25       | 0        | 15       | 48       | 1169          |
| Total 1995 : 2443     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |               |

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

Trav. sci. Parc. nat. rég. (Orse & Rés. nat., Fr. n°58 (1998))

| ESPECE  | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| <b>Blongios nain</b><br><i>Ixobrycus minutus</i>            | 1       |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          | 1        |          | 1        | 2<br>2     | 4            |
| <b>Bihoreau gris</b><br><i>Nycticorax nycticorax</i>        |         | 1       |         |         |         |         |         |         |         |          | 1        |          |          |          | 1        | 2<br>1     | 3            |
| <b>Crabier chevelu</b><br><i>Ardeola ralloides</i>          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 1<br>0     | 1            |
| <b>Héron pourpré</b><br><i>Ardeola purpurea</i>             |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| <b>Faucon crécerelle</b><br><i>Falco tinnunculus</i>        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 0<br>1     | 1            |
| <b>Faucon hobereau</b><br><i>Falco colombarius</i>          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 0<br>1     | 1            |
| <b>Gallinule poule-d'eau</b><br><i>Gallinula chloropus</i>  |         | 1       |         | 1       |         |         | 1       |         |         | 2        |          |          | 1        |          | 1        | 5<br>2     | 7            |
| <b>Petit Gravelot</b><br><i>Charadrius dubius</i>           |         |         | 2       |         |         |         |         |         | 1       |          |          |          |          |          |          | 3<br>0     | 3            |
| <b>Grand Gravelot</b><br><i>Charadrius hiaticula</i>        |         |         |         |         |         |         |         | 1       | 1       |          |          |          | 1        | 1        | 1        | 1<br>4     | 5            |
| <b>Combattant varié</b><br><i>Philomachus pugnax</i>        |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| <b>Chevalier gambette</b><br><i>Tringa totanus</i>          |         |         |         | 2       |         |         |         |         | 1       |          |          |          |          | 1        |          | 1<br>3     | 4            |
| <b>Chevalier aboyeur</b><br><i>Tringa nebularia</i>         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 1<br>0     | 1            |
| <b>Chevalier sylvain</b><br><i>Tringa glareola</i>          |         | 1       |         | 1       | 1       | 1       | 1       | 2       | 5       |          |          |          | 1        |          |          | 11<br>2    | 13           |
| <b>Chevalier guignette</b><br><i>Actitis hypoleucos</i>     | 2       | 2       |         | 1       | 1       |         | 2       | 4       | 1       | 1        | 3        | 1        | 2        | 1        | 1        | 15<br>37   | 52           |
| <b>Tourterelle des bois</b><br><i>Streptopelia turtur</i>   |         |         |         |         |         | 2       | 1       |         | 1       | 1        | 2        |          | 1        | 1        | 1        | 3<br>8     | 11           |
| <b>Effraie des clochers</b><br><i>Tyto alba</i>             |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| <b>Petit-duc scops</b><br><i>Otus scops</i>                 |         | 1       |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 3<br>0     | 3            |
| <b>Engoulevent d'Europe</b><br><i>Caprimulgus europaeus</i> |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 1        |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| <b>Martinet noir</b><br><i>Apus apus</i>                    |         | 1       |         | 8       | 3       | 2       |         |         |         | 1        |          |          | 1        | 2        | 1        | 4<br>16    | 20           |
| <b>Huppe fasciée</b><br><i>Upupa epops</i>                  |         | 1       |         |         | 1       |         |         | 1       | 1       |          |          | 1        |          |          |          | 2<br>3     | 5            |

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

| ESPECE   | 16<br>1  | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15  | Total/esp.  | Tot./esp. 96 |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|
| Torcol fourmilier<br><i>Jynx torquilla</i>                 |          |         |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          |          |          |          |           | 1<br>0      | 1            |
| Alouette calandrelle<br><i>Calandrella brachydactyla</i>   |          |         |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          |          |          |          |           | 0<br>1      | 1            |
| Alouette lulu<br><i>Lullula arborea</i>                    |          |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          | 1        |          |          |           | 1<br>0      | 1            |
| Hirondelle de rivage<br><i>Riparia riparia</i>             |          |         | 1       |         | 1       | 2       |         |         |         |          |          | 1        | 5        | 38       | 10        | 55<br>3     | 58           |
| Hirondelle rustique<br><i>Hirundo rustica</i>              | 3<br>104 | 3<br>53 | 4<br>15 | 9<br>23 | 18<br>6 | 25      | 7       | 1       | 9       | 12<br>7  | 20<br>6  | 43<br>7  | 197<br>6 | 574<br>3 | 209<br>21 | 1101<br>284 | 1385         |
| Hirondelle rousseline<br><i>Hirundo daurica</i>            | 1        |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        | 3        |           | 4<br>1      | 5            |
| Hirondelle de fenêtre<br><i>Delichon urbica</i>            |          |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          | 4        | 15       | 2         | 21<br>1     | 22           |
| Pipit rousseline<br><i>Anthus campestris</i>               |          |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |           | 0<br>1      | 1            |
| Pipit des arbres<br><i>Anthus trivialis</i>                | 2        | 1       | 1       |         |         |         |         |         | 1       | 1        | 1        | 2        |          | 3        |           | 10<br>4     | 14           |
| Pipit farlouse<br><i>Anthus pratensis</i>                  |          |         |         |         | 1       | 2       |         | 1       |         |          |          |          |          |          |           | 4<br>0      | 4            |
| Pipit spioncelle<br><i>Anthus spinoletta</i>               |          |         | 1       |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |           | 1<br>1      | 2            |
| Bergeronnette printanière<br><i>Motacilla flava</i>        | 1<br>1   | 2<br>3  | 1       | 1       | 7<br>4  | 3<br>11 | 1<br>6  | 1<br>3  | 2<br>1  | 1<br>7   | 1<br>7   | 5        | 11       | 7<br>8   | 5         | 27<br>73    | 100          |
| Bergeronnette grise<br><i>Motacilla alba</i>               |          |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |           | 0<br>1      | 1            |
| Accenteur mouchet<br><i>Prunella modularis</i>             | 1        | 1       |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |           | 2<br>0      | 2            |
| Rougegorge familier<br><i>Erithacus rubecula</i>           | 9        | 7       | 8       | 6       | 5       | 1       | 2       |         | 1<br>1  |          |          | 1        |          |          |           | 40<br>1     | 41           |
| Rossignol philomèle<br><i>Luscinia megarhynchos</i>        | 3        | 3       | 2<br>2  | 2<br>2  |         | 3<br>1  |         | 2<br>1  | 5       | 1        | 1        | 2        |          |          | 1<br>1    | 25<br>7     | 32           |
| Rougequeue à front blanc<br><i>Phoenicurus phoenicurus</i> |          | 2<br>5  | 1<br>1  | 1       | 3<br>2  | 2       | 2<br>1  | 2       | 3       | 1<br>2   | 1<br>1   | 1        |          | 1<br>1   | 2<br>3    | 19<br>19    | 38           |
| Tarier des prés<br><i>Saxicola rubetra</i>                 |          | 7       | 1       | 2       | 2<br>1  | 1<br>5  | 1       | 1       | 3<br>1  | 2<br>1   | 2        | 3<br>1   | 17<br>2  | 3<br>4   | 18<br>3   | 52<br>29    | 81           |
| Traquet motteux<br><i>Oenanthe oenanthe</i>                | 1        |         | 1       |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          |           | 2<br>1      | 3            |
| Merle noir<br><i>Turdus merula</i>                         | 1        |         | 1       | 2       |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          | 1         | 4<br>2      | 6            |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr., n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996

| ESPECE  | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| <b>Grive musicienne</b><br><i>Turdus philomelos</i>             |         | 2       |         | 1       | 2       |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 4<br>3     | 7            |
| <b>Grive mauvis</b><br><i>Turdus iliacus</i>                    |         |         |         |         |         | 1       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| <b>Locustelle tachetée</b><br><i>Locustella naevia</i>          |         |         | 1       |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| <b>Locustelle luscinoïde</b><br><i>Locustella luscinioides</i>  |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| <b>Phragmite des joncs</b><br><i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | 2       |         |         |         | 1       | 3       | 4       |         | 2       | 1        | 2        | 2        | 7        | 9        | 4        | 29<br>13   | 42           |
| <b>Rousserolle effarvatte</b><br><i>Acrocephalus scirpaceus</i> |         |         | 1       | 1       |         | 2       |         |         | 1       |          |          | 1        | 2        |          |          | 1<br>7     | 8            |
| <b>Rousserolle turdoïde</b><br><i>Acrocephalus arundinaceus</i> |         | 2<br>1  |         | 1       |         |         |         | 1       | 1       | 3        |          | 1        | 2        | 3        | 2        | 15<br>5    | 20           |
| <b>Hypolaïs icterine</b><br><i>Hippolaïs icterina</i>           |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          | 1        | 1        |          |          | 2<br>3     | 5            |
| <b>Hypolaïs polyglotte</b><br><i>Hippolaïs polyglotta</i>       |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          | 1        |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| <b>Fauvette passerinette</b><br><i>Sylvia cantillans</i>        |         |         | 1<br>3  | 3       | 5       | 1<br>3  | 6       | 2       | 2<br>5  |          | 3<br>1   | 2<br>2   | 1<br>1   | 1<br>1   | 1        | 12<br>32   | 44           |
| <b>Fauvette mélanocéphale</b><br><i>Sylvia melanocephala</i>    | 4       | 3<br>1  | 3<br>1  | 2       | 3       | 1       |         | 1       | 2       |          | 1        |          |          |          | 2        | 17<br>8    | 25           |
| <b>Fauvette grisetite</b><br><i>Sylvia communis</i>             |         | 3       |         | 1<br>1  |         | 1       | 1       | 1<br>2  | 5       | 2<br>2   | 3<br>4   | 4<br>3   | 3        | 2        | 10<br>1  | 31<br>18   | 49           |
| <b>Fauvette des jardins</b><br><i>Sylvia borin</i>              |         | 2       | 3       | 2       | 3       | 10      | 6       | 9       | 1<br>4  | 8<br>3   | 13<br>1  | 8<br>6   | 11<br>9  | 19<br>4  | 8<br>6   | 68<br>68   | 136          |
| <b>Fauvette à tête noire</b><br><i>Sylvia atricapilla</i>       | 11<br>2 | 15<br>5 | 5<br>4  | 12<br>4 | 9<br>5  | 5<br>1  | 1<br>1  | 3<br>1  | 8<br>2  | 10<br>1  | 21<br>2  | 9<br>1   | 5        | 5        | 3        | 122<br>29  | 151          |
| <b>Pouillot siffleur</b><br><i>Phylloscopus sibilatrix</i>      | 1<br>1  | 4<br>2  | 9       | 2<br>2  | 8<br>2  | 1<br>5  | 2       | 2<br>4  | 15<br>2 | 20<br>2  | 32       | 19       | 15<br>1  | 19       | 6        | 155<br>21  | 176          |
| <b>Pouillot véloce</b><br><i>Phylloscopus collybita</i>         | 6       | 5<br>1  |         | 1<br>1  |         | 1       |         |         |         | 2        | 1        | 1<br>1   |          |          | 1        | 18<br>3    | 21           |
| <b>Pouillot fitis</b><br><i>Phylloscopus trochilus</i>          | 3<br>2  | 8<br>5  | 13<br>3 | 6<br>8  | 4<br>7  | 2<br>8  | 1<br>4  |         | 4<br>7  | 4<br>9   | 2<br>3   | 1<br>3   |          | 39<br>4  | 6<br>1   | 93<br>86   | 179          |
| <b>Gobemouche gris</b><br><i>Muscicapa striata</i>              | 1       | 1       | 2       |         | 2       | 1       |         |         | 2       | 2<br>3   | 12<br>2  | 12       | 8<br>1   | 6<br>2   | 4        | 44<br>17   | 61           |
| <b>Gobemouche noir</b><br><i>Ficedula hypoleuca</i>             |         | 1       | 1<br>2  | 1       | 1<br>2  | 5<br>2  | 2<br>1  |         | 9<br>2  | 21<br>1  | 18<br>1  | 9<br>1   | 2<br>3   | 13       | 3<br>1   | 85<br>19   | 104          |
| <b>Gobemouche à collier</b><br><i>Ficedula albicollis</i>       |         |         |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          | 1        |          |          |          | 2<br>0     | 2            |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1996


| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Mésange bleue<br><i>Parus caeruleus</i>            |         | 1       | 1       |         |         | 1       | 1<br>3  | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 5<br>3     | 8            |
| Mésange charbonnière<br><i>Parus major</i>         | 2       | 1       |         | 1       |         | 1       |         |         |         |          | 1        |          | 1        |          |          | 3<br>4     | 7            |
| Loriot d'Europe<br><i>Oriolus oriolus</i>          |         |         |         |         |         |         | 1       | 1       |         |          | 1        |          | 1        |          |          | 2<br>2     | 4            |
| Pie-grièche écorcheur<br><i>Lanius collurio</i>    |         |         |         |         |         | 1       |         | 1       |         | 1        | 1        |          | 3        | 1        | 2        | 0<br>10    | 10           |
| Pie-grièche à tête rousse<br><i>Lanius senator</i> |         | 1       | 1       | 1       |         | 1       |         | 1       |         |          |          |          | 1        |          | 1        | 3<br>4     | 7            |
| Etourneau sansonnet<br><i>Sturnus vulgaris</i>     |         |         | 1       |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Moineau cisalpin<br><i>Passer italiae</i>          |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          | 1        |          |          | 1<br>3   | 2<br>4     | 6            |
| Pinson des arbres<br><i>Fringilla coelebs</i>      |         | 3       | 1       | 2<br>1  | 1<br>1  | 2<br>2  |         | 2       | 1<br>1  |          |          | 1        | 1        |          | 1<br>1   | 13<br>8    | 21           |
| Serin cini<br><i>Serinus serinus</i>               |         | 1       |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 1<br>1     | 2            |
| Verdier d'Europe<br><i>Carduelis chloris</i>       | 1<br>1  | 1       |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          | 1        | 3<br>2     | 5            |
| Chardonneret élégant<br><i>Carduelis carduelis</i> |         | 5       | 1<br>1  | 2       | 3       |         | 1       | 1<br>3  |         | 1        | 2        | 5        |          | 1<br>2   | 2<br>2   | 20<br>12   | 32           |
| Tarin des aulnes<br><i>Carduelis spinus</i>        |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| Linotte mélodieuse<br><i>Carduelis cannabina</i>   |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| Bruant zizi<br><i>Emberiza cirulus</i>             |         | 2       |         | 1       | 1       | 1       |         |         | 2       |          |          |          |          |          |          | 7<br>0     | 7            |
| Bruant ortolan<br><i>Emberiza hortulana</i>        |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Bruant proyer<br><i>Miliaria calandra</i>          |         | 1       |         |         |         | 2       |         |         | 1       |          |          |          | 1        |          |          | 3<br>2     | 5            |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998)

45

|                       | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total du mois |      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------|
| Total/jour avril 1996 | 50      | 76      | 58      | 52      | 68      | 36      | 15      | 21      | 87      | 95       | 141      | 133      | 289      | 766      | 303      |               | 2190 |
| Total/jour mai 1996   | 117     | 96      | 42      | 67      | 52      | 93      | 54      | 56      | 35      | 48       | 43       | 44       | 59       | 35       | 59       |               | 900  |
| <b>Total 96 :</b>     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | <b>3090</b>   |      |







## Renseignements sur le programme "Piccole Isole" (94-96)

On peut voir dans les graphes suivants que, tant pour 1994 que pour 1995, la Corse se place au septième rang au niveau du nombre de captures pour les stations insulaires participant au programme "Piccole Isole" (8<sup>ème</sup> en prenant en compte les stations côtières). En 1996, Barcaggio occupe la 4<sup>ème</sup> place des stations insulaires (7<sup>ème</sup> pour l'ensemble), derrière trois stations qui ont bagué durant deux mois (ainsi qu'une station côtière).


STATIONS INSULAIRES 1994 (N= 41.225)




STATIONS COTIERES 1994 (N= (7.143)




STATIONS INSULAIRES 1995 (N= 35.465)




STATIONS COTIERES 1995 (N= (5.176)



STATIONS INSULAIRES 1996 (N= 40.206)



STATIONS COTIERES 1996 (N= (15.793)



65 espèces différentes ont été baguées en 1994 à Barcaggio, 76 en 1995, 75 en 1996. En comparaison, en 1994, 73 espèces ont été capturées à Capraia, 68 à Giannutri, 67 à Ventotene pour les meilleures, mais ces stations ont capturé entre 2,5 et 6 fois plus d'oiseaux qu'à Barcaggio. Pareillement en 1995 où les mêmes stations comptabilisent respectivement 82, 71 et 67 espèces avec 2 à 4 fois plus d'oiseaux. En 1996, les stations insulaires de Capraia et de Ventotene recensent respectivement 85 et 82 espèces, et la station côtière de Monte Brisighella 92 espèces (Giannutri n'a pas participé au programme cette année) ; ces trois stations ont bagué entre 3 et 5 fois plus d'oiseaux durant deux mois (30 jours seulement pour Barcaggio).

Avec 174 espèces contactées durant 30 jours au cours des trois années (observations et baguage), il est important de souligner la diversité de l'avifaune migratrice rencontrée à Barcaggio. Ainsi 225 espèces ont été recensées au printemps (donc sans les hivernants et migrateurs post-nuptiaux) à la pointe du Cap Corse (Barcaggio et Macinaggio) depuis le début des camps de baguage (1979). Une très grande partie de l'avifaune insulaire a pu être observée sur le site, même le Gypaète barbu, à l'exception de la Sittelle corse, qui fréquente essentiellement les forêts de pins Lariccio en montagne, et de certains limicoles, anatidés et grands échassiers peu communs qui stationnent sur des zones humides plus vastes.

Barcaggio se distingue des autres stations par le nombre de limicoles et d'oiseaux d'eau bagués relativement élevé. Ainsi en 1994, c'est la seule station où certaines espèces ont été capturées : Bécasseau minute (2), Chevalier gambette (2), Chevalier aboyeur (1) et Chevalier culblanc (1), de même qu'en 1995 : Blongios nain (1), Râle d'eau (1), Marouette ponctuée (1), Poule d'eau (6), petit Gravelot (1), Bécasseau minute (1), Bécassine sourde (1), Bécasse des bois (1), Chevalier culblanc (1), Chevalier guignette (25) et en 1996 : Héron Bihoreau (3), Héron pourpré (1), petit Gravelot (3), grand Gravelot (5), Combattant varié (1), Chevalier gambette (4), Chevalier aboyeur (1).

En outre en 1994, sur 8 Combattants variés capturés dans le cadre du programme pour l'ensemble des stations, 3 l'ont été à Barcaggio, de même, 61 Chevaliers sylvains dont 40 à Barcaggio (et 20 à la station de Aiguamolls Emporda' sur la côte espagnole), 38 Chevaliers guignette dont 37 à Barcaggio. Egalement en 1995, sur 12 Chevaliers sylvains, 11 ont été bagués à Barcaggio et en 1996 7 Gallinules-poules d'eau sur 14, 13 Chevaliers guignette sur 17, 52 Chevaliers sylvain sur 53.

On notera ainsi l'importance des zones humides (lagune, marais et embouchure de l'Acqua Tignese) pour la migration des oiseaux. Les autres stations sont dans leur majorité dépourvues de ce type de milieu.

En 1992, 1993, 1995 et 1996, le nombre d'hirondelles rustiques capturées à Barcaggio représentait respectivement 40%, 25%, 35% et 26% de l'effectif total du programme. En 1994, cette valeur dépassait à peine les 16%. Cette situation est expliquée par deux choses :

- seulement 725 hirondelles rustiques ont été capturées à Barcaggio durant le séjour 1994 alors que la moyenne sur cinq ans (92-96) est de 1023,
- certaines stations comme Ventotene, Giannutri et Aiguamolls Emporda' en ont capturé plus que d'ordinaire.

Les fauvettes à tête noire ont été capturées plus abondamment en 1994 à Barcaggio par rapport aux autres années : 223 captures pour une moyenne de 100 oiseaux (années 1991, 92, 93, 95). Cet effectif représente 12% du nombre total de fauvettes à tête noire capturées pour l'ensemble des stations en 1994 qui en comptabilise 1827. Il est par contre intéressant de noter qu'en 1996, les stations de Capraia, Illa de l'Aire, Ventotene et Monte Brisighella qui ont commencé à baguer dès début avril, ont pu capturer cette espèce en grand nombre. On remarque la même chose pour le Pouillot véloce et le Rouge-gorge. Cette tendance met en évidence que la migration de ces trois espèces a été certainement plus marquée avant le 15 avril, phénomène normal puisqu'il s'agit de trois espèces hivernantes.

En 1996, un important flux migratoire est mis en évidence à la fin du mois d'avril dans plusieurs stations : Barcaggio, Capraia, Columbrete, Illa de l'Aire et Albufera Alcudia (Balears), Capo San

Elia (Sardaigne), Aiguemolls Empodà (Espagne) et Orti Bottagone (Toscane). Ce pic migratoire est noté le même jour (le 29 avril) à Barcaggio et à Capraia et la veille en Sardaigne.


Sur l'île de Capraia, toujours en 1996, il est intéressant de noter le nombre de capture assez important de pinsons des arbres (201), de verdiers (288) et de chardonnerets (282), contrairement à Barcaggio où nous ne décelons pas un flux migratoire particulier pour ces espèces. Cette forte migration n'est observée qu'à Brisighella, sur la côte adriatique (486 pinsons, 97 verdiers, 143 chardonnerets), les deux stations ayant débuté leurs opérations de baguage dès le début avril.

### Déroulement de la migration en 1994, 1995 et 1996 à Barcaggio

Les tableaux (voir pages suivantes) présentent les données météorologiques relevées journalièrement aux printemps 1994, 1995 et 1996. Figurent également le métrage linéaire de filets installés et le nombre d'oiseaux capturés par jour. Ces deux derniers éléments sont associés dans la dernière colonne qui représente le nombre d'oiseaux capturés par mètre linéaire de filet (un filet fait environ 2m de haut), dont les résultats sont utilisés dans le graphique ci-après.

Au début du printemps 1994, le grand champ longeant la plage au niveau de la mare a été défriché et labouré. Cette zone a été largement utilisée par les granivores comme les tourterelles des bois où une troupe de 30 oiseaux est vue le 9/05/94.

Le printemps 1995 restera marqué par sa relative sécheresse. En effet, les marais du Palazzu et l'Acqua Tignese (en dehors de son embouchure) se trouvaient complètement exondés. La lagune a présenté également une plus faible étendue d'eau. Toutefois, les pluies abondantes du 24 avril ont provoqué un débordement du ruisseau (dans le milieu de la matinée du 25) et l'inondation des marais (après-midi du 26). Des flaques d'eau persisteront jusqu'à la fin du séjour, mais les limicoles ne seront pas au rendez-vous. On pense que malgré la pluie, toute la faune aquatique (insectes, batraciens), nourriture préférée des limicoles, n'a pu se développer. La relative absence de limicoles s'est également vérifiée au printemps sur l'étang de Biguglia.



Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour  
en fonction des conditions météorologiques et du mètre de filet en 1994

| DATE | TEMPS                       | VENT                 | Temp.<br>mini-maxi<br>par jour | Nbre de<br>captures<br>par jour | long. de<br>filets<br>(ml) | Nbre de<br>captures par<br>ml de filet |
|------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 16   | pluie modérée à forte       | E modéré             | 11-15                          | 0                               | 0                          | -                                      |
| 17   | pluie intermittente forte   | SW faible à modéré   | 10-16                          | 84                              | 156                        | 0,54                                   |
| 18   | couvert                     | NW fort à SW modéré  | 12-16                          | 61                              | 156                        | 0,39                                   |
| 19   | pluie intermittente forte   | nul                  | 11-16                          | 208                             | 156                        | 1,33                                   |
| 20   | couvert se dégageant        | nul                  | 6-16                           | 164                             | 156                        | 1,05                                   |
| 21   | nuageux                     | nul                  | 10-17                          | 146                             | 156                        | 0,94                                   |
| 22   | beau                        | SE fort              | 13-18                          | 23                              | 156                        | 0,15                                   |
| 23   | beau à peu nuageux          | nul                  | 7,5-18                         | 144                             | 168                        | 0,86                                   |
| 24   | beau                        | SE fort              | 9-19                           | 48                              | 156                        | 0,31                                   |
| 25   | pluie intermittente forte   | W modéré             | 11-18                          | 50                              | 135                        | 0,37                                   |
| 26   | beau à peu nuageux          | nul                  | 9-17                           | 48                              | 216                        | 0,22                                   |
| 27   | beau à nuageux              | SE à SW nul à modéré | 8-22                           | 40                              | 240                        | 0,17                                   |
| 28   | beau à peu nuageux          | nul à faible         | 10-21                          | 102                             | 240                        | 0,43                                   |
| 29   | beau à peu nuageux          | faible               | 12-23                          | 55                              | 240                        | 0,01                                   |
| 30   | beau                        | nul                  | 10-23                          | 84                              | 240                        | 0,01                                   |
| 1    | beau à peu nuageux          | nul                  | 13-23                          | 92                              | 240                        | 0,38                                   |
| 2    | peu nuageux à beau          | nul                  | 11-22                          | 30                              | 240                        | 0,13                                   |
| 3    | beau                        | SE faible            | 11-22                          | 46                              | 240                        | 0,19                                   |
| 4    | peu nuageux à beau          | SE faible            | 8-21                           | 82                              | 240                        | 0,34                                   |
| 5    | nuageux à beau              | W à SW fort          | 13-20                          | 63                              | 156                        | 0,40                                   |
| 6    | beau                        | nul                  | 10-21                          | 34                              | 156                        | 0,22                                   |
| 7    | beau                        | SE à S faible        | 9-22                           | 50                              | 156                        | 0,32                                   |
| 8    | beau à couvert              | faible               | 10-21,5                        | 50                              | 156                        | 0,32                                   |
| 9    | pluie intermittente forte   | SE modéré            | 12-17,5                        | 69                              | 156                        | 0,44                                   |
| 10   | beau                        | NW à W faible        | 9-21                           | 62                              | 156                        | 0,40                                   |
| 11   | beau à couvert              | NO modéré            | 11-20                          | 40                              | 156                        | 0,26                                   |
| 12   | pluie intermittente modérée | SE modéré            | 13-22,5                        | 30                              | 156                        | 0,19                                   |
| 13   | peu nuageux à couvert       | SE fort              | 14-22                          | 7                               | 156                        | 0,04                                   |
| 14   | beau à nuageux              | E à SE fort          | 12-22                          | 58                              | 156                        | 0,37                                   |
| 15   | beau                        | NE modéré            | 13-20,5                        | 33                              | 156                        | 0,21                                   |
|      |                             |                      | <b>MOYENNE</b>                 | <b>66,77</b>                    | <b>174,90</b>              | <b>0,37</b>                            |

Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour  
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1995

| DATE | TEMPS                        | VENT               | Temp.<br>mini-maxi<br>par jour | Nbre de<br>captures<br>par jour | long. de<br>filets<br>(ml) | Nbre de<br>captures par<br>ml de filet |
|------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 16   | beau                         | NNW modéré         | 8,5-16,5                       | 118                             | 271                        | 0,44                                   |
| 17   | beau                         | SSW faible         | 7-19                           | 82                              | 271                        | 0,30                                   |
| 18   | beau                         | E/SW faible/modéré | 11-19                          | 58                              | 277                        | 0,21                                   |
| 19   | beau à couvert               | SW faible à modéré | 8-19                           | 86                              | 277                        | 0,31                                   |
| 20   | nuageux, pluie intermittente | SW fort            | 6-18                           | 37                              | 237                        | 0,16                                   |
| 21   | couvert à nuageux            | SE fort            | 14-21                          | 17                              | 111                        | 0,15                                   |
| 22   | nuageux                      | SE faible à modéré | 13,5-19                        | 57                              | 227                        | 0,25                                   |
| 23   | nuageux, pluie intermittente | SE/E faible        | 14-18                          | 63                              | 277                        | 0,23                                   |
| 24   | pluie modérée à forte        | nul                | 9-15                           | 19                              | 55                         | 0,35                                   |
| 25   | pluie faible constante       | nul à SE faible    | 8-17                           | 106                             | 200                        | 0,53                                   |
| 26   | couvert à nuageux            | SW/W modéré à fort | 10-16,5                        | 27                              | 200                        | 0,14                                   |
| 27   | couvert                      | SSE modéré         | 9-18                           | 59                              | 277                        | 0,21                                   |
| 28   | peu nuageux                  | S faible           | 6,5- 18                        | 320                             | 277                        | 1,16                                   |
| 29   | peu nuageux                  | faible             | 12-18                          | 121                             | 277                        | 0,44                                   |
| 30   | couvert à peu nuageux        | nul                | 12,5-17                        | 104                             | 277                        | 0,38                                   |
| 1    | assez nuageux                | nul                | 10-20                          | 99                              | 277                        | 0,36                                   |
| 2    | beau                         | nul                | 11-22                          | 74                              | 277                        | 0,27                                   |
| 3    | beau                         | SSW nul à modéré   | 11-22                          | 51                              | 277                        | 0,18                                   |
| 4    | peu nuageux                  | nul à faible       | 8,5-22,5                       | 86                              | 277                        | 0,31                                   |
| 5    | beau                         | nul à faible       | 8-22,5                         | 205                             | 277                        | 0,74                                   |
| 6    | beau                         | NNW faible         | 13-22,5                        | 160                             | 277                        | 0,58                                   |
| 7    | peu nuageux                  | N faible           | 9-24                           | 112                             | 277                        | 0,40                                   |
| 8    | beau                         | SE nul à modéré    | 8-22,5                         | 57                              | 277                        | 0,21                                   |
| 9    | beau                         | O faible           | 9-22                           | 76                              | 277                        | 0,27                                   |
| 10   | pluie intermittente faible   | SO faible          | 12-21,5                        | 91                              | 170                        | 0,54                                   |
| 11   | pluie intermittente faible   | SW faible          | 13-22                          | 70                              | 180                        | 0,39                                   |
| 12   | pluie forte l'après-midi     | SW faible          | 12-20                          | 25                              | 150                        | 0,17                                   |
| 13   | pluie intermittente faible   | SO à NO fort       | 13-18                          | 0                               | 0                          | -                                      |
| 14   | nuageux                      | NNO à SO modéré    | 12-18                          | 15                              | 70                         | 0,21                                   |
| 15   | peu nuageux                  | SE faible          | 7,5-18                         | 48                              | 180                        | 0,27                                   |
|      |                              |                    | <b>MOYENNE</b>                 | <b>81,43</b>                    | <b>225,13</b>              | <b>0,34</b>                            |

Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour  
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1996

| DATE | TEMPS                          | VENT                 | Temp.<br>mini-maxi<br>par jour | Nbre de<br>captures<br>par jour | long. de<br>filets<br>(ml) | Nbre de<br>captures par<br>ml de filet |
|------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 16   | beau                           | SW à W modéré        | 8,5-19                         | 50                              | 207                        | 0,24                                   |
| 17   | beau à nuageux                 | E faible à nul       | 5-20                           | 76                              | 207                        | 0,37                                   |
| 18   | assez beau                     | nul à O faible       | 5-20,5                         | 58                              | 207                        | 0,28                                   |
| 19   | beau                           | nul à SO faible      | 12-21                          | 52                              | 207                        | 0,25                                   |
| 20   | beau                           | E faible             | 4,5-24                         | 68                              | 273                        | 0,25                                   |
| 21   | beau                           | SE modéré            | 8,5-21                         | 36                              | 273                        | 0,13                                   |
| 22   | nuageux                        | SE à E fort          | 13-20                          | 15                              | 177                        | 0,08                                   |
| 23   | pluie intermittente faible A.M | SE/S fort            | 14-18                          | 21                              | 162                        | 0,13                                   |
| 24   | couvert, éclaircies, pluie     | SE modéré à faible   | 9,5-20                         | 87                              | 288                        | 0,30                                   |
| 25   | pluie faible constante/interm. | nul à faible         | 12,5-16                        | 95                              | 262                        | 0,36                                   |
| 26   | pluie constante/intermittente  | nul à E faible       | 13-16                          | 141                             | 243                        | 0,58                                   |
| 27   | couv. pl. interm. faible matin | nul à E faible       | 12,5-17,5                      | 133                             | 288                        | 0,46                                   |
| 28   | couvert pluie faible par mom.  | nul                  | 13-?                           | 289                             | 278                        | 1,04                                   |
| 29   | passages nuageux, éclaircies   | nul à SW faible      | 12,5-19                        | 766                             | 258                        | 2,97                                   |
| 30   | beau à peu nuageux             | nul à SW faible      | 11-21                          | 303                             | 258                        | 1,17                                   |
| 1    | beau/passages nuageux          | W assez fort matin   | 14-21                          | 117                             | 246                        | 0,48                                   |
| 2    | beau à assez nuageux           | irrégulier faible    | 10,5-20,5                      | 96                              | 280                        | 0,34                                   |
| 3    | orageux à beau                 | SSW modéré à fort    | 12-22                          | 42                              | 288                        | 0,15                                   |
| 4    | beau à peu nuageux             | E/SE faible à modéré | 7-25                           | 67                              | 288                        | 0,23                                   |
| 5    | beau à nuageux                 | E faible             | 9-21,5                         | 52                              | 288                        | 0,18                                   |
| 6    | beau                           | W faible à nul       | 10-24                          | 93                              | 288                        | 0,32                                   |
| 7    | nuageux à beau                 | faible               | 9-26,5                         | 54                              | 288                        | 0,19                                   |
| 8    | couvert/peu nuageux pl. faible | nul                  | 13,5-23                        | 56                              | 276                        | 0,20                                   |
| 9    | passages nuageux, éclaircies   | faible à nul         | 10,5-23                        | 35                              | 288                        | 0,12                                   |
| 10   | pass. nuag./couvert, pluie 17h | nul                  | 11,5-21                        | 48                              | 278                        | 0,17                                   |
| 11   | passages nuageux, éclaircies   | W faible à nul       | 12-21                          | 43                              | 288                        | 0,15                                   |
| 12   | couvert                        | W faible             | 15-19                          | 44                              | 268                        | 0,16                                   |
| 13   | couvert/peu nuageux            | W faible             | 13-21                          | 59                              | 288                        | 0,20                                   |
| 14   | beau/peu nuageux/couvert       | SW faible à modéré   | 13,5-22                        | 35                              | 288                        | 0,12                                   |
| 15   | couvert/pass. nuag./éclaircies | W faible à modéré    | 14,5-20,5                      | 59                              | 288                        | 0,20                                   |
|      |                                |                      | <b>MOYENNE</b>                 | <b>103,00</b>                   | <b>260,53</b>              | <b>0,40</b>                            |

A l'inverse, le printemps 1996 peut être considéré comme très humide. La rivière a bien coulé toute la durée du camp, gonflée occasionnellement par quelques orages. Le marais du Palazzu est resté inondé, alors que la lagune avait rarement atteint le niveau observé (de mémoire de bagueur). Cette situation a donc réduit considérablement la présence de vasière et en conséquence le nombre de limicoles observés, notamment les marouettes.

#### Commentaires (les pics de migration sont indiqués en gras)

Un thermomètre minima-maxima a été installé sous un olivier à proximité du camp durant les trois années. Le relevé de ces températures ne fournit pas d'indication permettant de comprendre une quelconque influence sur la migration.

#### \* 1994

Température minima-maxima : 6°C 20/04 au matin ; 23°C le 1/05 en début d'après midi.

- **18, 19, 20, 21, 23 avril** : le temps est couvert les 18, 19 et une partie du 20, avec de la pluie intermittente le 19 et du vent fort NW tournant SW modéré le 18. Le vent est nul les autres jours. Les conditions pour les captures sont très bonnes : couvert, un peu de pluie, pas de vent (du 20 au 23). En 7 jours, 830 oiseaux sont capturés, représentant plus de 40% des captures réalisées durant le séjour.
- 22 et 24 avril : le vent fort du SE, perturbe les captures.
- **28 avril** : le temps est favorable aux captures : peu nuageux, vent faible, 102 oiseaux sont bagués dans la journée.
- 29 et 30 avril : malgré le beau temps et l'absence de vent, peu de captures sont réalisées. Il semble que les oiseaux n'ont pas stationné.
- **1<sup>er</sup> mai** : comme en 1993, les oiseaux ne respectent pas la fête du travail. 92 oiseaux sont capturés par un temps peu nuageux avec un vent nul.
- 2 avril : les conditions climatiques sont identiques à la veille, mais seulement 30 oiseaux sont bagués.
- **5 mai** : malgré un vent fort (W à SW), 63 oiseaux sont capturés.
- 6 mai : le beau temps avec un vent nul n'incite pas les oiseaux à stationner, 34 captures sont comptabilisées.
- **9 et 10 mai** : la pluie du 9 bloque la migration sur le site, jusqu'au lendemain où les conditions sont favorables. Les oiseaux peuvent faire leurs réserves pour reprendre leur voyage. 131 oiseaux sont bagués en deux jours.
- 13 mai : le vent fort du SE compromet le rendement des captures.
- **14 mai** : les conditions climatiques sont similaires à la veille, mais les captures sont plus de huit fois plus importantes. Pas d'explication.

#### \* 1995

Température minima-maxima : 6,5°C le 24/04 ; 24°C le 7/05

- **16/04** : 118 captures dans la journée avec un vent NNW modéré qui empêche peut-être les migrateurs de partir.
- **24 et 25/04** : bien qu'il n'y ait peu de captures le 24 (19), la faible longueur de filets déployés a un bon rendement. Le 25 est une bonne journée avec 106 oiseaux bagués grâce à 200 mètres de filet. Les deux jours sont pluvieux, notamment le 24 où les filets sont pliés à 12h en raison de la pluie trop forte.
- 26 et 27/04 : le vent SW modéré à W fort le 26, puis SSE modéré le 27 compromet la capture d'oiseaux.
- **28 et 29/04** : le temps peu nuageux et un vent faible (S le 28) est idéal pour la capture, d'autant qu'il fait suite à deux jours de vent. 441 oiseaux sont capturés en deux jours.
- 3/05 : seulement 51 captures.
- **4 au 7/05** : 563 captures en 4 jours (140 oiseaux par jour). Le beau temps et l'absence de vent contribuent à la réussite du baguage
- 8 et 9/05 : "creux" relatif entre deux pics de migration.
- **10 et 11/05** : le flux migratoire semble être plus important au début de cette période de mauvais temps.
- 12 et 13/05 : les filets sont pliés une partie de l'après-midi du 12 en raison de la pluie violente, et toute la journée du 13 pour cause de vent très fort.

\* 1996

Température minima-maxima : 5°C les 17 et 18/04 ; 26,5°C le 7/05

L'essentiel du passage migratoire s'est concentré du **26 au 30 avril** : 1632 oiseaux capturés en 5 jours. Si l'on prend en compte les deux jours précédents et les deux jours suivants cette période, on obtient 2021 oiseaux, soit 65% des oiseaux capturés durant le séjour en seulement 9 jours. Le record du nombre d'oiseaux capturé en un jour datant de 1991 (311 oiseaux le 23/04/91) est pulvérisé : 766 captures le 29/04, dont 574 hirondelles rustiques !

Le reste du séjour est marqué par une relative constance avec une cinquantaine d'oiseaux par jour, excepté les creux des 21, 22 et 23/04 (respectivement 36, 15 et 21 captures) et 9 et 14/05 (35 captures chaque jour).

### Variation du nombre de captures 1991-1996

Nombre d'oiseaux capturés par jour (moyennes)

|              | 1991  | 1992  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996  | Moy. 91-96 | Moy. 92-96 |
|--------------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------------|
| <b>avril</b> | 176,5 | 57,6  | 56,1 | 83,8 | 84,9 | 146,0 | 100,82     | 85,68      |
| <b>mai</b>   | 77,1  | 99,5  | 92,7 | 49,7 | 77,9 | 60,0  | 76,15      | 75,96      |
| <b>/an</b>   | 126,8 | 78,57 | 74,4 | 66,7 | 81,4 | 103,0 | 88,48      | 80,81      |

L'année 1991 reste le record pour le nombre de captures. Celui-ci est dû à l'utilisation d'enregistrements (repassé) pour attirer les hirondelles. On notera l'efficacité de cette méthode sur ces oiseaux, puisque le nombre de leur capture est de 54% plus élevé par rapport à la moyenne 92-96 (45% pour la moyenne 91-96).

Retenons que le rendement quotidien en oiseaux capturés se situe entre 70 et 80 sans employer la repasse et qu'en l'utilisant, le nombre de captures d'hirondelles peut être multiplié par deux.

| Année             | Nbre captures sans <i>H. r.</i> | Nbre captures d' <i>H. r.</i> | total captures | % <i>H. r.</i> |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1991              | 1596                            | 2208                          | 3804           | 58%            |
| 1992              | 1270                            | 1087                          | 2357           | 50%            |
| 1993              | 1137                            | 1094                          | 2231           | 49%            |
| 1994              | 1278                            | 725                           | 2003           | 36%            |
| 1995              | 1618                            | 825                           | 2443           | 34%            |
| 1996              | 1705                            | 1385                          | 3090           | 45%            |
| <b>Total</b>      | 8604                            | 7324                          | 15928          |                |
| <b>Moy. 91-96</b> | 1434                            | 1221                          | 2655           | 46%            |
| <b>Moy. 92-96</b> | 1402                            | 1023                          | 2425           | 42%            |

*H. r.* = Hirondelle rustique

Sans tenir compte des hirondelles rustiques, on constate que le nombre d'oiseaux capturés fluctue de seulement 20% (en plus ou en moins) par rapport à la moyenne d'oiseaux capturés en une saison.

Le rendement en capture des hirondelles paraît plus aléatoire. On remarque en effet une baisse du nombre de captures d'hirondelles rustiques en 1994 et 1995 où celles-ci représentent environ 35% des captures, contre 50% en 1992 et 1993, 45% en 1996.

Les variations du nombre d'oiseaux bagués par jour est ainsi très dépendant de l'importance du passage migratoire des hirondelles rustiques, ou peut être des conditions permettant de nombreuses captures d'hirondelles sur la rivière et dans le maquis : peu de vent, un ciel couvert et de nombreux insectes en vol bas (ou éclosions) facilitent la capture d'effectifs plus importants d'hirondelles. Il semble que la capture des autres espèces d'oiseaux soit moins tributaire de ce type de conditions, du moins sur l'ensemble de la période d'étude (trente jours).

### Conclusion

225 espèces d'oiseaux ont été répertoriés depuis 1979, malgré l'absence d'une grande partie des anatidés habituellement observés en Corse et de certains limicoles peu communs, en raison de la trop faible superficie de la zone humide. La pointe du Cap Corse est sans aucun doute un site exceptionnel pour l'étude de la migration printanière des oiseaux.

Les informations concernant les reprises d'oiseaux bagués devraient faire l'objet d'une publication séparée reprenant toutes les données depuis 1979.

\*\*\*\*\*

Certaines indications contenues dans ce rapport sont extraites des suppléments (Contributo n° 17, 20 & 24) du "*Bollettino dell'Attività di Inanellamento*", publication de l'"*Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*" (Via Ca' Fornacetta, 9 - Ozzano dell'Emilia - Bologna), dont les auteurs sont : Fernando SPINA, Alessandro MONTEMAGGIORI, Alberto MASSI et Rosita MANTOVANI.

ANNEXE 1 : INFORMATIONS RECENTES SUR LES REPRISES D'OISEAUX

| ESPECES               | DATES ET LIEUX DE BAGUAGE                  | DATES ET LIEUX DE REPRISE                  |
|-----------------------|--|--|
| Chevalier gambette    | 29/08/89 Boyton, Suffolk (Grande Bretagne) | 07/05/93 Barcaggio                         |
| Chevalier guignette   | 17/07/86 Beerse (Belgique)                 | 01/05/95 Barcaggio                         |
| Chevalier guignette   | 16/07/91 Castelvoturno (Italie)            | 08/05/92 Barcaggio                         |
| Petit-Duc scops       | 15/04/91 Barcaggio                         | 10/08/92 Ravenna (Italie)                  |
| Huppe fasciée         | 21/04/91 Barcaggio                         | 13/03/92 Castelvoturno (Italie)            |
| Hirondelle de rivage  | 22/04/91 Barcaggio                         | 20/05/92 Borghetto (Italie)                |
| Hirondelle de rivage  | 31/08/91 Sussex (Grande Bretagne)          | 23/04/92 Barcaggio                         |
| Hirondelle de rivage  | 03/07/92 Fiszatelek (Hongrie)              | 02/05/93 Barcaggio                         |
| Hirondelle de rivage  | 27/07/94 Michelmersh (Allemagne)           | 23/04/95 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 30/04/87 Barcaggio                         | 15/08/87 Hegyko (Hongrie)                  |
| Hirondelle rustique   | 18/08/89 Antwerpen (Belgique)              | 20/04/92 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 22/04/91 Barcaggio                         | 26/05/93 Butzow (Allemagne)                |
| Hirondelle rustique   | 08/05/91 Ventotene (Italie)                | 08/05/92 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 13/08/91 Gloucestershire (Grande Bretagne) | 15/05/92 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 26/08/91 West-Vlaanderen (Belgique)        | 13/05/92 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 04/05/92 Barcaggio                         | 09/08/92 Einavatnet (Norvège)              |
| Hirondelle rustique   | 28/04/93 Barcaggio                         | 20/07/96 Musone (Italie)                   |
| Hirondelle rustique   | 29/04/93 Barcaggio                         | 07/05/95 Vitovlie (Slovénie) [femm. nich.] |
| Hirondelle rustique   | 01/05/93 Barcaggio                         | 15/10/94 Boje-Ebok (Nigéria)               |
| Hirondelle rustique   | 02/05/93 Barcaggio                         | 24/05/93 Nassenheide (Allemagne)           |
| Hirondelle rustique   | 04/05/93 Barcaggio                         | 23/07/93 Reutlingendorf (Allemagne)        |
| Hirondelle rustique   | 13/06/93 Poulton (G. B.) [nich., poussin]  | 04/05/94 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 07/09/95 Karlovac (Croatie)                | 29/04/96 Barcaggio                         |
| Hirondelle rustique   | 26/04/96 Barcaggio                         | 30/01/97 Boje, Ebok (Nigéria)              |
| Hirondelle rustique   | 28/04/96 Barcaggio                         | 16/09/96 Galenbocker (Allemagne)           |
| Hirondelle rustique   | 01/05/96 Barcaggio                         | 09/05/96 Jetscheba (Allemagne)             |
| Phragmite des joncs   | 11/08/84 Ostrava (Tchécoslovaquie)         | 03/05/87 Barcaggio                         |
| Rousserolle turdoïde  | 03/05/92 Barcaggio                         | 17/07/93 Fejer (Hongrie)                   |
| Hypolaïs icterine     | 06/05/95 Barcaggio                         | 07/05/95 Capraia (Italie)                  |
| Fauvette à tête noire | 23/04/94 Barcaggio                         | 14/04/95 Bolle di Magadino (Suisse)        |
| Fauvette à tête noire | 17/04/96 Barcaggio                         | 26/06/96 Scrvia, Alessandria (Italie)      |
| Pouillot fitis        | 28/05/93 Telemarck (Norvège)               | 28/04/94 Barcaggio                         |
| Gobemouche noir       | 04/06/82 Staatsbos (Pays Bas)              | 06/05/83 Barcaggio                         |
| Loriot d'Europe       | 09/05/88 Barcaggio                         | 04/12/90 Zaglievi (Grèce)                  |
| Chardonneret          | 19/04/94 Barcaggio                         | 01/05/94 Capraia (Italie)                  |

## Annexe 2

## Références des publications sur la migration des oiseaux dans le Cap Corse (classement chronologique)

- Collectif. (1979). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. *Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse*. 14 p.
- Collectif. (1980). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. *Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse*. 26 p.
- Collectif. (1981). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse. *Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse*. 16 p.
- BRUNSTEIN, D. (1983). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : avril et mai 1982. *Travaux Scientifiques Parc. Nat. Rég. Corse*. II(2) : 56-70.
- BRUNSTEIN, D. (1983). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : année 1983. *Club Ornith. Ass. Amis du Parc Nat. Rég. Corse*. Document interne non publié. 20 p.
- BRUNSTEIN, D. (1984). - Tableau des captures d'oiseaux à Barcaggio : avril et mai 1984. *Document interne non publié*. 2 p.
- BRUNSTEIN, D. (1986). - Tableau des captures d'oiseaux à Barcaggio : mai 1985. *Document interne non publié*. 1 p.
- CANTERA, J.-P. et VUILLAMIER, J.-M. (1988). - Observations sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse : mars, avril et mai 1987. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse*. 19 : 49-65.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., ROSSI, T., THIBAUT, J.-C. (1989). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa, Haute Corse) : saison 1988. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse*. 23 : 57-78.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., ROSSI, T., THIBAUT, J.-C. (1990). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa, Haute Corse) : saison 1989. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse*. 26 : 24-48.
- MARZOCCHI, J.-F. (1990). - Contribution à l'étude de l'avifaune du Cap Corse. *Ed. Marzocchi (Bastia)*. 41 p.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., GALETTI, M.-C., ROSSI, T., THIBAUT, J.-C., VUILLAMIER, J.-M. (1991). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux au Cap Corse (Ersa et Rogliano, Haute Corse) : saison 1990. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse*. 33 : 89-103.
- CANTERA, J.-P., DESNOS, A., FAGGIO, G., PATRIMONIO, O., ROSSI, T. (1992). - Rapport sur la migration printanière des oiseaux à Barcaggio, Cap Corse (Ersa et Rogliano, Haute Corse) : saison 1991. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse*. 40 : 47-80.
- CANTERA, J.-P., FAGGIO, G., ROSSI, T. (1994). - La migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse : saisons 1992 et 1993. *Trav. Sci. Parc. Nat. Rég. Rés. Nat. Corse*. 46 : 1-39.

**LA MIGRATION PRINTANIÈRE  
DES OISEAUX DANS LE CAP CORSE**

**Barcaggio - Ersa, Rogliano  
(Haute Corse)**

**Saison 1997**

**Par Gilles FAGGIO et Tony ROSSI**

**Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse**  
(Groupe Ornithologique de Corse ; Conservatoire Régional des Sites de Corse)

**Centre Régional de Bague de la Corse**  
(Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux - CRBPO -  
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris)

**- Résidence Pietramarina, Toga - 20200 BASTIA (Tel/Fax. 04 95 32 71 63)**

**AVRIL 1998**

**LA MIGRATION PRINTANIERE  
DES OISEAUX DANS LE CAP CORSE  
Barcaggio - Haute Corse (Ersa, Rogliano)  
saison 1997**

**Sommaire**

**Introduction**

**Déroulement du camp de baguage 1997**

**Participants**

**Liste systématique des espèces observées ou capturées**  
(nombre d'espèces entre parenthèses)

**Non passereaux :**

Grèbes, puffins, fou et cormorans (6)  
Grands échassiers (7)  
Anatidés (3)  
Rapaces diurnes (13)  
Gallinacés (2)  
Rallidés (6)  
Limicoles (23)  
Mouettes et Goélands (4)  
Pigeon, tourterelles et coucou (5)  
Rapaces nocturnes (4)  
Engoulevent, martinets, guêpier, rolhier, huppe, pic, torcol (9)

**Passereaux :**

Alouettes (4)  
Hirondelles (5)  
Pipits, bergeronnettes et Troglodyte (9)  
Turdidés (12)  
Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets (18)  
Gobemouches (3)  
Mésanges et espèces voisines (4)  
Loriot et Pies-gieches (3)  
Corvidés (5)  
Moineaux et Fringilles (8)  
Grosbec et Bruants (5)

**Bilan des poses de bagues par espèce et par jour**

**Détail des oiseaux capturés aux pièges**

**Indications sur la migration 1997**

## Introduction

Depuis 1979, de nombreux ornithologues et bagueurs se succèdent sur le site de Barcaggio, à la pointe du Cap Corse (extrémité nord de l'île) afin d'étudier la migration printanière des oiseaux. Cette opération est coordonnée par le Groupe Ornithologique de Corse (groupement spécialisé de l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse).

Limité à quelques jours les premières années, le camp est opérationnel durant 30 jours (du 16 avril au 15 mai) depuis la saison 1991. Depuis cette date, cette opération est prise en compte dans un vaste programme sur l'étude de la migration pré-nuptiale des oiseaux en Méditerranée occidentale. Ce programme, initié en 1988, est organisé par l'*Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* (INFS) de Bologna (Italie) et regroupe une quinzaine de stations de baguage (Italie continentale et îles proches de la côte, Sardaigne, Malte, Capraia, les Baléares,...). Plus de 340.000 oiseaux ont été bagués dans le cadre de ce programme entre 1988 et 1996. Les résultats sont publiés chaque année dans un numéro spécial de la revue de l'INFS.

La station ornithologique de Barcaggio est la seule station française participante à ce programme. Les données concernant le baguage des oiseaux à Barcaggio sont envoyées à l'INFS, ainsi qu'au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO), au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

225 espèces d'oiseaux ont été dénombrées à la pointe du Cap Corse depuis 1979 (sites de Barcaggio et du marais de Macinaggio confondus ; espèces capturées ou observées).

## Déroulement du camp de baguage 1997

Le camp s'est déroulé du 16 avril au 15 mai 1997. Les données recueillies ont été complétées par des observations réalisées quelques jours avant le début officiel du camp.

Les filets totalisant une moyenne de 254,47 mètres linéaires sur tout le séjour ont été disposés aux emplacements habituels, à savoir la saulaie, le maquis, les oliviers, la rivière et la lagune. Compte tenu de la sécheresse, aucun filet n'a été installé sur la mare de la plage, ni dans le marais du Palazzu, tous deux asséchés.

Une nasse et deux matoles ont également été installées à la lagune. La nasse a été disposée durant les premiers jours sur la rive sud de la seconde lagune, puis déplacée le 24 avril à l'extrémité est de la seconde lagune. Les matoles ont été déplacées à plusieurs reprises à différents emplacements sur la seconde lagune et dans la saulaie (1 matole durant les premiers jours, mais sans résultat).

Indépendamment du programme *Piccole Isole*, la station a accueilli deux catalans (Gabriel GARGALLO et Maïté) réalisant une étude sur la Fauvette passerinette (biologie de la reproduction, territorialité,...).

## Participants

AGENC, BARICAULT Olivier, BAUDET Claude et Georgette, BERGER Eric et son acolyte, BONACCORSI Gilles, BONNET Corinne, BRAZZINI Florence, BUZZI Thomas et Georges, CAMOIN Alain, CANTERA Jean-Pierre, CARIO Jean-Charles, CLAVIER Jean-Louis, CROUZIER Pierre, DELAUGERRE Michel et Robinson, DENISE Cyril (O.N.F.), FAGGIO Gilles, FAGGIO Nanou, FERRAND Françoise, GARGALLO Gabriel, I.N.R.A. (2 visites d'une dizaine de personnes), GRAZZIANI Jean, JOLIN Cécile, JORDAN Raphaël (C.O.R.A. Haute Savoie), JOUAIRE Stéphane, KAVTZKY Hannes, LEBRET Arnaud, LEME Marie-Laure, MASSAS Nicole, MONEGLIA Pasquale, RECORBET Bernard, ROSSI Tony et Béatrice, TESSEYRE Aude, VUILLAMIER Jean-Marcel, Maïté, Elise, Misgiu et tous les autres ...

**Liste des espèces observées à Barcaggio durant la migration de printemps du 15 avril au 15 mai 1997** (ordre systématique selon la *Liste LPO des oiseaux de l'ouest Paléarctique* - 1996). (le nom italien est indiqué en raison de notre participation au programme de recherche italien "*Piccole Isole*"). Les commentaires sont parfois complétés d'observations réalisées en dehors de la période de baguage ou dans d'autres localités proches de Barcaggio (notamment le secteur de Macinaggio). Lorsque le lieu d'observation n'est pas précisé dans le texte, il est sous-entendu qu'il s'agit de Barcaggio.

## NON PASSEREAUX

### Grèbes, puffins et cormorans

#### Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficolis* Tuffetto

Lagune de Barcaggio : 1 le 6/04, noté le 14/04, 1 le 19/04 (8h), 2 le 20/04 (8h), chant le 24/04 (17h30), cris le 28/04 (11h30), chant le 29/04 (9h45), 1 ou 2 le 30/04 (12h20 et 15h30), chant le 2/05 (7h) + petits cris (poussins ?), 2 chants le 4/05 (12h, 13h30), 2 le 15/05.

#### Puffin cendré *Calonectris diomedea* Berta maggiore

Environ 50 le 11/04, quelques oiseaux notés les 26/04 et 3/05, 15 le 27/04 près de Giraglia.

#### Puffin de Méditerranée *Puffinus puffinus yelkhouan* Berta minore

3 le 27/04.

#### Fou de Bassan *Sula bassana* Sula

3 en pleine mer (traversée Nice/Bastia) le 5/04.

#### Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* Cormorano

1 le 13/04, 12 en V le 19/04 (12h), 1 le 22/04 (9h, embouchure rivière), 1 le 26/04 au ras de l'eau direction ouest, 1 le 6/05 à Agnello.

#### Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotellus* Marangone dal ciuffo

1 le 20/04, 10 aux Finocchiarola le 27/04, 8 pêchent près du bord de côte le 27/04, 1 le 29/04 (9h, embouchure), 2 le 1/05 (7h, en face parking) et un autre vu à 12h45, 4 le 11/05, 15 le 12/05 près du bord de la côte, 2 immatures à 16h le 15/05.

### Grands échassiers

#### Butor étoilé *Botaurus stellaris* Tarabuso

1 le 14/04.

#### Blongios nain *Ixobrychus minutus* Tarabusino

1 le 24/04 sur un mur près de la rivière où il capture un lézard, revu à plusieurs reprises dans la journée, vu à 18h30 avec un lézard (*Podarcis sicula*) dans le bec, 1 le 4/05 (lagune 12h-13h30), 1 femelle au marais de Macinaggio le 6/05, 1 le 12/05 (lagune 6h et 12h30), 1 femelle le 15/05 (lagune 13h), 2 mâles le 15/05 au marais de Macinaggio. 9 captures (toutes en mai), dont 8 du 12 au 15/05.

#### Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* Nitticora

1 à 3 vus régulièrement au cours du séjour (28 mentions). Observations remarquables : 12 le 9/04 au large de la Giraglia, 4 le 16/04, 4 le 27/04. 2 captures.

#### Crabier chevelu *Ardeola ralloides* Sgarza ciuffetto

1 le 20/04 (lagune, 8h), 1 le 20/04 à Macinaggio, 1 le 22/04 (8h-8h30 et 11h), 1 le 24/04 (lagune), 1 les 26, 28 et 29/04 à Macinaggio, 3 le 8/05 à Macinaggio, 1 le 10/05 à Tollare, 3 le 14/05 (lagune, dont 1 capturé dans une matole).

**Aigrette garzette** *Egretta garzetta* Garzetta

1 à 2 oiseaux observés régulièrement (31 mentions). Observations exceptionnelles : 23 à Macinaggio le 20/04, 11 le 25/04 à Macinaggio, 10 à Macinaggio les 26 et 28/04, 6 le 29/04 (Macinaggio), 5 les 1 et 2/05 (Macinaggio), 24 le 4/05 (partant du maquis/oliviers vers la lagune, 6h45), 4 le 5/05 (lagune, 8h), 4 le 6/05 (lagune, 8h15).

**Héron cendré** *Ardea cinerea* Airone cenerino

1 à 2 observés régulièrement à Barcaggio et Macinaggio (29 mentions). Observations particulières : 3 le 10/04, 26 le 20/04 dont 5 restés à la lagune et 21 partis au dessus de la mer direction ouest, vol très lent (matin), 6 le 21/04 (lagune), 1 avec un gros batracien dans le bec le 9/05, 1 s'envole avec une couleuvre dans le bec le 13/05 (lagune, 10h40).

**Héron pourpré** *Ardea purpurea* Airone rosso

Au moins un oiseau observé pratiquement chaque jour (32 mentions). 3 le 14/04, 2 le 18/04, 4 le 20/04, 3 le 20/04 à Macinaggio, 2 le 24/04 + 1 plumée (envol d'un Busard des roseaux : prédation ?), 3 le 1/05 à Macinaggio.

**Anatidés****Canard sp.**

3 petits canards indéterminés le 20/04 (lagune 8h).

**Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* Alzavola

1 femelle le 13/04.

**Sarcelle d'été** *Anas querquedula* Marzaiola

1 le 23/02, 1 femelle du 5 au 13/04, 1 le 16/04, 1 femelle le 18/04 (9h-12h).

**Canard souchet** *Anas clypeata* Mestolone

2 le 30/04, se posent dans la scirpaie de la lagune à 7h30, revus à 12h30.

**Rapaces diurnes****Bondrée apivore** *Pernis apivorus* Falco pecchiaiolo

1 le 5/05 (12h15), 1 (supposée) le 6/05 en vol au dessus du village (7h), puis 2 à Agnello, 1 le 7/05 (lagune 16h20), 3 le 10/05 (direction sud ouest, 18h30).

**Milan noir** *Milvus migrans* Nibbio bruno

1 le 6/04, 1 le 16/04 (17h30), 1 le 5/05 (saulaie, 18h30, assez bas), 1 le 12/05 (près du village, 13h40).

**Milan royal** *Milvus milvus* Nibbio reale

3 le 6/04, 1 le 3/05 (14h45 au dessus du maquis), 1 à Macinaggio le 6/05 (6h30-9h).

**Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* Falco di palude

Observation régulière de 1 à 3 oiseaux chaque jour (29 mentions). 4 le 5/04, 15 femelles et 7 mâles le 6/04, 10 femelles et 5 mâles le 10/04 (toujours par vent d'est 2-3 pour ces premières observations), 3 femelles et 1 mâle le 11/04, 7 femelles et 3 mâles le 12/04, 5 femelles et 4 mâles le 13/04, 20 femelles et 6 mâles le 14/04, 4 le 20/04, 1 femelle avec rectrices abîmées vue les 30/04, 1, 5, 10 et 15 (capturée dans une matole le 5/05). Cet oiseau a été vu le 15/05 à 18h15 en vol au dessus du champ aux vaches de la plage en direction de la mer, d'abord en vol haut avec quelques piquées, puis en vol au ras de l'eau (entre la côte et la Giraglia).

**Busard Saint Martin** *Circus cyaneus* Albanella reale

6 femelles le 6/04, 1 femelle le 14/04.

**Busard cendré** *Circus pygargus* Albanella minore

1 mâle le 16/04 (tourne dans la vallée, 17h), 1 mâle le 22/04 (vers la saulaie), 1 mâle le 23/04 (camp, 19h), 1 le 25/04, 1 le 8/05, 1 femelle le 11/05 (lagune, 8h45).

**Busard sp. *Circus sp.***

5 le 6/04 (des roseaux ?), 1 femelle "croupion blanc" le 23/04, 1 cendré ou Saint Martin le 1/05 (9h45, saulaie), 1 passe le long de la côte le 5/05 (trop rapide).

**Epervier d'Europe *Accipiter nisus* Sparvierio**

6 le 6/04 en migration, 3 le 14/04 en migration, 1 le 18/04 (village, 8h), 1 femelle le 14/04 (chassant sur un chemin, 9h15), 1 femelle le 4/05 (lagune 20h15). Une femelle est capturée le 23/04.

**Buse variable *Buteo buteo* Poiana**

1 le 26/04 à Macinaggio, 2 le 29/04 (11h, plage), 1 le 1/05, 1 le 3/05 (champ vaches).

**Aigle royal *Aquila chrysaetos* Aquila reale**

1 immature les 5 et 6/04, 1 le 18/04 en vol haut à 14h15, attaqué par un OVNI (Oiseau Volant Non Identifié).

**Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* Falco pescatore**

Migrateurs : 2 le 14/04, 1 le 10/04 (haut),

Locaux (a priori) : 1 le 7/04 (chasse dans la rade), 2 le 8/04 dont un chasse sur la lagune, 1 le 12/04, 1 le 15/04 (12h), 2 en vol bas le 17/04 (16h30), 1 le 20/04 (vu à 11h et 13h), 1 le 22/04 avec un petit poisson (8h-8h30, direction ouest), puis avec un poisson plus gros à 10h30 (direction ouest), 1 à 13h (sans poisson) 1 le 23/04 (pêche, 6h30) puis 1 à 15h avec un gros poisson au dessus du village, 1 le 25/04 (plusieurs fois dans la journée), 1 le 26/04 (7h, 7h10, 7h30 bague verte ?) 1 mâle (13h, bague rouge patte droite ?), 1 le 27/04 (6h45 et 12h), 1 le 28/04 (8h10, lagune) puis 1 mâle (vol et pêche, bague verte patte droite ?), 1 femelle le 28/04 (pêche, 19h45), 1 le 29/04 (pêche, 13h30), puis 2 (mâle et femelle) en vol haut au dessus du camp en criant (16h50), 1 le 30/04 (lagune, 11h), 1 le 2/05 (pêche, 7h), 1 le 4/05 (6h30, embouchure/saulaie), 1 le 5/05 (lagune 9h15) et un à 9h25 en pêche (le même), 1 le 8/05 (en vol, embouchure), 1 le 12/05 (17h, lagune), 1 le 13/05 (17h, bord de mer).

**Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Gheppio**

Un couple est régulièrement observé près du camp, alors qu'un autre semble nicher dans la Tour d'Agnello. Un mâle adulte est capturé le 20/04.

**Faucon hobereau *Falco subbuteo* Lodolaio**

2 le 10/04, 1 le 18/04 au marais de Macinaggio, 1 le 26/04 à Macinaggio, au crépuscule, qui attrape une petite chauve-souris (pipistrelle ?), 1 le 2/05 (chassant les hirondelles, 20h, lagune), 1 le 12/05 (en chasse, lagune, 20h10), 1 le 13/05 (15h20, saulaie/bord de mer).

**Faucon pèlerin *Falco peregrinus* Falco pelegrino**

1 le 14/04, 1 le 19/04 (12h), 1 le 20/04, 1 le 22/04 (14h30), 1 femelle le 5/05 (lagune 18h05), 1 femelle le 14/05 (lagune, 12h).

**Faucon sp. *Falco sp.***

1 oiseau le 23/04 qui pourrait être considéré comme un crécerellette (clair dessous, peu de tâches, rectrices medianes dépassant) ; 1 hobereau ou kobez vu le 26/04 entre Granaggio et Barcaggio.

**Gallinacées****Perdrix rouge *Alectoris rufa* Pernice rossa**

1 le 26/04 à Macinaggio, 1 le 27/04 à Barcaggio.

**Caille des blés *Coturnix coturnix* Quaglia**

2 chants le 18/04 (maquis oliviers, 6h), 1 le 25/04 (maquis oliviers, 7h), chant le 26/04 (maquis oliviers), chant le 4/05 (maquis oliviers, 8h30), chant le 10/05 (maquis, 5h30).

**Rallidés****Râle d'eau** *Rallus aquaticus* Porciglione

1 cri le 5/05 (lagune, 6h). 1 capture le 28/04 ; cet oiseau a été contrôlé le 8/05.

**Marouette sp.**

1 le 2/05 au marais de Macinaggio.

**Marouette ponctuée** *Porzana porzana* Voltolino

2 le 6/04 à Macinaggio, 1 le 15/04 (saulaie), 2 le 18/04 (marais Macinaggio), 1 le 28/04 (12h20, lagune) et 2 au marais de Macinaggio, 1 le 4/05 (lagune, 10h55, heurte le filet), 1 le 9/05 (lagune, 10h30 ; effrayée, disparaît sous l'eau en courant entre joncs et scirpes !). 1 capture le 5/05.

**Marouette poussin** *Porzana parva* Schiribilla

Toutes les observations sont relevées au marais de Macinaggio : 1 femelle le 28/04, 2 femelles le 29/04, 2 femelles et 1 mâle le 2/05.

**Marouette de Baillon** *Porzana pusilla* Schiribilla grisgiata

Un adulte a été vu le 2/05 au marais de Macinaggio (Obs. B. RECORBET). Il s'agit de la première observation de cette espèce au marais de Macinaggio et la seconde pour le Cap Corse (un oiseau capturé à Barcaggio le 2/05/93).

**Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* Gallinella d'acqua

1 à 3 oiseaux sont observés régulièrement à la lagune ou sur la rivière (20 mentions) : aucune du 6 au 9/04, 4 du 10 au 14/04, 6 ou 7 le 18/04 (lagune, après-midi), 6 le 25/04 à Macinaggio, 5 le 3/05 (grande lagune). 20 captures.

**Foulque macroule** *Fulica atra* Folaca

Observations à la lagune : 5 ou 6 les 5 et 6/04, notée le 16/04, 1 le 18/04 (18h), 2 le 24/04, poursuite territoriale le 2/05 (7h), 1 le 4/05 (12h-13h30), 1 adulte avec deux poussins (au moins) en duvet (1 semaine) le 10/05, 3 poussins le 15/05 (matin) et deux adultes nourrissant deux poussins (17h).

**Limicoles****Huîtrier-Pie** *Haemantopus ostralegus* Beccaccia di mare

1 le 6/05 sur la plage.

**Echasse blanche** *Himantopus himantopus* Cavaliere d'Italia

4 le 28/04 et 1 le 29/04 à Macinaggio ; toutes les autres observations sont effectuées à la lagune : 3 (2 mâles, 1 femelle) le 18/04 (8h), 1 le 19/04, 1 le 20/04, 2 le 22/04 (+ 1 morte, prédation), 2 le 5/05 (12h30 et 16h), 2 le 6/05 (10h45, couple), 1 femelle le 7/05 (16h20 et 18h), 1 le 9/05, 2 (mâle et femelle) le 14/05 (17h30-18h).

**Petit Gravelot** *Charadrius dubius* Corriere piccolo

1 le 7/04, 9 le 8/04, 4 le 9/04, 1 le 13/04, 1 le 18/04 au marais de Macinaggio, 2 le 19/04 (lagune), 1 le 26/04 à Macinaggio, 2 le 27/04, 1 le 12/05 (plage, 7h).

**Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* Corriere grosso

1 le 1/05 à Macinaggio, 4 le 11/05 (lagune, après-midi), 4 le 14/05 (plage, 15h) puis 2 autres (lagune, 17h30-18h) et 6 à 18h30 sur la plage, 4-5 le 15/05 (plage, 17h).

**Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrius* Fratino

1 le 6/04.

**Gravelot sp.** *Charadrius sp.*

1 le 14/05, embouchure ruisseau, 12h15.

**Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola* Pivieressa

1 les 9, 10 et 13/04, 1 le 19/04 (lagune), 1 le 23/04 (10h, embouchure).

**Bécasseau minute *Calidris minuta* Gambecchio**

2 le 7/05 (lagune, 19H30, dont un capturé), 3 le 9/05 (lagune 20h50), 5 le 12/05 (lagune 12h30), 3 le 13/05 (lagune, 8h), 14/05 : 8 (lagune, 12h), 3 oiseaux bagués (mare 12h15), 1 (plage, 15h), 7 (lagune 17h30-18h), 5 dont 3 bagués (mare, 18h), 15/05 : 3 (lagune 7h30), 3 dont 2 bagués (mare, 16h30), 5-6 dont 2 bagués (lagune 17h) et 2 au marais de Macinaggio. 13 captures, toutes en mai, dont 12 du 12 au 15/05.

**Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* Gambecchio nano**

1 le 3/05 à Macinaggio, 1 le 6/05 à Macinaggio (6h30-9h), 1 le 12/05 (oiseau bagué, lagune, 17h), 1 le 13/05 (bagué, mare, 12h15), 1 le 14/05 (bagué, mare, 18h). 1 capture le 10/05.

**Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Piovanello**

6 le 12/05 avec d'autres limicoles (lagune, 17h), 3 le 14/05 (lagune 6h) et 6 (lagune 17h30-18h), 1 le 15/05 (lagune, 13h et 17h). 2 captures, les 13 et 14/05.

**Bécasseau variable *Calidris alpina* Piovanello pancianera**

1 le 7/05 à la lagune, 19h30.

**Combattant varié *Philomachus pugnax* Combattente**

Mention régulière de 1 à 3 oiseaux (35 mentions à Barcaggio et Macinaggio) : 6 le 13/04, 9 ou 10 le 18/04 (lagune, toute la journée), 5 le 20/04 à Macinaggio, 14 le 18/04 à Macinaggio, 10 le 20/04 à Macinaggio, 5 le 20/04 (lagune, 8h), 2 dont 1 bagué le 21/04 (parking), 8 le 26/04 (10h, mer bord saulaie), 2 bagués le 30/04 (1 à droite, 1 à gauche, champ vaches, 18h), 4 le 5/05 (lagune 12h30), 8 le 7/05 (lagune, 16h20, 7 à 19h30), 20 le 8/05 à Macinaggio, 11 le 8/05 à Barcaggio, 6 le 10/05 (lagune, 14h), arrivage le 11/05 (après-midi), 5 le 15/05 à Macinaggio. 4 captures.

**Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* Frullino**

1 le 16/04 (marais), 1 le 17/04 (lagune), 1 le 20/04.

**Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Beccaccino**

1 les 8, 13 et 14/04, 1 le 18/04 (lagune 9h-12h) et 5 le même jour au marais de Macinaggio, 1 le 20/04, 1 le 23/04 (7h30, maison), 1 le 15/05 à Macinaggio. 3 captures.

**Bécassine double *Gallinago media* Croccolone**

1 le 6/05 à Macinaggio : "l'oiseau s'envole en poussant un cri diffus, vole en ligne droite puis se pose à environ 50 mètres du départ" (6h30-9h, obs R. JORDAN).

**Bécassine sp.**

1 le 19/04 à la lagune, 19h.

**Courlis corlieu *Numenius phaeopus* Chiurlo piccolo**

1 du 8 au 11/04, 1 les 18 et 20/04 à Macinaggio, 1 le 19/04 (lagune), 1 le 20/04 à Macinaggio, 1 le 23/04 (17h, plage), 1 le 24/04 (fin de matinée), 2 le 25/04 (plage), 1 le 26/04 à Macinaggio, 1 le 15/05 à Macinaggio.

**Chevalier arlequin *Tringa erythropus* Totano moro**

1 le 17/04 à la lagune et 2 le 18/04 au marais de Macinaggio.

**Chevalier gambette *Tringa totanus* Pettegola**

1 le 23/04 (10h embouchure et 19h30 lagune), 1 le 24/04 (lagune), 1 le 26/04 (10h, bord de mer saulaie avec des combattants), 1 le 27/04 à Macinaggio, 2 le 29/04 (9h30, embouchure), 1 le 29/04 (marais Macinaggio), 1 le 2/05 (13h30, plage). 1 capture le 26/04.

**Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Albastrello**

1 le 18/04, lagune, 9h-12h et 1 le 18/04 à Macinaggio (B. RECORBET).

**Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Pantana**

1 les 8, 10 et 12/04, 6 le 13/04, 1 le 18/04 à Macinaggio, 1 le 20/04 (embouchure), 3 le 20/04 à Macinaggio, 1 le 23/04 (10h, embouchure), 1 les 28, 29/04 et 1/05 à Macinaggio. 1 capture le 20/04.

**Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* Piro piro culbianco

2 le 6/04 à Macinaggio, 3 le 9/04, 1 le 14/04, 1 le 19/04 (vallée Acqua Tignese), 1 le 8/05 (lagune, 19h).

**Chevalier sylvain** *Tringa glareola* Piro piro boschereccio

Très régulier, de 1 à 3 oiseaux signalés presque chaque jour (35 mentions) : 5 le 6/04, 5 les 9 et 10/04, 4 le 16/04, 8 ou 9 le 18/04 (lagune, 14h30-17h), 20 le 18/04 à Macinaggio, 5 le 19/04, 15 le 20/04 à Macinaggio, 4 le 20/04 à Barcaggio, 10 à Macinaggio les 25 et 27/04, 20 le 28/04 à Macinaggio et 15 le 29/04, 5 le 1/05 (lagune, 7h), 37 le 2/5 à Macinaggio, 7 le 3/05 (lagune, 18h30) et 15 le même jour à Macinaggio, environ 10 le 4/05 (lagune, 12h-13h30), 7 le 5/05 (lagune, 6h) et plusieurs peu farouches vus dans a journée, dont un bagué, 40 le 8/05 à Macinaggio et 20 le même jour à Barcaggio, 4 le 11/05 (lagune, 7h), 5 le 15/05 à Macinaggio. 30 captures, dont 27 en mai.

**Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* Piro piro piccolo

3 le 8/04, 1 le 23/04 (10h, embouchure), 2 le 29/04 (11h, plage), 1 le 30/04 (18h, champ vaches), 2 le 1/05 (lagune, 9h), 1 le 2/05 (lagune), 7 le 2/05 (marais Macinaggio), au moins 2 le 3/05 (lagune), 2-3 le 4/05 (lagune 12h-13h30), 1 le 5/05 (lagune, 8h), plusieurs le matin du 7/05 (plage, lagune, ruisseau), 10 le 8/05, 2 le 11/05 (lagune, 7h) puis arrivage l'après-midi, 1 prédaté dans un filet par un crécerelle (filet maquis), > 5 le 14/05 (lagune 17h30-18h) et 2 sur la plage (en plus ?). 38 captures, dont 24 en mai.

**Chevalier sp. sp.**

20/04 : environ 60 oiseaux en vol bas sur la mer et au dessus de la plage de sable (20h), plusieurs espèces (env. 15 oiseaux) avec 6 cocorlis le 12/05 (lagune, 17h).

**Tournepietre à collier** *Arenaria interpres* Voltapietre

1 le 14/05 (lagune, 17h30-18h) et 1 (le même) le 15/05 lagune 7h30 et près de la nasse à 17h).

**Mouettes et goélands****Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* Gabbiano corallino

1 adulte nuptial parmi les Audouins le 26/04 aux Finocchiarola.

**Mouette sp.**

2 mouettes de petite taille sont vues en pleine mer entre le continent et la Corse le 5/04 (Mouette pygmée ?).

**Goéland d'Audouin** *Larus audouinii* Gabbiano corso

3 le 29/04 (lagune, 9h45), 2 le 3/05 (lagune), 1 se baigne dans la lagune le 4/05 (12h-13h30), 1 le 6/05 en mer à Macinaggio, 1 le 6/05 à Barcaggio.

**Goéland leucophée** *Larus cachinnans* Gabbiano reale

Observations régulières de 5 à 50 oiseaux. 1 ne bouge pas de sa pierre durant 2 heures le 15/05.

**Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* Mignattino ali bianche

1 le 6/05 au marais de Macinaggio (6h30-9h).

**Pigeons, tourterelles et coucou****Pigeon biset** *Columba livia* Piccione selvatico

Nicheur à la Giraglia. 1 biset peu farouche (pigeon voyageur ?), avec une bague plastique blanche et numéros noirs le 12/05 (parking, 12h15).

**Pigeon ramier** *Columba pallumbus* Colombaccio

5 le 17/04 en vol haut vers le nord (17h10), 13 le 25/04 en vol haut, direction Capraia (8h20), vol de 30 le 4/05 assez haut, direction ouest 9h (dont un oiseau tout blanc : colombe ?).

**Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* Tortora dal collare orientale  
1 le 4/05 posée près de la rivière (13h40).

**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* Tortora  
Observation assez régulière de 1 à 2 oiseaux (13 mentions) : 15 le 22/04 (ruine marais, 15h), 4 les 23 et 24/04, 14 le 25/04 (maquis oliviers, 11h), 11 le 26/04 à Macinaggio, 20 le 27/04, 5 le 4/05 (16h15, saulaie), 7 le 8/05. 11 captures.

**Coucou gris** *Cuculus canorus* Cuculo  
1 le 8/04, 1 le 19/04 (rebondi dans un filet), chant le 24/04, 2 le 25/04, 2 le 28/04 dont un mâle (11h30, maquis champ vaches), chant le 4/05 (15h45), 1 le 5/05 (maquis, 16h30), 1 le 8/05 à Macinaggio, 1 le 11/05 (saulaie, 10h). 2 captures, les 25 et 28/04.

## Rapaces nocturnes

**Effraie des clochers** *Tyto alba* Barbagianni  
Des cris sont entendus les 13/04 et 1/05, 1 oiseau se prend dans un filet (maquis oliviers), mais s'échappe malgré les efforts de Cécile (imitation du campagnol, ...). Un mâle bagué le 6/05/96 est retrouvé mort (desséché) dans le Palazzu le 13/04 par Thomas BUZZI. Il semble que l'espèce n'ait pas niché en 1997 dans le Palazzu.

**Petit-duc scops** *Otus scops* Assiolo  
Des chanteurs sont entendus très souvent le soir. 6 captures, toutes en avril. Un oiseau bagué le 18/04 est contrôlé le 4/05 (nicheur local ?).

**Hibou moyen-duc** *Asio otus* Gufo  
1 capture le 25/04, seconde mention de l'espèce à Barcaggio (précédente mention : 1 capture le 2/05/94).

**Hibou des marais** *Asio flammeus* Gufo di palude  
1 capture le 18/04. Seconde mention pour Barcaggio (précédente observation : un oiseau vu dans les dunes au cours de l'après-midi du 21/04/79). Toutefois, une plume de cet oiseau avait été trouvée par Julien PERFETTINI en 1995.

**Nocturne sp.**  
Un "hou hou" type hulotte est entendu le 14/05.

## Engoulevent, martinets, guêpier, huppe, torcol

**Engoulevent d'Europe** *Caprimulgus europaeus* Succiacapre  
Chant le 22/04, 1 chant le 23/04, minimum 1 le 24/04, chant le 25/04, 2 chassent au bord de mer le 2/05 (21h30), 1 le 8/05 (21h, chemin saulaie), 1 chasse au ras des buissons le 9/05 (saulaie, 21h30), 2 le 10/05 (soir, saulaie), vu + entendu + claquements d'ailes le 14/05 (21h). 8 captures : 1 le 19/04, les autres du 12 au 15/05.

**Martinet noir** *Apus apus* Rondone  
2 le 5/04 en pleine mer (traversée Continent/Corse) quelques le 15/04, env. 25 le 16/04 à 12h, 40 le 18/04 (embouchure, 12h), env. 20 le 1/05 (10h), passage le 3/05 (9h15), en. 10 le 5/05 (9h30, ruisseau), quelques le 10/05 (7h30), vol env. 50 le 14/05 (17h30-18h, plage). 20 captures dont 13 en mai.

**Martinet pâle** *Apus pallidus* Rondone pallido  
Une douzaine d'oiseaux le 9/05 (19h).

**Martinet à ventre blanc** *Apus melba* Rondone alpino  
3 le 9/04, 4 le 15/04, 4 le 16/04, 1 (lagune 9h-12h) et 3 (Acqua Tignese, 12h) le 18/04, 1 le 23/04 (9h15), 2 le 24/04 (11h30, rivière), 2 le 25/04, 1 le 26/04 (rivière, 13h45), 1 le 30/04 (10h30, Acqua Tignese), 1 le 1/05 (10h), au moins 2 le 3/05 (avec des noirs, 9h15), noté le 6/05, 3 le 10/05 (7h30) et 1 à 12h (rivière), 1 le 11/05 (rivière, 10h15), 1 le 13/05 (10h, rivière). 1 capture le 24/04.

**Guêpier d'Europe *Merops apiaster* Gruccione**

Entendus régulièrement durant tout le séjour de 5h30 à 19h30 (25 mentions) : 18 le 22/04 (15h40, direction ouest), 24 le 23/04 (14h35), 17 le 24/04 (village, 12h), env. 20 le 25/04 (rivière, 12h50), 52 le 26/04 (19h30, cherchent un dortoir près du village), env. 50 le 27/04 (6h20, les mêmes que la veille), au moins 70 le 29/04 (une partie va vers le maquis et l'autre vers l'ouest, 11h), 40 à 13h30, 35 à 19h30, 20 le 1/05, env. 50 le 4/05 (Palazzu/lignes électriques, 15h), env. 20 le 6/05 (passage ouest vers est, 9h25), passages les 8, 9 et 10/05.

**Rollier d'Europe *Coracias garrulus* Ghiandaia marina**

1 le 4/05, avec des guêpiers (maquis oliviers, 17h05).

**Huppe fasciée *Upupa epops* Upupa**

1 le 6/04 à Macinaggio, 1 le 16/04 (11h, échappée d'un filet) puis 2 à 17h (saulaie), 1 (lagune) + 1 (saulaie) le 17/04 (9h), 2 le 22/04 (8h-8h30), chant le 24/04, chant + 5 vues le 25/04, 1 le 26/04, 1 le 29/04 (chemin plage, 15h), 1 entendue le 1/05, notée dans les dunes le 7/05, 1 le 12/05 (lagune, 11h30), 1 le 15/05 (oliviers Palazzu). 16 captures, dont 14 en avril.

**Pic épeiche *Dendrocopos major* Picchio rosso maggiore**

Un tambourinage est entendu le 19/04.

**Torcol fourmilier *Jynx torquilla* Torcicollo**

Chant le 27/04. 2 captures, les 18 et 27/04.

**PASSEREAUX****Alouettes****Alouette calandre *Melanocorypha calandra calandra***

1 à Macinaggio le 28/04 (bien vue, obs. C. BONNET et P. CROUZIER), 1 le 6/05 à Macinaggio (6h30-9h, obs. R. JORDAN).

**Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* Calandrella**

2 le 21/04 (parking), 2 le 27/04, 1 le 28/04 à Macinaggio, 1 le 15/05 (12h45, près du parking).

**Alouette lulu *Lulula arborea* Tottavilla**

1 le 16/04. Nicheur local.

**Alouette des champs *Alauda arvensis* Allodola**

3 les 25 et 28/04 à Macinaggio, 3 le 3/05.

**Hirondelles**

- 15/04 : en vol toute la journée (maquis, saulaie, rivière), en majorité des rustiques avec quelques fenêtres et 1 à 2 rivages vues ; tombée dans la saulaie vers 18h.
- 30/04 : passage de fenêtres à 11h dans la saulaie.
- 3/05 : vol abondant de fenêtres (Tour Agnello, 18h30).
- 4/05 : passage important le soir (recherche d'un dortoir à la lagune), surtout des rivages capturées.
- 5/05 : nombreuses fenêtres à 9h30 sur la rivière, passages toute la journée jusqu'à 19h30, puis plus rien après.

**Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Topino**

180 captures, dont 115 en mai et 55 le 4/05. Un oiseau avec une bague croate est capturé le 4/05.

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Rondine**

1262 captures, dont 882 en avril et 407 du 23 au 26/04, 261 du 29/04 au 1/05. Un oiseau avec une bague hollandaise est capturé le 28/04 et un autre avec une bague italienne le 4/05.

**Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* Rondine rossiccia**

1 le 14/04, 1 le 15/04, 1 le 16/04 (saulaie, 17h) et 2 (lagune, 19h), 1 le 23/04 (12h45, maquis), 2 le 2/05 à Macinaggio, 2 le 5/05 (camp, 18h40).

**Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* Balestruccio**

108 captures, dont 66 en mai et respectivement 19 et 24 les 13 et 15/05.

**Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* Rondine montana**

1 le 27/04.

**Pipits, bergeronnettes et troglodyte****Pipit rousseline *Anthus campestris* Calandro**

1 le 25/04 à Macinaggio, 2 le 25/04 à Barcaggio, 2 le 26/04 à Macinaggio, 4 le 27/04, notés le 1/05 (12h45, plage), 1 le 3/05 (lagune), 1 couple le 6/05 en bord de mer entre Barcaggio et Agnello, 1 le 8/05.

**Pipit des arbres *Anthus trivialis* Prispolone**

1 le 20/04 à Macinaggio, 1 le 5/05 (chemin saulaie). 33 captures dont 30 en avril.

**Pipit farlouse *Anthus pratensis* Pispola**

1 le 3/05. 3 captures : 2 le 22/04, 1 le 24/04.

**Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* Pispola golarossa**

1 le 16/04 (lagune, observation non confirmée), 8 le 18/04 à Macinaggio, 1 le 25/04, 3 le 26/04 à Macinaggio et 1 à Tamarone, 1 le 27/04, 5 le 27/04 à Macinaggio, 6 le 28/04 à Macinaggio et 1 le même jour à Barcaggio (Oiseau Magazine n°48), 3 les 28 et 29/04 à Macinaggio, 4 le 1/05 à Macinaggio, 5 le 2/05 à Macinaggio, 1 le 3/05 à Barcaggio et 1 à Macinaggio, 1 le 5/05 (8h10, mare), 1 le 6/05 à Macinaggio (6h30-9h), 1 le 13/05 (lagune, 15h10, capture ratée), 1 le 14/05 (lagune, 18h). 1 capture le 14/05.

**Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* spioncello**

1 le 25/04 à Macinaggio, 1 le 25/04 à Barcaggio, 3 le 26/04 à Macinaggio, 2 le 27/04. 1 capture le 24/04.

**Bergeronnette printanière *Motacilla flava* Cutrettola**

5 le 6/04 à Macinaggio, plusieurs le 18/04 (champ plage) et 10 à Macinaggio, 50 le 20/04 à Barcaggio, 20 le 20/04 à Barcaggio, 5 le 24/04 à Macinaggio, 6 le 29/04 à Macinaggio, 10 dont 1 *thunbergi* le 27/04 à Macinaggio, 4 les 2 et 3/05 à Macinaggio, 2 le 14/05 (mare, plage, 16h30), 15 le 15/05 à Macinaggio. 15 captures.

**Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* Ballerina gialla**

7 le 25/04 (saulaie, 14h), 1 le 28/04 à Macinaggio (sur la plage).

**Bergeronnette grise *Motacilla alba* Ballerina bianca**

1 le 22/04 (parking) et 1 à la lagune (la même ?), 1 le 15/05 (12h15, saulaie) et 1 de type *subpersonata* (mare 16h30). 1 mâle est capturé le 15/05, cet oiseau correspondait à la description du type *M. a. subpersonata* d'Afrique du Nord (mesures : aile : 88, tarse : 24,75, bec : 16,65, abrasion 1/0/2/2, adiposité : 2, masse : 21, émargination : 5, WP : 2-4).

**Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* Scricciolo**

2 captures. Un oiseau bague le 28/04/95 est contrôlé les 15/05/96 et 2/05/97.

**Turdidés**

**Accenteur mouchet** *Prunella modularis* Passera scopaiola  
1 le 8/04, 2 le 9/04. 3 captures (16, 18 et 25/04).

**Rougegorge familier** *Erithacus rubecula* Pettiroso  
178 captures, dont 175 en avril et 66 en deux jours les 22 et 23/04. Un oiseau bagué le 16/04 (bec et doigts de la patte droite atrophiés) est contrôlé 12 fois jusqu'au 6/05 (21 jours sur place) où sa masse a varié de 16 g le 16/04 à 18 g le 6/05 avec un passage à 15 g le 24/04 où nous lui avons coupé un bout de la mandibule inférieure qui s'était cassée. On l'a surnommé "pas d'chance" !

**Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* Usignolo  
1 chant le 9/04, 1 le 16/04 (11h, saulaie), chant le 27/04, chant le 30/04 (6h15), chant le 4/05 (saulaie, 5h30). 62 captures, dont 58 en avril.

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* Codirosso  
1 mâle le 17/04 (saulaie 16h30), notés le 23/04, 3 le 26/04, 8 le 26/04 à Macinaggio, 10 le 27/04, 1 femelle le 3/05, 1 le 8/05. 86 captures, dont 75 en avril et 15 le 22/04.

**Tarier des prés** *Saxicola rubetra* Stiaccino  
3 le 14/04, notés le 16/04, un couple le 19/04 (lagune, 19h), noté le 23/04, nombreux le 24/04 (champ oliviers, 12h), 20 le 25/04, 6 le 26/04 à Macinaggio, 10 le 27/04, notés dont un mâle le 30/04 (18h, champ vaches), 10 le 3/05, 10 le 8/05 à Macinaggio. 59 captures dont 50 en avril et 24 en trois jours du 22 au 24/04.

**Tarier pâtre** *Saxicola torquata* Saltipalo  
3 couples le 6/04 à Macinaggio, nombreux le 24/04 (champ oliviers, 12h), 1 mâle le 25/04 (maquis oliviers, 12h), 6 à Macinaggio le 26/04, 4 le 27/04. 2 captures (les 1 et 2/05).

**Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* Culbianco  
2 femelles le 6/04 à Macinaggio, 1 le 17/04, 1 femelle le 19/04 (19h), 1 le 20/04, 4-5 le 21/04 et notés "+++" sur la plage, 2-3 le 22/04 (8h-8h30), nombreux le 24/04 (lagune, 17h30), 3 le 25/04 à Macinaggio, 2 le 25/04 à Barcaggio, 4 le 26/04 à Macinaggio, 4 le 27/04, 3 le 3/05. 7 captures.

**Traquet oreillard** *Oenanthe hispanica* Monachella  
1 mâle le 16/04 (+ peut-être une femelle, mais trop bref), 1 femelle le 21/04 (jardin maison village), 1 femelle le 22/04 (8h-8h30).

**Merle à plastron** *Turdus torquatus* Merlo dal collare  
1 femelle le 1/04 dans la vallée.

**Merle noir** *Turdus merula* Merlo  
15 captures, dont 2 en avril.  
Controles :  
- 1 mâle bagué le 2/05/94, contrôlé le 1/05/97  
- 1 mâle bagué le 9/05/95 (1 an), contrôlé le 16/04/97  
- 1 mâle bagué le 15/05/95 (1 an), contrôlé le 29/04/97  
- 1 mâle bagué le 17/04/95, contrôlé le 17/04/97  
- 1 mâle bagué le 19/04/96 (1 an), contrôlé le 16/04/97  
- 1 femelle baguée le 15/05/96 contrôlée le 10/05/97

**Grive musicienne** *Turdus philomelos* Tordo bottaccio  
3 le 6/04 à Macinaggio, 2 se poursuivent le 24/04, 3 migratrices le 28/04 à Macinaggio. 11 captures, dont 10 en avril.

**Grive mauvis** *Turdus iliacus* Tordo sassello  
1 capture le 16/04.

**Fauvettes (et apparentés), pouillots, roitelets**

**Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* Beccamoschino  
Notée le 6/04 à Macinaggio.

**Locustelle tachetée** *Locustella naevia* Forapaglie macchiettato  
1 chant le 23/04 (7h30, maison), chant le 24/04 (8h, maquis oliviers), chant le 25/04, chant le 26/04 à Macinaggio, chant le 28/04, chant le 29/04 (6h45), chant le 1/05 (camp, 12h50), chant le 2/05 (saulaie, 6h), chant le 4/05 (6h30), chant le 5/05 (7h, camp), chant le 4/05 (6h, saulaie). 1 capture le 22/04.

**Phragmite des joncs** *Acrocephalus shoenoaenus* Forapaglie  
Chant le 26/04 et 3 vus à Macinaggio. 37 captures dont 28 en mai et 17 le 15/05.

**Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* Cannaiola  
Chant le 26/04 à Macinaggio. 8 captures, dont 6 en avril (1ère capture le 22/04).

**Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* Cannareccione  
Chants le 24/04 (plusieurs fois dans la journée), chant le 26/04 chant le 27/04, chanteurs isolés à Macinaggio le 28/04, chant le 28/04, chant le 2/05 (6h et 18h45, saulaie), chant le 3/05 (saulaie, 8h), chant le 4/05 (7h20, saulaie), chant le 5/05 (8h et 13h20, saulaie), chant le 15/05 (18h30, lagune). 24 captures, dont 15 en mai et 8 le 15/05 (1ère capture le 22/04). Un oiseau bagué le 19/04 est contrôlé le 23/04 (6 jours sur place).

**Hypolaïs icterine** *Hippolais icterina* Canapino maggiore  
19 captures du 11 au 14/05.

**Fauvette sarde** *Sylvia sarda* Magnanina sarda  
1 le 20/04 à Barcaggio, 2 oiseaux se baignent le 4/05 à la lagune (12h-13h30), notée le 7/05 (dunes).

**Fauvette pitchou** *Sylvia undata* Magnanina  
1 mâle et 1 femelle le 19/04 (lagune), 1 le 28/04 (lagune, 11h30), notée dans les dunes le 7/05. 1 capture le 16/04.

**Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* Sterpazzolina  
51 captures (27 en avril, 24 en mai).

**Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala* Occhiocotto  
Le 3/05 : 1 poussin (bon état et plumes en fourreaux) avec parents qui alarment (18h30, chemin douaniers après les dunes), notée le 7/05 dans les dunes. 37 captures, dont 26 en avril.

Contrôles :

- 1 mâle bagué le 5/05/93 est contrôlé les 24/04/94, 5, 7 et 8/05/95, 7 et 8/05/96, 4 et 8/05/97 (un fidèle au camp avec au moins 6 ans de présence !)
- 1 mâle bagué le 30/04/93 est contrôlé le 15/05/97 (au moins 6 ans lui aussi !)
- 1 mâle bagué le 22/04/95 est contrôlé le 26/04/97
- 1 mâle bagué le 24/04/96 est contrôlé le 16/04/97

**Fauvette grisette** *Sylvia communis* Sterpazzola  
134 captures (70 en avril, 64 en mai) dont 20 le 13/05.

**Fauvette des jardins** *Sylvia borin* Beccafico  
125 captures, dont 109 en mai et 73 du 12 au 14/05.

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* Capinera  
137 captures, dont 124 en avril. Un oiseau bagué le 20/04 est contrôlé le 30/04 (11 jours sur place).

**Pouillot de Bonelli** *Phylloscopus bonelli* Lui bianco  
Un chanteur est entendu à Macinaggio le 26, 27 ou 28/04 (obs. C. Bonnet et P. Crouzier).

**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* Lui verde

56 captures (24 en avril et 32 en mai). Un oiseau bagué le 16/04 est contrôlé le 27/04 (12 jours sur place !).

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* Lui piccolo

29 captures, dont 21 en avril (dernière capture le 13/05). Un oiseau bagué le 16/04 est contrôlé le 22/04 (7 jours sur place).

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* Lui grosso

439 captures, dont 344 en avril et 44 le 20/04, 35 le 23/04 et 34 le 29/04. Un oiseau bagué le 18/04 est contrôlé le 23/04 (6 jours sur place).

**Roitelet triple bandeau** *Regulus ignicapillus* Fiorrancino

Chants le 28/04 à Macinaggio, 1 chant le 7/04, 1 chant le 26/04 (oliviers).

**Gobemouches****Gobemouche gris** *Muscicapa striata* Pigliamosche

1 le 19/04 (vallée Acqua Tignese), beaucoup le 9/05 (clôtures champ plage), 1 prédaté par un crécerelle (filet maquis, 12h). 38 captures, dont 33 en mai (1ère capture le 23/04).

**Gobemouche à collier** *Ficedula albicollis* Balia dal collare

1 mâle le 15/04 (saulaie), 1 femelle le 18/04 (chemin maquis). 1 femelle est capturée le 17/04.

**Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* Balia nera

1 mâle le 7/04, 1 femelle le 10/04, 6 le 13/04, 1 mâle le 17/04 (saulaie 17h20), 1 le 19/04 (vallée rivière), nombreux le 21/04, notés le 23/04, 6 le 26/04 à Macinaggio, 10 le 27/04. 106 captures (91 en avril, 15 en mai). Deux oiseaux bagués le 20/04 sont contrôlés les 29 et 30/04 (10 et 11 jours sur place).

**Mésanges et espèces voisines****Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* Codibugnolo

2 captures les 18 et 22/04. 1 oiseau bagué le 17/04/95 est contrôlé les 20/04/96 et 18/04/97.

**Mésange bleue** *Parus caeruleus* Cinciarella

9 captures. 1 femelle baguée le 16/04/95 est contrôlée le 2/05/97.

**Mésange charbonnière** *Parus major* Cinciallegra

11 captures. 1 mâle (1 an) bagué le 27/04/95 est contrôlé le 19/04/97.

**Rémiz penduline** *Rémiz pendulinus* Pendolino

7 le 7/04.

**Loriot et Pies grièches****Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* Rigogolo

1 chant le 23/04 (6h15), chant le 24/04 (saulaie), chant le 26/04, chant le 30/04 (6h15), 1 mâle en vol le 1/05 (saulaie, 12h45), 3 le 8/05 (vol saulaie vers maquis, 10h), 2 femelles le 12/05 posées sur des branches mortes (lagune, 15h). 4 captures, les 24/04, 5, 11 et 14/05.

**Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio* Averla piccola

Un couple le 24/04 (lagune, 17h30), 1 mâle bagué à droite le 10/05 (13h45, saulaie/rivière), 2-5 couples le 12/05 (lagune, 17h). 6 captures en mai (1ère capture le 11/05). 2 mâles bagués le 13/05/95 sont contrôlés les 11 et 12/05/97.

**Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* Averla capirossa

1 *badius* le 22/04 (13h45), 1 mâle le 23/04 (maquis oliviers, 9h30), 2 le 25/04, 1 *badius* le 29/04 (maquis oliviers), 1 le 30/04 (chemin maison, 19h30). 9 captures (1ère capture le 23/04).

**Corvidés****Geai des chênes** *Garrulus glandarius* Ghiandaia

1 le 23/04 à 17h.

**Crave à bec rouge** *Pyrhocorax pyrrhocorax* Gracchio corallino

Observation exceptionnelle de deux oiseaux en migration (vol E/SE) au sémaphore le 16/03/97 (vent 25 noeuds sud-ouest). Observation J.C. CARIO (Sémaphore de Capo Grosso).

**Corneille mantelée** *Corvus corone cornix* Cornacchia grigia

2 le 19/04 (saulaie), 1 le 24/04, 2 le 26/04, 4 le 7/05. Une population d'environ 20 exemplaires est estimée à Macinaggio.

**Grand Corbeau** *Corvus corax* Corvo imperiale

21 le 11/04, dont 12 partent vers la Giraglia (pour prédation des oeufs de goélands ou migration ?), 3 le 17/04, 1 le 19/04 (saulaie), 2 le 23/04, 1 le 24/04, 2 le 25/04, noté le 27/04, 2 le 28/04 (camp), 1 le 29/04 avec une proie (saulaie, 6h40), un couple avec au moins trois poussins (falaise après la Tour d'Agnello), 1 le 4/05 (11h30 et 16h15), 1 le 14/05 (12h30), 1 le 15/05 à 10h20, 12h45 (lagune, avec une proie dans le bec) et 17h (chemin plage).

**Etourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris* Storno

7 le 6/04 à Macinaggio, une femelle est capturée le 3/05 à 7h45. Elle avait une plaque incubatrice et peut-être un oeuf en préparation. Une autre femelle est capturée le 5/05.

**Moineaux et fringilles****Moineau cisalpin** *Passer italiae* Passera d'Italia

1 femelle le 4/05 (chemin saulaie, 15h30), 2 mâles se baignent le 5/05 sur le chemin de la saulaie. Commun au village. 2 captures les 28/04 et 6/05.

**Pinson des arbres** *Fringilla coelebs* Fringuello

Chant le 4/05 (lagune, 12h-13h30), chant le 15/05. 26 captures.

**Serin cini** *Serinus serinus* Verzellino

1 capture le 13/05.

**Venturon corse** *Serinus corsicanus* Venturone corso

2 le 6/04 à Macinaggio, notés le 24/04, 5 le 25/04, notés le 26/04 avec la capture de deux oiseaux de l'année, notés le 7/05 dans les dunes. 4 captures, dont 3 juvéniles les 26/04 et 14/05.

**Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* Verdone

2 captures les 13 et 14/05.

**Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis* Cardellino

notés le 30/04 (18h, champ vaches), 5-6 le 4/05 qui se baignent à l'embouchure de l'Acqua Tignese (11h30), chant le 5/05. 36 captures, dont 25 en avril.

**Contrôles :**

- 1 femelle baguée le 26/04/93 est trouvée morte dans le village le 6/04/97 (au moins 6 ans de longévité)
- 1 femelle baguée le 27/04/95 est contrôlée le 26/04/97 (plaque incubatrice)
- 1 femelle baguée le 5/05/96 (plaque incubatrice) est contrôlée le 26/04/97 (plaque incubatrice)

**Tarin des aulnes *Carduelis spinus* Lucherino**

Troupe d'environ 35 le 20/04, troupe le 23/04, notés le 24/04, troupe de 15-20 le 25/04 (8h), notés le 26/04, troupe d'environ 15 le 27/04. 22 captures, dont 21 en avril.

**Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* Fanello**

4 les 25 et 27/04.

**Grosbec et Bruants****Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* Frosone**

2 le 6/04, 1 le 27/04 à Macinaggio.

**Bruant zizi *Emberiza cirius* Zigolo nero**

1 le 6/04 à Macinaggio, 1 mâle le 29/04 (9h30, embouchure), un couple le 30/04 (18h, champ vaches), 1 mâle (15h30, chemin saulaie) et 1 mâle et 1 femelle (17h30, chemin plage) le 4/05. 9 captures, toutes en avril.

Contrôles :

- 1 femelle baguée le 20/04/96 est contrôlée le 5/05/97
- 1 mâle bagué le 21/04/96 est contrôlé le 19/04/97

**Bruant ortolan *Emberiza hortulana* ortolano**

1 chant le 22/04 (12h, maquis), 1 le 27/04, 1 mâle le 6/05 au marais de Macinaggio (6h30-9h).

**Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* Zigolo testanera**

Un mâle est observé le 15/05 à 13h dans le champ à vaches de la plage (Gilles et Nanou). Il est revu par les autres participants au camp durant la journée, puis à 17h au même endroit où il émet quelques cris brefs (+ photographies). Une fiche d'observation a été envoyée au Comité National d'Homologation. Un oiseau avait déjà été observé au Sémaphore le 19 mai 1989 par Alain DESNOS (observation homologuée).

**Bruant proyer *Miliaria calandra* Strillozzo**

1 le 9/04, quelques le 21/04 à la lagune, 8 chanteurs le 28/04 à Macinaggio. 1 capture le 23/04.

**Bilan des poses de bagues par espèce et par jour****Détail des oiseaux capturés aux pièges**

(voir tableaux pages suivantes)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997

| ESPECE  | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Blongios nain<br><i>Ixobrycus minutus</i>           |         |         |         | 1       |         |         |         |         |         |          |          | 1        | 1        | 3        | 3        | 0<br>9     | 9            |
| Bihoreau gris<br><i>Nycticorax nycticorax</i>       |         |         |         |         |         | 1       | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Crabier chevelu<br><i>Ardeola ralloides</i>         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          | 1        |          | 0<br>1     | 1            |
| Busard des roseaux<br><i>Circus aeruginosus</i>     |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| Epervier d'Europe<br><i>Accipiter nisus</i>         |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Faucon crécerelle<br><i>Falco tinnunculus</i>       |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Râle d'eau<br><i>Rallus aquaticus</i>               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Marouette ponctuée<br><i>Porzana porzana</i>        |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| Gallinule poule-d'eau<br><i>Gallinula chloropus</i> | 2       | 1       | 1<br>1  | 1<br>1  |         | 1       | 3       |         | 1<br>1  | 2        | 2<br>1   |          |          | 1        | 1        | 8<br>12    | 20           |
| Bécasseau minute<br><i>Calidris minuta</i>          |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          | 1        | 3        | 5        | 3        | 0<br>13    | 13           |
| Bécasseau de Temminck<br><i>Calidris temminckii</i> |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 1        |          |          |          |          |          | 0<br>1     | 1            |
| Bécasseau cocorli<br><i>Calidris ferruginea</i>     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        | 1        |          | 0<br>2     | 2            |
| Combattant varié<br><i>Philomachus pugnax</i>       |         |         | 2       | 1<br>1  |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 3<br>1     | 4            |
| Bécassine des marais<br><i>Gallinago gallinago</i>  |         |         |         | 1       |         | 2       |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 3<br>0     | 3            |
| Chevalier gambette<br><i>Tringa totanus</i>         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 1        |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Chevalier aboyeur<br><i>Tringa nebularia</i>        |         |         |         |         | 1       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Chevalier sylvain<br><i>Tringa glareola</i>         | 1       | 1       |         | 1<br>4  | 8       | 2       | 1       | 2       |         | 3        | 1<br>3   | 2        | 1        |          |          | 3<br>27    | 30           |
| Chevalier guignette<br><i>Actitis hypoleucos</i>    |         |         | 1       | 2       | 1<br>2  | 4       | 3<br>1  | 1<br>2  |         | 4        | 1<br>1   | 1<br>2   | 4<br>2   | 1        | 3        | 14<br>24   | 38           |
| Tourterelle des bois<br><i>Streptopelia turtur</i>  | 1       | 2       |         | 1       | 1       |         | 1       |         | 3       | 1        | 1        |          |          |          |          | 5<br>6     | 11           |

Tyav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr. n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997

| ESPECE   | 16<br>1  | 17<br>2 | 18<br>3  | 19<br>4  | 20<br>5  | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8  | 24<br>9  | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |   |
|--|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|---|
| Coucou gris<br><i>Cuculus canorus</i>                |          |         |          |          |          |         |         |          |          | 1        |          |          | 1        |          |          | 2<br>0     | 2            |   |
| Hibou moyen duc<br><i>Asio otus</i>                  |          |         |          |          |          |         |         |          |          | 1        |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |   |
| Hibou des marais<br><i>Asio flammeus</i>             |          |         | 1        |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |   |
| Petit-duc scops<br><i>Otus scops</i>                 | 1        |         | 1        | 1        |          |         |         | 1        |          | 1        | 1        |          |          |          |          | 6<br>0     | 6            |   |
| Engoulevent d'Europe<br><i>Caprimulgus europaeus</i> |          |         |          | 1        |          |         |         |          |          |          |          |          | 2        | 1        | 2        | 2          | 1<br>7       | 8 |
| Martinet noir<br><i>Apus apus</i>                    |          | 1       | 2        | 3        | 2        | 3       |         |          | 2        | 1        |          | 1        | 1        | 1        | 2        | 7<br>13    | 20           |   |
| Martinet à ventre blanc<br><i>Apus melba</i>         |          |         |          |          |          |         |         |          | 1        |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |   |
| Huppe fasciée<br><i>Upupa epops</i>                  | 1        | 1<br>1  |          | 1        |          | 1       | 3       | 2        | 1        | 2        | 1        | 1        |          | 1        |          | 14<br>2    | 16           |   |
| Torcol fourmilier<br><i>Jynx torquilla</i>           |          |         | 1        |          |          |         |         |          |          |          |          | 1        |          |          |          | 2<br>0     | 2            |   |
| Hirondelle de rivage<br><i>Riparia riparia</i>       | 3<br>11  | 1       |          | 7<br>55  | 4<br>5   | 2       |         | 3<br>1   | 27       | 3<br>3   | 7        |          | 4<br>10  | 6<br>5   | 21       | 65<br>115  | 180          |   |
| Hirondelle rustique<br><i>Hirundo rustica</i>        | 28<br>71 | 22<br>5 | 14<br>14 | 70<br>96 | 19<br>78 | 7       | 24<br>3 | 101<br>6 | 137<br>1 | 60<br>39 | 109<br>1 | 17<br>21 | 91<br>11 | 135<br>9 | 55<br>18 | 882<br>380 | 1262         |   |
| Hirondelle de fenêtre<br><i>Delichon urbica</i>      |          |         |          | 3        | 2<br>10  |         |         | 3        | 19       | 8<br>3   | 3        | 1        | 3<br>19  | 2<br>7   | 1<br>24  | 42<br>66   | 108          |   |
| Pipit des arbres<br><i>Anthus trivialis</i>          | 3        | 1<br>1  | 2        | 8        | 2        | 1       | 6       | 4        | 2        | 1<br>1   |          | 1        |          |          |          | 30<br>3    | 33           |   |
| Pipit farlouse<br><i>Anthus pratensis</i>            |          |         |          |          |          |         | 2       |          | 1        |          |          |          |          |          |          | 3<br>0     | 3            |   |
| Pipit à gorge rousse<br><i>Anthus cervinus</i>       |          |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          | 1        |          | 0<br>1     | 1            |   |
| Pipit spioncelle<br><i>Anthus spinoletta</i>         |          |         |          |          |          |         |         |          |          | 1        |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |   |
| Bergeronnette printanière<br><i>Motacilla flava</i>  | 2        |         |          | 3        |          |         | 5       |          | 2        |          |          |          |          | 1        | 1        | 9<br>6     | 15           |   |
| Bergeronnette grise<br><i>Motacilla alba</i>         |          |         |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 1        | 0<br>1     | 1            |   |
| Troglodyte mignon<br><i>Troglodytes troglodytes</i>  | 1        | 1       |          |          |          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 1<br>1     | 2            |   |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Accenteur mouchet<br><i>Prunella modularis</i>             | 1       |         | 1       |         |         |         |         |         |         | 1        |          |          |          |          |          | 3<br>0     | 3            |
| Rougegorge familier<br><i>Erithacus rubecula</i>           | 20<br>1 | 6       | 16      | 14      | 19<br>2 |         | 37      | 29      | 12      | 9        | 6        | 5        | 2        |          |          | 175<br>3   | 178          |
| Rossignol philomèle<br><i>Luscinia megarhynchos</i>        | 4       | 5       | 3       | 7<br>2  | 2<br>2  |         | 19      | 6       | 8       |          | 2        |          |          |          | 2        | 58<br>4    | 62           |
| Rougequeue à front blanc<br><i>Phoenicurus phoenicurus</i> | 9<br>2  | 2<br>2  | 1       | 6       | 5<br>6  |         | 15      | 8       | 3       | 5        | 1        | 4        | 8        | 4        | 5        | 75<br>11   | 86           |
| Tarier des prés<br><i>Saxicola rubetra</i>                 | 3       | 1<br>1  | 1<br>1  |         | 4       |         | 10<br>1 | 5       | 9<br>1  | 5<br>1   | 7        |          | 3        |          | 3        | 50<br>9    | 59           |
| Tarier pâtre<br><i>Saxicola torquata</i>                   | 1       | 1       |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>2     | 2            |
| Traquet motteux<br><i>Oenanthe oenanthe</i>                |         |         | 1       |         | 3       |         |         | 1       | 1       | 1        |          |          |          |          |          | 3<br>4     | 7            |
| Merle noir<br><i>Turdus merula</i>                         | 3<br>2  | 2       | 2       | 2<br>1  |         |         |         |         | 1       | 1        |          |          | 1        |          |          | 12<br>3    | 15           |
| Grive musicienne<br><i>Turdus philomelos</i>               |         | 2       | 2       | 1       | 1<br>1  |         | 1       | 2       |         |          |          |          |          | 1        |          | 10<br>1    | 11           |
| Grive mauvis<br><i>Turdus iliacus</i>                      | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Locustelle tachetée<br><i>Locustella naevia</i>            |         |         |         |         |         |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Phragmite des joncs<br><i>Acrocephalus schoenobaenus</i>   |         | 1       |         | 1       |         |         |         | 2       |         | 3        | 2<br>1   |          | 3        | 5        | 2<br>17  | 9<br>28    | 37           |
| Rousserolle effarvatte<br><i>Acrocephalus scirpaceus</i>   |         |         |         |         |         |         | 1       | 2       | 1       | 1        |          |          | 1        | 1        | 1        | 6<br>2     | 8            |
| Rousserolle turdoïde<br><i>Acrocephalus arundinaceus</i>   |         |         | 1       | 2       |         |         | 3       |         | 2       | 2        | 2        | 1<br>1   | 1        |          | 1        | 9<br>15    | 24           |
| Hypolaïs icterine<br><i>Hippolais icterina</i>             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | 1        | 6        | 5        | 7        |          | 0<br>19    | 19           |
| Fauvette pitchou<br><i>Sylvia undata</i>                   | 1       |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Fauvette passerinette<br><i>Sylvia cantillans</i>          |         | 2<br>2  | 1       | 4       | 3<br>5  | 2       | 1<br>1  | 1       | 5       | 4        | 3        | 2<br>3   | 5        | 5        | 1<br>1   | 27<br>24   | 51           |
| Fauvette mélanocéphale<br><i>Sylvia melanocephala</i>      | 5       | 3       | 1       | 5<br>1  | 1       |         | 2       |         | 2       | 2        | 1        | 1        | 1<br>5   | 3<br>1   | 2<br>1   | 26<br>11   | 37           |
| Fauvette grisette<br><i>Sylvia communis</i>                | 2<br>3  | 2<br>3  | 2<br>1  | 7<br>9  | 9<br>8  | 1       | 5       | 4<br>2  | 6       | 5        | 5<br>1   | 5<br>3   | 6<br>20  | 5<br>9   | 7<br>3   | 70<br>64   | 134          |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°38 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997

| ESPECE  | 16<br>1  | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4  | 20<br>5  | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|---|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Fauvette des jardins<br><i>Sylvia borin</i>           | 1        | 2       | 1       | 5        | 3        | 5       | 2<br>1  | 2       | 2       | 2<br>6   | 1<br>2   | 1<br>19  | 3<br>39  | 1<br>15  | 4<br>8   | 16<br>109  | 125          |
| Fauvette à tête noire<br><i>Sylvia atricapilla</i>    | 12<br>4  | 6<br>3  | 11      | 14<br>5  | 9        |         | 9       | 8       | 12      | 8<br>1   | 12       | 7        | 6        | 3        | 7        | 124<br>13  | 137          |
| Pouillot siffleur<br><i>Phylloscopus sibilatrix</i>   | 4        | 1       | 1<br>1  | 4        | 11<br>9  | 3       |         | 1       | 3       | 2        |          | 1<br>1   | 7        | 2        | 5        | 24<br>32   | 56           |
| Pouillot véloce<br><i>Phylloscopus collybita</i>      | 5<br>2   | 1<br>2  |         | 1        | 1        | 1       | 2       | 4       | 3       | 1<br>1   |          |          | 1        | 4        |          | 21<br>8    | 29           |
| Pouillot fitis<br><i>Phylloscopus trochilus</i>       | 13<br>25 | 4<br>8  | 24<br>7 | 21<br>29 | 44<br>21 | 1<br>1  | 29<br>1 | 35      | 26      | 27       | 21<br>1  | 15       | 22<br>1  | 34<br>1  | 28       | 344<br>95  | 439          |
| Gobemouche gris<br><i>Muscicapa striata</i>           |          |         | 2       | 4        | 4        |         |         | 1<br>1  |         | 1<br>1   | 1        | 2<br>7   | 11       | 1        | 1<br>1   | 5<br>33    | 38           |
| Gobemouche noir<br><i>Ficedula hypoleuca</i>          | 2<br>2   | 3<br>1  | 2       | 4        | 9<br>2   | 1       | 24      | 10<br>1 | 9       | 5        | 3        | 6<br>3   | 6<br>1   | 10       | 2        | 91<br>15   | 106          |
| Gobemouche à collier<br><i>Ficedula albicollis</i>    |          | 1       |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |
| Mésange à longue queue<br><i>Aegithalos caudatus</i>  |          |         | 1       |          |          |         | 1       |         |         |          |          |          |          |          |          | 2<br>0     | 2            |
| Mésange bleue<br><i>Parus caeruleus</i>               | 2        | 1       |         | 3        | 1        |         | 1       |         |         |          |          |          |          | 1        |          | 7<br>2     | 9            |
| Mésange charbonnière<br><i>Parus major</i>            | 3        |         |         | 2        | 2        |         | 3       |         |         |          |          | 1        |          |          |          | 9<br>2     | 11           |
| Loriot d'Europe<br><i>Oriolus oriolus</i>             |          |         |         |          | 1        |         |         |         | 1       |          | 1        |          |          | 1        |          | 1<br>3     | 4            |
| Pie-grièche écorcheur<br><i>Lanius collurio</i>       |          |         |         |          |          |         |         |         |         |          | 2        | 3        | 1        |          |          | 0<br>6     | 6            |
| Pie-grièche à tête rousse<br><i>Lanius senator</i>    |          |         |         |          | 1        |         |         | 1       | 2       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |          | 6<br>3     | 9            |
| Etourneau sansonnet<br><i>Sturnus vulgaris</i>        |          |         | 1       |          | 1        |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | 0<br>2     | 2            |
| Moineau cisalpin<br><i>Passer italiae</i>             |          |         |         |          |          | 1       |         |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 1<br>1     | 2            |
| Pinson des arbres<br><i>Fringilla coelebs</i>         | 3<br>2   | 1       | 2<br>3  | 2        | 1        |         |         | 3<br>1  |         | 2<br>2   |          | 1        |          | 1<br>2   |          | 12<br>14   | 26           |
| Serin cini<br><i>Serinus serinus</i>                  |          |         |         |          |          |         |         |         |         |          |          |          | 1        |          |          | 0<br>1     | 1            |
| Venturon corse<br><i>Serinus citrinella corsicana</i> |          |         |         |          |          |         |         |         |         |          | 2        | 1        |          | 1        |          | 3<br>1     | 4            |

Tran. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998)

BARCAGGIO : BILAN DES POSES DE BAGUES MOIS D'AVRIL ET MAI 1997

| ESPECE   | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total/esp. | Tot./esp. 96 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| Verdier d'Europe<br><i>Carduelis chloris</i>       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | 1        | 1        |          | 0<br>2     | 2            |
| Chardonneret élégant<br><i>Carduelis carduelis</i> | 4       | 1<br>1  | 2       | 2<br>4  | 1       |         | 1       | 1<br>1  | 2       | 4        | 4        | 1        | 2<br>1   | 2<br>2   |          | 25<br>11   | 36           |
| Tarin des aulnes<br><i>Carduelis spinus</i>        |         |         |         | 3<br>1  |         |         |         | 5       | 5       | 2        | 6        |          |          |          |          | 21<br>1    | 22           |
| Bruant zizi<br><i>Emberiza cirlus</i>              | 1       |         | 1       | 2       |         |         |         |         | 1       |          |          |          | 2        | 1        | 1        | 9<br>0     | 9            |
| Bruant proyer<br><i>Miliaria calandra</i>          |         |         |         |         |         |         |         | 1       |         |          |          |          |          |          |          | 1<br>0     | 1            |

|                       | 16<br>1 | 17<br>2 | 18<br>3 | 19<br>4 | 20<br>5 | 21<br>6 | 22<br>7 | 23<br>8 | 24<br>9 | 25<br>10 | 26<br>11 | 27<br>12 | 28<br>13 | 29<br>14 | 30<br>15 | Total du mois |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Total/jour avril 1997 | 135     | 66      | 95      | 184     | 148     | 3       | 213     | 246     | 311     | 173      | 203      | 74       | 170      | 222      | 126      | 2369          |
| Total/jour mai 1997   | 133     | 45      | 39      | 246     | 182     | 37      | 12      | 19      | 4       | 70       | 19       | 81       | 153      | 89       | 119      | 1248          |
| <b>Total 97 :</b>     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          | <b>3617</b>   |

Trav. sci. Parc. nat. rég. Corse & Rés. nat., Fr, n°58 (1998)

DETAIL DES OISEAUX CAPTURES AUX PIEGES (2 matoles, 1 nasse)

|                       |           | NASSE        | MATOLES        |               |              |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Combattant varié      | 18/04/97  | 2            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 18/04/97  | 1            |                |               |              |
| Grive musicienne      | 19/04/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier sylvain     | 19/04/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 19/04/97  | 1            |                |               |              |
| Combattant varié      | 19/04/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier guignette   | 20/04/97  | 1            |                |               |              |
| Bécassine des marais  | 21/04/97  | 2            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 24/04/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 25/04/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 25/04/97  |              | 1              |               |              |
| Poule d'eau           | 26/04/97  |              | 1              |               |              |
| Chevalier guignette   | 27/04/97  | 1            |                |               |              |
| Râle d'eau            | 28/04/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier guignette   | 28/04/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 30/04/97  |              | 1              |               |              |
| Poule d'eau           | 01/05/97  | 2            |                |               |              |
| Chevalier guignette   | 02/05/97  | 1            |                |               |              |
| Blongios nain         | 04/05/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier guignette   | 04/05/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier sylvain     | 05/05/97  | 3            |                |               |              |
| Busard des roseaux    | 05/05/97  |              | 1              |               |              |
| Bihoreau gris         | 06/05/97  |              | 1              |               |              |
| Chevalier guignette   | 06/05/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 06/05/97  |              | 1              |               |              |
| Poule d'eau           | 07/05/97  | 2            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 07/05/97  |              | 1              |               |              |
| Chevalier guignette   | 08/05/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 09/05/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier guignette   | 10/05/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier sylvain     | 10/05/97  | 2            |                |               |              |
| Bécasseau de Temminck | 10/05/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 11/05/97  |              | 1              |               |              |
| Chevalier sylvain     | 11/05/97  | 3            |                |               |              |
| Chevalier guignette   | 12/05/97  | 1            |                |               |              |
| Blongios nain         | 12/05/97  | 1            |                |               |              |
| Chevalier sylvain     | 12/05/97  | 1            |                |               |              |
| Blongios nain         | 13/05/97  | 1            |                |               |              |
| Poule d'eau           | 14/05/97  |              | 1              |               |              |
| Chevalier guignette   | 14/05/97  | 1            |                |               |              |
| Blongios nain         | 14/05/97  | 1            |                |               |              |
| Crabier chevelu       | 14/05/97  |              | 1              |               |              |
| Blongios nain         | 15/05/97  | 3            |                |               |              |
| Phragmite des joncs   | 15/05/97  | 1            |                |               |              |
| <b>TOTAL</b>          |           | <b>45</b>    | <b>10</b>      |               |              |
|                       |           | <b>NASSE</b> | <b>MATOLES</b> | <b>FILETS</b> | <b>TOTAL</b> |
| Chevalier guignette   | 10        |              |                | 28            | 38           |
| Chevalier sylvain     | 10        |              |                | 20            | 30           |
| Bécasseau de Temminck | 1         |              |                |               | 1            |
| Poule d'eau           | 9         | 7            |                | 4             | 20           |
| Blongios nain         | 7         |              |                | 2             | 9            |
| Combattant varié      | 3         |              |                | 1             | 4            |
| Bécassine des marais  | 2         |              |                |               | 2            |
| Râle d'eau            | 1         |              |                |               | 1            |
| Crabier chevelu       |           | 1            |                |               | 1            |
| Bihoreau gris         |           | 1            |                | 1             | 2            |
| Busard des roseaux    |           | 1            |                |               | 1            |
| Grive musicienne      | 1         |              |                | 9             | 10           |
| Phragmite des joncs   | 1         |              |                | 36            | 37           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>45</b> | <b>10</b>    |                | <b>101</b>    | <b>156</b>   |


Indications sur la variation du nombre d'oiseaux capturés par jour  
en fonction des conditions météorologiques et du métrage de filet en 1997

| DATE | TEMPS                         | VENT               | Temp.<br>mini-maxi<br>par jour | Nbre de<br>captures<br>par jour | long. de<br>filets<br>(ml) | Nbre de<br>captures par<br>ml de filet |
|------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 16   | couvert à dégagé              | W à N faible       | 9-23                           | 135                             | 183                        | 0,74                                   |
| 17   | beau                          | E fort à modéré    | 9-16,5                         | 66                              | 257                        | 0,26                                   |
| 18   | beau                          | E/SE modéré à nul  | 3-17,5                         | 95                              | 264                        | 0,36                                   |
| 19   | beau                          | E/SE modéré à nul  | 8-17                           | 184                             | 264                        | 0,70                                   |
| 20   | couvert, pluie intermittente  | W modéré à nul     | 11-14                          | 148                             | 264                        | 0,56                                   |
| 21   | pluie constante               | NE/E fort          | 10-13                          | 3                               | 0                          | -                                      |
| 22   | couvert à dégagé              | N modéré           | 7,5-15                         | 213                             | 190                        | 1,12                                   |
| 23   | beau                          | N modéré à faible  | 5-18,5                         | 246                             | 261                        | 0,94                                   |
| 24   | beau                          | S/SW nul à faible  | 2-17                           | 311                             | 306                        | 1,02                                   |
| 25   | beau                          | SW nul à faible    | 6-20                           | 173                             | 312                        | 0,55                                   |
| 26   | beau à couvert                | SW nul à faible    | 8,5-20                         | 203                             | 312                        | 0,65                                   |
| 27   | couvert à beau, averses       | W/NW modéré à fort | 11-17                          | 74                              | 312                        | 0,24                                   |
| 28   | peu nuageux                   | SW nul à faible    | 9-20                           | 170                             | 312                        | 0,54                                   |
| 29   | peu nuageux                   | E nul à faible     | 9,5-20                         | 222                             | 312                        | 0,71                                   |
| 30   | couvert à dégagé, averses     | nul                | 9-19                           | 126                             | 312                        | 0,40                                   |
| 1    | couvert à dégagé              | SE nul à faible    | 9-20                           | 133                             | 312                        | 0,43                                   |
| 2    | beau                          | NE nul à faible    | 8-21                           | 45                              | 312                        | 0,14                                   |
| 3    | beau                          | SW/W modéré        | 8-22,5                         | 39                              | 312                        | 0,13                                   |
| 4    | nuageux à couvert             | W faible           | 6-21                           | 246                             | 310                        | 0,79                                   |
| 5    | couvert, pluie interm. faible | S modéré           | 12,5-19                        | 182                             | 231                        | 0,79                                   |
| 6    | passages nuageux              | W/SW fort          | 11,5-23                        | 37                              | 230                        | 0,16                                   |
| 7    | couvert à dégagé              | W/SW fort          | 12,5-18                        | 12                              | 137                        | 0,09                                   |
| 8    | passages nuageux              | W/SW fort          | 11-16                          | 19                              | 155                        | 0,12                                   |
| 9    | passages nuageux              | SW fort            | 13-20                          | 4                               | 160                        | 0,03                                   |
| 10   | peu nuageux                   | E/SE faible à fort | 9-20                           | 70                              | 295                        | 0,24                                   |
| 11   | beau                          | E/SE fort          | 9-19                           | 19                              | 120                        | 0,16                                   |
| 12   | couvert                       | S faible à modéré  | 13-19,5                        | 81                              | 303                        | 0,27                                   |
| 13   | couvert à dégagé              | E faible à modéré  | 13,5-24                        | 153                             | 290                        | 0,53                                   |
| 14   | beau à nuageux                | N nul à faible     | 11,5-27                        | 89                              | 303                        | 0,29                                   |
| 15   | peu nuageux                   | E faible à modéré  | 11,5-26,5                      | 119                             | 303                        | 0,39                                   |
|      |                               |                    | <b>MOYENNE</b>                 | <b>120,57</b>                   | <b>254,47</b>              | <b>0,44</b>                            |

## Indications sur la migration 1997

La dix-huitième édition du camp de baguage a été marquée par un nombre de captures relativement important (3617 oiseaux), venant presque égaler le record de 1991 (3804 captures, toutefois réalisées à l'aide de la repasse pour les hirondelles). 81 espèces ont été capturées au cours de ce séjour et 158 espèces ont pu être recensées (captures et observations). Les pièges ont permis la capture de 55 oiseaux (45 dans la nasse et 10 dans les matoles) de 13 espèces différentes, dont 5 espèces n'ont été capturées qu'avec ces pièges (Bécasseau de Temminck, Bécassine des marais, Râle d'eau, Crabier chevelu et Busard des roseaux).

Nous avons également réalisé trois captures d'oiseaux avec une bague étrangère : une Hirondelle rustique avec une bague italienne, une avec une bague hollandaise et une Hirondelle de rivage avec une bague croate. 265 contrôles d'oiseaux bagués durant ce séjour ont été enregistrés (oiseaux bagués et recapturés par nous entre le 17/04 et le 15/05/97). 22 oiseaux bagués les années précédentes ont par ailleurs été capturés.



Le nombre de captures semble avoir été rythmé par les conditions météorologiques et notamment les coups de vent qui nous ont contraints à plier une partie des filets à plusieurs reprises. Extrêmes des températures : 3°C dans la nuit du 17 au 18 avril ; 27°C dans la journée du 14 mai.

Les filets de la rivière ont également été fermés plusieurs fois à cause d'une part du vent, mais aussi des posidonies rejetées par la mer venant obstruer l'écoulement de la rivière. Ce colmatage entraînait une hausse du niveau de l'eau de plus de 20 centimètres, rendant l'accès aux filets impossible, même avec des waders. A plusieurs reprises, un chenal a été ouvert dans les dépôts, à la main ou à l'aide de pioches. Celui-ci a été surnommé "canal de Barcaggio" par certains habitants du hameau.

Signalons également la capture d'une tortue cistude dans la nasse à la lagune (femelle ? longueur : 139,2 ; largeur : 103,5, épaisseur : 58,7), d'une couleuvre à collier, de plusieurs autres reptiles et batraciens (lézard tyrrhénien, grenouille verte, crapeau vert,...), de quelques chauves-souris (Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Vespère de Savi, Oreillard gris {trouvé mort dans le Palazzu}, Molosse de Cestonie), de courtilières, de sauterelles et autres insectes dans les filets et de hérissons dans les matos.

### Commentaire du graphique

(les dates de pics de migration sont indiquées en **gras**)

17/04 : beau, vent fort, 66 captures

**19-20/04** : beau, vent E/SE nul à modéré, 332 captures en deux jours

21/04 : pluie constante, vent NNE/E fort ; filets non montés, 2 Bésassines des marais sont toutefois capturées à la nasse, ainsi qu'un Pouillot fitis attrapé à la main (sauvé des griffes d'un chat)

**22-24/04** : couvert à dégagé, vent N modéré à nul puis S/SW nul à faible le 24, 770 captures en trois jours (moyenne de 257 oiseaux par jour)

27/04 : averses, vent N/NW modéré à fort, 74 captures

**29/04** : peu nuageux, vent E nul à faible, 222 captures

2-3/05 : beau, vent NE faible à nul le 2 et SW/W le 3, 84 captures en deux jours

**4-5/05** : nuageux, pluie, vent W faible le 4 et S modéré le 5, 428 captures en deux jours

6-11/05 : passages nuageux et vent W/SW fort du 6 au 9 et E/SE fort les 10 et 11, 161 captures en 6 jours (moyenne de 27 oiseaux par jour)

**12-13/05** : beau, vent S à E faible à modéré, 234 oiseaux en deux jours.

**NOTES AU SUJET**  
**D'UN PASSAGE PRENUPTIAL EXCEPTIONNEL D'ANATIDES**  
**A CAPITELLO ET CAMPO DELL'ORO DE FEVRIER A AVRIL 1996**

par

Gilles BONACCORSI

Immeuble Azalée  
Chemin de Biancarello  
Résidence Biancarello  
20090 AJACCIO

## I INTRODUCTION

Les modalités du flux migratoire, les données obtenues en période de reproduction et d'hivernage des Anatidés furent déjà évoquées au niveau de Capitello (BONACCORSI 1994 et 1995).

Cependant en plus d'une décennie aucun passage ne fut aussi remarquable et ce à bien des égards que celui observé entre février et fin avril 1996 et en particulier lors du mois de mars en effectif (tableau 2) et en nombre d'espèces.

Il conviendra de rappeler brièvement que le site de Capitello se situe en région ajaccienne (dans le S-W de l'île) au fond du golfe, à l'embouchure du Prunelli et de la Gravona. Il comprend toute une mosaïque de types d'habitats et notamment de zones humides (marais d'eau douce, étang d'eau saumâtre; cours de rivière). Peu d'autres sites (gravières de Baléone) se révélant être intéressants pour les Anatidés en micro-région. Chaque année lors du suivi initié dès le début des années 1980 l'essentiel des données recueillies au niveau des Anatidés se réfèrent au flux migratoire. L'hivernage y est résiduel et on relèvera qu'en 1996, lors du mois de janvier aucune donnée n'avait été obtenue.

## II METHODE D'ETUDE

Chaque année un nombre régulier de sorties est effectué durant tous les mois de l'année et les différentes espèces sont identifiées et leurs effectifs comptabilisés. Lors de la période concernée, les journées N = 69 comprenant une à deux sorties suivant les journées durèrent de 1h 30 à 5 h 30 (au maximum 7 h au cours de la même journée). Pour l'essentiel elles furent concentrées aux deux extrémités de la journée (mais parfois toute une après midi ou une grande partie de la matinée furent consacrées aux observations).

|         |                                     |                   |
|---------|-------------------------------------|-------------------|
| Février | N = 16                              | Total N = 69 (+4) |
| Mars    | N = 27 (+ 4 depuis Campo dell 'Oro) |                   |
| Avril   | N = 26                              |                   |

## III RESULTATS OBTENUS

Ceux-ci seront évoqués pour chacun des mois concernés. Apparaîtront le nombre d'espèces (tableau 1) observées (N), l'effectif total cumulé (E) Canards + Oies et le nombre de jours durant lequel furent effectuées les sorties comparé à celui au cours desquels furent notés des Anatidés n / N1)

FEVRIER N = 4 ; E = 26 + 59 ; n = 16 / N1 = 5

Ce n'est que durant ce mois que débuta et ce comme à l'accoutumée le passage pré-nuptial de ces oiseaux dès le début du mois (2 et 3) aucune observation, n'est intervenue cependant par la suite avant la fin de ce mois (le 24).

Seules trois espèces de canards aux effectifs très faibles furent notés (maximum 13 Sarcelles d'hiver *Anas crecca* le 25 février) et les effectifs des espèces de surface surclassent (29 spécimens) ceux des Canards plongeurs (1 spécimen).

Ce passage est en tout point comparable avec celui de février 1995 (E = 22) au plan des effectifs lors duquel seules 3 espèces avaient été observées.

Mais surtout on relèvera l'observation de 59 Oies cendrées *Anser anser* dont 44 ensemble les 2 et 3 février constituant un effectif record pour la Corse. L'espèce est irrégulière en micro-région (BONACCORSI 1994 et à paraître) et exceptionnelle à Capitello.

Rien durant ce mois ne laissait présager un passage aussi intense lors du mois de mars.

MARS N = 13 ; E = 7772 + 2 ; n = 27 (+4) / N1 = 27 (tableau 3)

Il s'agit du mois de mars le plus exceptionnel. Jamais un nombre aussi élevé d'espèces n'avait été notés à Capitello à cette époque de l'année (à titre indicatif N = 10 en mars 1995). Les premiers spécimens apparurent dès le 1 mars et ce dès le matin s'agissant de 24 jours sur 27 (Fig. 1).

Les effectifs observés ont fortement fluctués (extrêmes E = 3 le 11 mars - E = 2756 le 30 mars). Comme à l'accoutumée c'est durant la seconde quinzaine du mois que furent observées les plus fortes concentrations et sauf exception (le 30 mars) les plus importants contingents furent notés en fin d'après midi (après 17 h).

Les premiers spécimens arrivés ne s'approchent pas toujours du littoral ou viennent du large, il est peu fréquent que les oiseaux viennent se poser à Capitello et chaque fois ce fut l'embouchure du Prunelli et de la Gravona qui attira l'essentiel ou la totalité des individus, il est plus exceptionnel de les voir entrer dans les terres (cas du 8 mars jusqu'au Gravières de Baléone avant de ressortir en mer pour 5 spécimens de deux espèces). Les oiseaux circulent dans le golfe car suivant les jours la totalité ou l'essentiel des effectifs est présent en mer. En fin d'après midi les spécimens se rapprochent nettement du littoral mais un faible nombre viendra se nourrir peu avant la tombée de la nuit ou lorsque l'obscurité est intervenue. Par contre des départs furent observés les canards partant vers le N-NE à une altitude plus ou moins grande et sans se diriger vers des sites de gagnage à Capitello ou au-delà. Le site donc ne retient qu'un nombre marginal de spécimens.

Les bandes de canards seront suivant les cas mono ou plurispécifiques au posé et en vol, certains oiseaux tendant à se séparer des autres, se groupant par espèces, ou au sein d'une espèce se déplaçant à l'écart de troupes plus importantes, c'est notamment le cas pour la Sarcelle d'été *Anas querquedula*.

Le passage a lieu durant toute la journée et de manière plus marquée à partir du 15 mars. Le nombre d'espèces change durant la matinée ou l'après midi, et d'un jour sur l'autre (suivant les cas à la baisse ou plus souvent à la hausse).

Le mouvement est donc rapide, les oiseaux sont toujours notés arrivant par l'W ou le S-W.

Le nombre d'individus décomptés ne reflète pas la totalité des effectifs dont une partie échappe à l'observateur ne pouvant rester toute la journée (l'existence de mouvements nocturnes n'est pas connue). Il serait exact d'évaluer à 10 % de plus le nombre d'Anatidés passant au-delà de ceux mentionnés soit 8550 individus. On relèvera que le plus gros effectif cumulé était auparavant de 3800 spécimens mais pour la période février - mai, or ici 7772 (+2) (tableau 2) et en fait probablement plus de 8000 individus ceci ne concernait qu'un seul mois !

En 1996 furent observés les plus forts passages de Canard souchet *Anas clypeata* sur ce site (record de 217 simultanément le 30 mars) de Fuligule milouin *Aythya ferina* (98 simultanément le 18 mars) et surtout pour la Sarcelle d'été *Anas querquedula* (2460 le 30 mars soit un record pour le site, la Corse et la France !) pour laquelle Capitello est le premier site français (BONACCORSI et RECORBET 1994). Enfin la seconde donnée de Nette rousse *Netta rufina* un mâle le 8 mars, la première étant intervenue seulement au printemps 1995.

A noter la présence de 2 Oies cendrées *Anser anser* le 26 mars il s'agit là de la donnée la plus tardive sur ce site.

AVRIL N = 5 ; E = 192 ; n = 26 / N1 = 9

Le mouvement prénuptial ne laisse plus apparaître que ses dernières scories. Le nombre d'espèces est faible, et les effectifs insignifiants au regard de ceux du mois précédant. L'espèce dominante reste la Sarcelle d'été *Anas querquedula* avec un maximum de 66 individus le 5 avril. Là encore l'essentiel des spécimens fut noté en mer. A relever que la dernière donnée fut obtenue le 27 avril soit presque à la même époque qu'en 1995 (limite le 30 avril). On relèvera également l'observation d'un mâle et d'une femelle de Fuligule nyroca *Aythya nyroca* le 21 avril 1996.

#### IV DISCUSSION

Il conviendra de relever que le passage comme chaque année est avant tout concentré durant le mois de mars, et surtout durant la seconde quinzaine de celui-ci.

Mais surtout le site de Capitello Campo dell'Oro représente une localité remarquable à plus d'un titre. En premier lieu il n'existe là que peu de ressources disponibles. Et d'ailleurs la quasi totalité des oiseaux ne s'alimentant pas, il leur est donc impossible de reconstituer leurs réserves adipeuses avant de continuer leur trajet vers des sites de reproduction plus à l'écart de la Corse. De plus les pertes énergétiques ne leur seront pas épargnées : envol à plusieurs reprises durant la journée des troupes lors des décollages et atterrissages d'avions sur l'aérodrome de Campo dell'Oro, éventuels dérangements par des bateaux, attaques de prédateurs, le Goéland leucophaea sans succès, ou le Busard des roseaux faisaient envoler les oiseaux dans le golfe.

En second lieu l'endroit a subi de profonds bouleversements à la suite des multiples aménagements survenus lors de ce siècle, modification du cours de la Gravona, assèchement des zones marécageuses, constructions (aéroports, routes...). Si dans le passé la nourriture était sans doute présente et plus facilement disponible la situation a bien changé.

Seule explication plausible s'agissant de la fréquentation de cette zone : l'impact des conditions météorologiques. En effet des concentrations de Canards et notamment de Sarcelle d'été, l'espèce dominante, furent mentionnées dans différents golfes de la côte occidentale, mais jamais ils n'atteignent l'ampleur du mouvement constaté dans celui d'Ajaccio : aucun n'est aussi profond et aussi abrité de l'impact des vents du nord et du nord-est et représentant un obstacle pour ces migrateurs contraints de chercher un lieu de repos avant de reprendre leur route.

Concernant enfin le fort passage d'Oies cette progression est à rapprocher de l'expansion de la seule espèce observée l'Oie cendrée *Anser anser* lors du mouvement migratoire et lors de l'hivernage dans le sud de l'Europe.

Avec un effectif cumulé de N = 8051 Anatidés et en réalité probablement N > 8800 (période 1 février - 30 avril) le mouvement prénuptial de 1996 représente le plus fort passage observé en micro-région, et au total 13 espèces furent mentionnées.

## BIBLIOGRAPHIE

- BONACCORSI G. (1994) Avifaune de la basse Vallée de la Gravona et du Prunelli, Trav. sci. Parc nat. Reg. et Res. de la Corse 49 : 1 - 88.
- BONACCORSI G. (1995) Modalités de passage et du stationnement des anatidés dans la région de Capitello - Campo dell'Oro de juin 1994 à juin 1995 Trav. du Parc Parc nat. Reg. et Res. de la Corse 54 : 85 - 95.
- BONACCORSI G. et RECORBET B. (1994) Migration prénuptiale et statut de la Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) en Corse Trav. sci. Parc nat. Reg. et Res. de la Corse 49 : 89 - 101.

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 III → 7 h     | 11 III → 8 h 20 | 21 III → 6 h 50 |
| 2 III → 0       | 12 III → 0      | 22 III → 0      |
| 3 III → 8 h 20  | 13 III → 8 h 20 | 23 III → 6 h 50 |
| 4 III → 0       | 14 III → 7 h 25 | 24 III → 7 h    |
| 5 III → 8 h 15  | 15 III → 7 h 50 | 25 III → 7 h 05 |
| 6 III → 0       | 16 III → 7 h 15 | 26 III → 7 h    |
| 7 III → 8 h 20  | 17 III → 7 h    | 27 III → 7 h 10 |
| 8 III → 7 h 05  | 18 III → 7 h    | 28 III → 0      |
| 9 III → 8 h 25  | 19 III → 7 h 45 | 29 III → 6 h 50 |
| 10 III → 7 h 20 | 20 III → 7 h 20 | 30 III → 6 h 45 |
|                 |                 | 31 III → 0      |

Fig. 1 : Heures d'arrivées le matin des Anatidés à Capitello - Campo dell'Oro en mars 1996  
(n = 37/31)

On relèvera que seuls les 2, 4, 6 et 12 mars aucun spécimen ne fut observé  
mais que les 22, 28 et 31 seuls des spécimens furent notés l'après midi

de 6 h 45 à 7 h 00 N = 9

de 7 h 01 à 8 h 05 N = 9

de 8 h 10 à 8 h 30 N = 6

| Espèces \ Mois    | Février | Mars | Avril |
|-------------------|---------|------|-------|
| Harle huppé       |         | X    |       |
| Nette rousse      |         | X    |       |
| Fuligule nyroca   |         | X    | X     |
| Fuligule morillon |         | X    |       |
| Fuligule milouin  | X       | X    | X     |
| Sarcelle d'hiver  | X       | X    |       |
| Sarcelle d'été    |         | X    | X     |
| Canard souchet    |         | X    | X     |
| Canard pilet      |         | X    |       |
| Canard colvert    |         | X    | X     |
| Canard chipeau    | X       | X    |       |
| Canard siffleur   |         | X    |       |
| Oie cendrée       | X       | X    |       |
| Totaux            | 4       | 13   | 5     |

Tableau 1 : Présence des espèces par mois lors de la période février - avril 1996 à Capitello - Campo dell'Oro

| Espèces           | Mars 1995 | Mars 1996 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Canard sp.        | 13        | 1         |
| Harle huppé       |           | 2         |
| Nette rousse      |           | 1         |
| Fuligule nyroca   | 1         | 1         |
| Fuligule morillon | 10        | 8         |
| Fuligule milouin  | 51        | 244       |
| Sarcelle d'hiver  | 62        | 166       |
| Sarcelle d'été    | 2345      | 6067      |
| Canard souchet    | 270       | 775       |
| Canard pilet      | 120       | 220       |
| Canard colvert    | 3         | 16        |
| Canard chipeau    | 18        | 7         |
| Canard siffleur   | 136       | 264       |
| Oie cendrée       |           | 2         |
| Totaux            | 3029      | 7774      |

Tableau 2 : Totaux comparés par espèces des effectifs d'Anatidés cumulés lors des mois de mars 1995 et mars 1996 à Capitello - Campo dell'Oro

On relèvera l'absence d'oies en 1995 : la domination des Canards de surface (98 % en 1995 et 96,71 % en 1996) sur les Canards plongeurs (2 % en 1995 et 3,29 % en 1996) et ce au niveau des effectifs et des espèces (6/3 en 1995 et 6/5 en 1996). Il faudra noter en 1995 et 1996 la domination des effectifs des deux espèces la Sarcelle d'été *Anas querquedula* (77,4 % en 1995 et 78 % en 1996) et du Canard souchet *Anas clypeata* (8,9 % en 1995 et 9,9 % en 1996).

**LE VENTURON DE CORSE :  
QUEL STATUT LUI CONFÉRER ?**

**Eric Pasquet & Jean-Claude Thibault**

**E.P.:** Laboratoire de Zoologie, Mammifères & Oiseaux, 55 rue de Buffon, F-75005 Paris  
**J.-C.T.:** Parc naturel régional de Corse, B.P. 417, F-20184, Ajaccio

## INTRODUCTION

Dès le 19ème siècle, la comparaison des spécimens d'oiseaux rapportés de Corse avec ceux du continent avait permis aux systématiciens de constater, pour certaines espèces, de nettes différences de coloration du plumage. De nombreuses sous-espèces corses et sardes furent ainsi décrites. Plus tard, l'écoute attentive des chants (et leur enregistrement) apporta d'autres éléments de distinction. Au sein de l'avifaune corse, on pourrait ainsi dénombrer près de vingt espèces dont les représentants insulaires se distinguent nettement par le phénotype ou le chant de ceux situés sur le continent (Vaurie 1959, Chappuis 1976, Thibault 1983).

Citons les cas de la Mésange noire (*Parus ater sardus*) plus rousse, du Bec-croisé (*Loxia curvirostra corsicana*) nettement moins coloré ou encore de la Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator badius*) qui ne montre pas de barre alaire blanche.

Mais le cas le plus marqué est certainement celui du Venturon montagnard (*Serinus citrinella corsicana*). Les Venturons que l'on peut observer en Corse, Sardaigne et dans les îles toscanes se distinguent, non seulement par le phénotype ou le chant, mais aussi par une grande modification de leur niche écologique (Martin 1982). Nous l'avons aussi vérifié pour un marqueur moléculaire.

## TAXINOMIE, PHENOTYPE ET MORPHOMETRIE

Le Venturon appartient au genre *Serinus*, lui-même placé dans la famille des Fringillidés, à proximité des Pinsons (genre *Fringilla*), des Tarins et Chardonnerets (genre *Carduelis*) et des Linottes (genre *Acanthis*).


Les serins forment un ensemble d'environ 35 espèces dont la plupart sont africaines. Hors Afrique et Europe, ils ne sont représentés que par *S. estherae*, en Indonésie, par *S. pusillus* et *S. thibetanus*, en Asie, et *S. syriacus* qui occupe une aire très limitée au Proche Orient.

En Europe, on ne rencontre que le Serin cini *S. serinus* (*S. canaria* le remplaçant dans les îles Canaries, Açores et Madère) et le Venturon *S. citrinella*. Ces trois espèces forment avec le Serin du Cap (*S. canicollis*, espèce répandue en Afrique de l'Est et du Sud) un ensemble, une super-espèce, bien individualisé au sein du genre (Nicolai 1960, Hall et Moreau 1970).

Le Venturon est un serin de petite taille, d'environ 12g, mais légèrement plus grand et élancé que *S. serinus*, avec le bec et les ailes proportionnellement plus longs. Son plumage est moins contrasté et moins rayé que celui du Serin cini. Il est aussi d'apparence plus verte que jaune. Le devant de la tête, le ventre et les sus-caudales sont cependant d'un jaune plus coloré, alors que le cou est nettement gris.

Si le Venturon est aujourd'hui placé sans ambiguïté dans le genre *Serinus*, rappelons que cette situation n'a pas toujours été de mise. De par la forme de son bec, nettement plus pointu que chez les autres Serins et en cela ressemblant fort à celui des Tarins, le Venturon a été placé pendant plusieurs décennies dans le genre *Carduelis*. C'est l'étude de son chant, de ses comportements, en particulier le comportement d'alimentation (Nicolai 1957), mais aussi l'étude de la morphométrie du squelette (Ackermann 1967, fig. 1) qui ont permis de répondre définitivement à la question de son appartenance au genre *Serinus*.

Figure 1 : Relation de ressemblance morphologique entre quelques fringilles obtenue à partir de mesures du squelette. (d'après Ackermann 1967)



Le Venturon, sous sa forme continentale *S. c. citrinella*, a été décrit dès 1764 par Pallas, mais il faut attendre plus d'un siècle pour que la forme insulaire *S. c. corsicana* soit découverte. C'est Koenig qui la décrira en 1899 (fig. 2). Voici ce qu'il écrit : "Male et femelle beaucoup plus petit que le *Citrinella alpin*; dessous du corps, croupion et suscaudales d'un très beau vert-jaune, plumes du dos brunes avec des stries longitudinales noirâtres."

Figure 2: Texte original de la description du Venturon de Corse. (D'après Koenig 1899)

#### Eine neue Vogelart von der Insel Corsica.

Bekannt gegeben von A. Koenig, Bonn.

Vor Kurzem erhielt ich von einem Fachkollegen eine Sendung (12 Bälge) von Alpen-Zitrinchen (*Citrinella alpina* Scopoli). Diese Stücke erwiesen sich als typische Form, während die von mir im Frühjahr 1896 auf Corsica gesammelten Vögel (6 Bälge) sich als wesentlich verschieden herausstellten. Dresser weist in seinen „Birds of Europe“ darauf hin und bildet auch 2 von Lord Lilford auf Corsica gesammelte Vögel ab, hält diese aber merkwürdiger Weise für Vögel im Winterkleide. Da ich nun im April auf Corsica sammelte, wo die Zitrinchen bereits in vollster Liebeswerbung standen, demnach also das Hochzeitskleid trugen, muss ich diese Vögel wegen der gänzlich von der typischen Form abweichenden braunen Rückenfärbung und der bedeutend kleineren Masse (Flügelänge durchweg etwa 2 cm kürzer) als neue Art ansprechen. Ich nenne sie *Citrinella corsicana*.

#### Diagnosis von *Citrinella corsicana* Kg.

Mas et femina multo minoribus *Citrinella alpina* Scopoli; corpore subtus, uropygio et supracaudalibus pulcherrime viridi-flavis, dorsum plumis brunneis per longitudinem nigricantibus striatis.

Habitat: Corsica insula.

Aves corsicanae, nova species haud cognitae, in tabula Dresseri „A History of the Birds of Europe“ egregie pictae sunt.

Remarque : l'unité de mesure dans la partie en Allemand de ce texte est certainement fautive ; la longueur d'aile ne peut être 2 cm plus petite, mais plutôt 2mm.

Ainsi, les principales distinctions entre les deux formes de Venturons sont:

1) la taille, 2) l'intensité du jaune et 3) la couleur du dos, gris-vert chez *S. c. citrinella*, et brun-roux fortement rayé chez *S. c. corsicana*. Cette deuxième forme présente ainsi un plumage plus contrasté (Cramp et Perrins 1994, voir photo).

En ce qui concerne les mensurations, voici les valeurs de longueur d'aile pliée (moyenne en mm, taille de l'échantillon entre parenthèses) rapportées par Cramp et Perrins (1994).

| Origine                        | Males      | Femelles   |
|--------------------------------|------------|------------|
| <b><i>S. c. citrinella</i></b> |            |            |
| Alpes (Ouest)                  | 78.7 (18)  | 77.1 (6)   |
| Alpes (Est)*                   | 79.0 (266) | 77.1 (135) |
| Jura*                          | 79.0 (77)  | 76.6 (61)  |
| Pyrénées                       | 78.2 (12)  | 76.2 (8)   |
| <b><i>S. c. corsicana</i></b>  |            |            |
| Elbe                           | 74.8 (7)   | 72.4 (5)   |
| Corse                          | 73.5 (17)  | 70.9 (13)  |
| Corse*                         | 74.5 (28)  | 71.9 (38)  |
| Sardaigne                      | 72.0 (10)  | 70.8 (8)   |

\* Il s'agit d'oiseaux vivants ; les valeurs sont toujours légèrement supérieures à celles prises sur des spécimens en peau.

La différence entre les deux sous-espèces, prise pour chaque sexe, est proche de 4mm et est significative. Elle l'est aussi pour celle entre les deux sexes (2mm). Pour d'autres mensurations comme la hauteur et la longueur du bec, ou encore la longueur du tarse, il y a très peu de différences, entre sous-espèces ou entre sexes.

### REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Le Venturon du continent occupe une aire assez restreinte en Europe (fig. 3) principalement montagnarde (voir Cramp & Perrins, 1994). Au nord de sa répartition, on le trouve en Forêt Noire et dans les Vosges puis celle-ci s'étend sur une grande partie du massif Alpin (Jura compris) sans toutefois atteindre la limite orientale de l'arc (Märki 1976).

Il est présent dans de nombreuses localités du Massif central (fig. 4). Plus au sud, il fréquente les forêts de Pins des Pyrénées puis des Monts cantabriques et du Massif central de Castille. La forme insulaire est limitée à la Corse, la Sardaigne et aux îles Toscannes (Vaurie 1959).

Figure 3: Répartition du Venturon en Europe. (d'après Cramp & Perrins 1994)





Figure 4: Répartition du Venturon en France  
(d'après Yeatman-Berthelot & Jarry 1994)



De gauche à droite : Venturons de Corse (1 femelle puis 2 mâles) et Venturons continentaux (1 femelle puis 2 mâles). vus de dessus.



De gauche à droite : Venturons de Corse (1 femelle puis 2 mâles) et Venturons continentaux (1 femelle puis 2 mâles). vus de dessous.



## ÉCOLOGIE

Sur le continent, le Venturon habite les forêts claires de conifères, préférant les zones de bordure. Son nid est alors généralement situé près du tronc à une hauteur variant de 3 à 10m du sol. Mais il peut aussi vivre dans les Aulnes quand les conifères font défaut (Mingozzi *et al.* 1988).

Dans le nord et l'est des Alpes, le Jura, la Forêt Noire, il s'agit principalement de forêts d'Épicéa (*Picea*) et de Sapin (*Abies*). Dans les Hautes-Alpes, il occupe les forêts lumineuses de Mélèzes (*Larix*). Plus au sud, il s'agira principalement de Pins. Sur le versant nord des Pyrénées, il est abondant dans les forêts de Pins à crochet (*Pinus uncinata*) alors que sur le versant sud, on le trouve dans les massifs de Pins sylvestres (*Pinus sylvestris*).

L'altitude minimale à laquelle on peut le trouver nicheur dépend de la distribution de ces massifs forestiers. Le Venturon peut nicher dès l'altitude de 700m dans la Forêt Noire mais seulement à partir de 1400m dans les Alpes, mais c'est en Catalogne que la limite inférieure est la plus basse (500m) (Borras & Senar 1991). Dans tous ces massifs, la limite supérieure de nidification est aussi celle des arbres.

En Corse, la situation est très différente. Il habite toutes sortes de végétations basses, du niveau de la mer jusqu'à la limite supérieure des arbustes (Armitage 1937, Thibault 1983). À l'étage méditerranéen, il occupe les ripisylves (principalement *Alnus glutinosa*), le maquis (*Cistus* spp., *Arbutus unedo*, *Erica* spp. etc...). Aux étages supra-méditerranéen et montagnard, on le trouve dans les fruticées basses (*Genista* spp.), les clairières où grandissent les jeunes pins (*Pinus nigra laricio*) et localement dans des buissons sous des fûtaies claires de pins. Enfin, plus en altitude, il habite les buissons d'Aulne odorant (*Alnus suaveolens*) de Genévrier nain (*Juniperus nana*) et d'Épine-vinette de l'Etna (*Berberis aetnensis*).

Pendant les mois de mai et juin, en 1990 et 1991, nous avons recherché la présence du Venturon en Corse, le long d'un transect comprenant 28 carrés de 1km<sup>2</sup> situés entre le Golfe de Calvi et la vallée du Niolo (fig. 5). L'altitude de ces carrés-échantillon varie du niveau de la mer à 2300 m. On constate que le Venturon est bien présent à toutes les altitudes, absent seulement de quelques zones cultivées de la vallée de la Figarella (fig. 6).

## CHANT

Le chant du Venturon est un babil constitué de motifs variés souvent courts, plus ou moins répétés, assez ressemblant à celui du Serin Cini et de certains *Carduelis*, en particulier le Chardonneret. Dans une étude consacrée aux vocalisations des oiseaux de Corse, Chappuis (1976) conclut à de grandes différences entre les chants des deux formes de Venturon. Voici ce qu'il écrivait à propos du chant complet :

*"Sur le continent, le chant est parsemé de quelques trilles épisodiques, mais est constitué pour sa plus grande partie de notes différentes successives. Sur un rythme en général plus rapide, on a une impression brouillonne (...)"*. *"En Corse, le chant est constitué de séries de notes répétées, des séries différentes se succédant sur un rythme en général beaucoup plus lent (...)"*.

Figure 5: Localisation des carrés échantillon le long du transect Calvi-Niolo et leur distribution altitudinale.





Figure 6: Répartition altitudinale du Venturon en Corse



Les sonogrammes de C. Chappuis et J.-C. Roché que nous reproduisons ici (fig. 7), d'après Cramp et Perrins (1994), permettent de bien se rendre compte de ces différences de rythmes et du caractère plus organisé du chant du Venturon de Corse.

C. Chappuis met de plus en évidence un type de chant propre à la forme *corsicana* constitué de notes longues émises lentement (fig. 8), comprenant de jolis sons rappelant des cloches, des trompettes ou des flûtes. Ce type de chant n'a pas encore été entendu chez la forme continentale.

A propos des cris, Chappuis (1976) écrivait :


*"Sur le continent : éléments brefs, très modulés en fréquence, de structure harmonique complexe." "En Corse : éléments deux à trois fois plus longs, à peine modulés, de structure pure, présentant quelquefois une harmonique."*

D'après Cramp et Perrins (1994), cette description semble s'appliquer aux cris de contact ; certains autres cris (cri de vol par exemple) seraient cependant similaires entre les deux formes.

Figure 7 Exemples de chant de Venturons. Sonogrammes de J.-C. Roché et C. Chappuis.  
(d'après Cramp & Perrins 1994)




C. Chappuis Suisse May 1965



J.-C. Roché France Juillet 1987




C. Chappuis Corse Avril 1969



J.-C. Roché Corse Juin 1966

Figure 8 : Autre chant de *Serinus citrinella corsicana*. Sonogrammes de C. Chappuis.  
(d'après Cramp & Perrins 1994)



C. Chappuis, Corse

## GENETIQUE

Afin d'estimer la différenciation génétique entre ces deux sous-espèces (et donc la période à laquelle aurait eu lieu leur séparation), nous avons séquencé un fragment d'ADN mitochondrial de 925 nucléotides (Pasquet & Thibault en préparation) appartenant au gène codant le cytochrome b qui est une des protéines intervenant dans la chaîne respiratoire des cellules.

La séquence du gène codant le cytochrome b est connue pour de nombreux organismes et on y trouve des zones suffisamment identiques entre différentes catégories taxinomiques pour permettre l'utilisation d'amorces d'amplification assez universelles. Cette amplification (dite PCR, pour "*Polymerase Chain Reaction*") est une méthode de duplication de fragment d'ADN *in vitro* utilisant une polymérase thermorésistante. Le fragment ainsi amplifié peut alors être séquencé (voir Pasquet & Thibault en prep.)

Notre échantillon comprend 4 individus nicheurs de Corse, 4 nicheurs des Pyrénées espagnoles (Catalogne), 4 nicheurs des Hautes-Alpes et 4 individus en migration du Valais (Suisse). Nous avons utilisé les bourgeons de une à trois rémiges prélevées sur les oiseaux vivants, car il y a suffisamment d'ADN dans ces bourgeons pour réaliser de bonnes amplifications.

Alors qu'il n'y a aucune différence entre les individus des Alpes et des Pyrénées, la divergence génétique entre les deux sous-espèces est de 2.71% ; 25 nucléotides diffèrent entre les deux fragments d'ADN [23 sont des substitutions de type transition (A $\leftrightarrow$ G ou C $\leftrightarrow$ T) et 2 sont des substitutions de type transversion (autres substitutions) beaucoup plus rares car chimiquement plus difficiles]. Cette divergence est située parmi les valeurs faibles que l'on a pu observer entre deux espèces ou deux sous-espèces (tab.1).

Ainsi, elle est nettement plus faible que celle observée par Helbig *et al.* (1993, 4%) entre les deux sous-espèces de Pouillots véloces, atlantique (*Phylloscopus collybita collybita*) et ibérique (*P. c. brehmi*), qui pourtant se rencontrent dans une zone de parapatrie où les individus sont encore capables de s'hybrider (Salomon 1987).

Mais cette divergence est supérieure à celles que l'on a pu observer :

1) entre deux lignées maternelles inter-fertiles de Mésange bleue, *Parus caeruleus* (0.62%, Taberlet *et al.* 1992), lignées qui se retrouvent d'ailleurs dans toute l'Europe (Taberlet 1994),

2) entre le Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta spinoletta*) et le Pipit maritime (*A. s. petrosus*) (1.15%, Arctander *et al.* 1996) mais aussi

3) entre les Sittelles chinoise (*Sitta villosa*) et corse (*S. whiteheadi*) (2.04%, Pasquet en prep), mais ce sont des formes très éloignées géographiquement.

## CONCLUSION

Tout bien considéré (divergence observée entre les deux formes de Venturons comparée aux autres cas et aux distances géographiques entre elles), et en suivant l'idée de garder la taxinomie la plus stable possible, il ne nous paraît pas nécessaire de modifier le statut de sous-espèces des formes continentale et insulaire du Venturon.

Chez les oiseaux, la divergence génétique a pu être calibrée en fonction du temps chez les oies (*Anser* et *Branta*) car il existe des données paléontologiques (Shields & Wilson 1987). Ce calibrage donne un taux de 2% de divergence par millions d'années. Il faut être bien sûr très prudent dans l'utilisation de ce taux car il pourrait ne pas s'appliquer au cas du Venturon. Il indiquerait un ordre de grandeur de 1 à 1.5 millions d'années pour la période à laquelle le Venturon insulaire se serait trouvé isolé du continent.

Cette période est certainement beaucoup plus récente que celle de la dernière connexion entre les îles et le continent, qui daterait de la crise messinienne il y a 5 ou 6 millions d'années (Maldonado 1985). Il y a donc probablement eu, au début du Pléistocène, une rétraction importante d'une aire de répartition beaucoup plus large que celle connue actuellement. Ceci n'a rien de surprenant car c'est à partir de cette période que les glaciations ont fragmenté la distribution de la couverture forestière en Europe.

On peut aussi avancer que si celle-ci avait totalement disparu dès les premières glaciations, les populations de Venturon n'auraient probablement pas pu subsister en Corse. Mais le Pin Laricio n'ayant apparemment jamais complètement disparu, cette espèce a pu se maintenir sur les îles. On peut donc supposer que c'est grâce au maintien d'une couverture forestière minimale et à une longue durée d'isolement que le Venturon de Corse a acquis les caractères de différenciation morphologique, acoustique, écologique et génétique qui lui sont propres sur les îles cyno-sardes.

## REFERENCES

- Ackermann, A. 1967. Quantitative Untersuchungen an körnerfressenden Singvögeln. *J. Orn.* 108: 430-473.
- Arctander, P., Folmer, O. & Fjeldsa, J. 1996. The phylogenetic relationships of Berthelot's Pipits *Anthus berthelotii* illustrated by DNA sequence data, with remarks on the genetic distance between Rock and Water Pipits *Anthus spinoletta*. *Ibis* 138: 400-415.
- Armitage, J. 1937. Field notes on the Corsican Citril Finch. *Br. Birds* 31:98-100.
- Borras, A. & Senar, J.C.. 1991. Opportunistic breeding of the Citril Finch *Serinus citrinella*. *J. Ornithol.* 132: 285-289.
- Chappuis, C. 1976. Origine et évolution des vocalisations de certains oiseaux de Corse et des Baléares. *Alauda* 44: 475-495.
- Cramp, S. & Perrins, C.M. (eds.) 1994. The birds of the Western Palearctic, Vol. 8. Oxford: Oxford University Press.
- Hall, B. P. & Moreau, R. E. 1970. An atlas of speciation in African passerine birds. British Museum, London.
- Helbig, A.J., Salomon, M., Wink, M. & Bried, J.. 1993. Absence de flux génique mitochondrial entre les pouillots "véloces" médio-européen et ibérique (Aves: *Phylloscopus collybita collybita*, *P.(c.) brehmi*); implications taxinomiques. Résultats tirés de la PCR et du séquençage d'ADN. *C. R. Acad. Sci.* 316: 205-210.
- Koenig, A. 1899. Eine neue Vogelart von der Insel Corsica. *Ornit. Monatsb.* 7: 120.
- Maldonado, A. 1995. Evolution of the Mediterranean Basins and a Detailed Reconstruction of the Cenozoic Paleooceanography. In Margalef, R. *Western Mediterranean*: 17-59. Oxford: Pergamon Press.
- Märki, H. 1976. Brutverbreitung und Winterquartier des Zitronenzeisigs *Serinus citrinella* nördlich der Pyrenäen. *Orn. Beob.* 73: 67-88.
- Martin, J.-L. 1982. L'infiltration des oiseaux forestiers dans les milieux buissonnants de Corse. *Rev. Ecol. (Terre Vie)*. 36: 397-419.
- Mingozzi, T., Boano, G. & Pulcher, C. 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta. Torino: Museo Regionale di Scienze Naturali.
- Nicolai, J. 1957. Die systematische Stellung des Zitronenzeisigs ("Carduelis" citrinella). *J. Orn.* 98: 363-371.
- Pasquet, E. 1992. Note sur la validité de la sous-espèce de Gorgebleue à miroir blanc *Luscinia svecica namnetum*; *Bonn. zool. Beitr.* 43: 35-44.
- Pasquet, E. Molecular phylogeny of the Nuthatches (Sittidae) of the *canadensis* group and its evolutionary and biogeographical implications. *Condor* (submitted).

- Pasquet, E. & Thibault, J.-C. Genetical differences among mainland and insular forms in the Citril Finch *Serinus citrinella*. In prep.
- Salomon, M. 1987. Analyse d'une zone de contact entre deux formes parapatriques: le cas des Pouillots véloces *Phylloscopus c. collybita* et *P. c. brehmii*. Rev. Ecol.(Terre Vie) 42: 377-420.
- Shields, G. F. & Wilson A.C. 1987. Calibration of mitochondrial DNA evolution in geese. J. Mol. Evol. 24: 212-217.
- Taberlet, P. 1994. Phylogeographic Structure of European Populations of Blue Tit inferred from Mitochondrial DNA polymorphism. Proc. XXI Int. Orn. Congr. J. Orn.135: 364.
- Taberlet, P., Meyer, A. & Bouvet, J. 1992. Unusual mitochondrial DNA polymorphism in two local populations of blue tit *Parus caeruleus*. Mol. Ecol. 1: 23-36.
- Thibault, J.-C. 1983. Les oiseaux de la Corse. Histoire et répartition aux XIX et XX e siècles. Paris: Gerfau Impression.
- Vaurie, 1959. The Birds of the Palearctic fauna. Passeriformes. London: Witherby.
- Yeatman-Berthelot, D. & Jarry. G. 1994. Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 1985-1989. Paris: Société Ornithologique de France.

### Remerciements

Ce travail a bénéficié de financements du Parc Naturel Régional de Corse et du Centre de Génétique Moléculaire (CNRS). Les membres du Groupe Ornithologique de Corse (Associations des Amis du Parc) nous ont aidés lors de la collecte des données du transect altitudinal, Monique Monnerot et Nicole Dennebouy ont accueilli l'un de nous (EP) au CGM (CNRS), Roger Garcin, Lukas Jenni et Juan Carlos Senar nous ont procuré du matériel des Alpes et des Pyrénées. A toutes et à tous nous adressons nos plus sincères remerciements.



**DONNÉES PRÉLIMINAIRES SUR LA RÉPARTITION ET L'EFFECTIF DE  
L'AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) EN CORSE.**

par

**Jean-François SEGUIN et Patrick VIDAL**

## INTRODUCTION

L'Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*) est un rapace typiquement forestier, discret et relativement peu étudié. La forme *A. g. arrigonii*, plus sombre et de taille inférieure à la forme nominale, est une sous-espèce cyrno-sarde. L'Autour "corse" figure à ce titre à l'annexe I de la Directive européenne sur la conservation des oiseaux. L'effectif et la répartition de cette espèce sont mal connus en Corse. Une première estimation de 10-100 couples (THIBAUT *et al.*, 1992) était basée sur le fait que l'Autour fréquente toutes les grandes forêts (THIBAUT, 1983). Pour protéger cette espèce, il convient de connaître sa répartition afin de préserver au mieux son habitat. C'est dans cette optique que le Parc Naturel Régional a entrepris un recensement. Les résultats présentent les connaissances actuelles sur la répartition de l'Autour des Palombes en Corse.

## MATÉRIEL ET MÉTHODES

### L'espèce étudiée

L'Autour des Palombes est présent et niche dans presque toute la région paléarctique, ainsi qu'en Amérique du Nord (carte 1). En France il a subi de lourdes persécutions et n'occupe plus que les grandes forêts de plaine et les massifs montagneux où la pression humaine est faible (carte 2). L'effectif de l'Autour en Europe (CEI exclue) est estimée à 28.000-35.000 couples (GENSBOL, 1988). La population reproductrice française compte environ 2.200 à 3.100 couples (YEATMAN-BERTHELOT, 1995). La répartition des oiseaux appartenant à la sous-espèce *A.g.arrigonii*, plus petite et plus sombre que la forme nominale, se limite à la Corse et à la Sardaigne.

### Les méthodes

#### 1- Recueillir les données


Les résultats se basent sur les données des recensements d'automne 1993 (P. VIDAL), automne 1994 et hiver 1995 (J.-F. SEGUIN). Ces recensements sont renforcés par les observations d'Autour effectuées en dehors de ces études (J.-C. THIBAUT, J. TORRE, G. BONACCORSI, T. ROSSI, O. PATRIMONIO, N. BECK, F. MOUGEOT, M. BOURON).

#### 2- Observation en période de parade.


Le recensement effectué en hiver 1995 était basé sur l'observation des parades. Les parades de l'Autour ont lieu en février-mars (dès la mi-janvier en cas d'hiver doux). Le vol est alors caractéristique: c'est un vol rectiligne accompagné de quelques battements d'aile et éventuellement de quelques piqués, qui se termine par un plongeon vertigineux dans la zone de nidification. Ces vols ont souvent lieu à haute altitude et il est fréquent d'observer le couple (GEROUDET, 1965). C'est une période très favorable à la recherche des sites de nidification.

#### 3- La méthode de repasses de vocalisation

Cette méthode a été appliquée lors des recensements en automne 1993 et 1994. Elle consistait à émettre les vocalisations de l'Autour selon un protocole précis (CERASOLI *et al.*, 1992) et de localiser les réponses éventuelles.



Carte 1: Distribution mondiale de l'Autour des Palombes  
(d'après DEL HOYO et al., 1994)



Quelle que soit la méthode, l'utilisation de cartes de peuplements forestiers au 1/10 000 (fournies par l'Office National des Forêts) a facilité le choix des postes d'observation. Cette étude a été réalisée dans les forêts domaniales et communales soumises au régime forestier, Office National des Forêts.

## RÉSULTATS

Les observations effectuées ponctuellement et celles des recensements ont permis de dénombrer et cartographier 18 territoires où la reproduction était certaine (aires connues ou/et observation de parade, présence d'un couple) et 10 territoires où la reproduction était probable (observation d'un individu, sans parade).

### **Le recensement par observation des parades**

L'observation des parades a permis de dénombrer 6 couples dans des forêts domaniales et communales soumises au régime forestier en Haute-Corse.

### **Le recensement par repasses de vocalisations**

Cette méthode a confirmé la présence de 4 couples sur des territoires déjà connus. De plus, cela a permis de localiser un territoire probable supplémentaire.

18 territoires supplémentaires ont été obtenus grâce aux observations ponctuelles.

Les 28 territoires recensés actuellement sont figurés sur la carte 3.

## DISCUSSION


Le recensement de l'Autour au moment des parades est une méthode demandant peu de moyen, facile à appliquer et efficace. Seules les conditions météorologiques peuvent perturber le recensement, étant donnée la courte durée de cette période (février-mars).

Le recensement par repasses de vocalisations s'est avéré plus efficace pour contrôler des sites que pour prospecter, certainement à cause du terrain difficile en montagne et des voies d'accès limitées par rapport à la superficie à prospecter. L'efficacité lors des études utilisant la méthode de repasses (CERASOLI *et al.*, 1992; KENNEDY *et al.*, 1993) concernait également des couples dont le site de nidification était connu, et non de la prospection.

La carte 3 montre que les territoires se situent pour la plupart en Haute-Corse. Ceci est dû à un effort de prospection concentré sur les forêts de Haute-Corse lors des derniers recensements et non à une sous-représentation de l'espèce en Corse du Sud. Il s'agit de la répartition des sites connus. Pour l'instant 18 couples ont été recensés et 10 observations d'un individu ont permis de cartographier ces 28 territoires.

# REPARTITION DE L'AUTOUR DES PALOMBES

(*Accipiter gentilis arrigonii*)



Carte 3

Tous ces territoires recensés montrent que l'autour peut occuper des habitats forestiers différents quant à leur superficie:

\* forêt de grande superficie (forêts domaniales ou communales)

\* mosaïque de petites forêts (forêts annexes)

et aux essences forestières:

\* forêt de conifères (Pin maritime, Pin laricio)

\* forêt de feuillus (Chêne vert, Hêtre)

La présence d'un couple d'Autour en châtaigneraie n'a jamais été confirmée, malgré la couverture boisée favorable en Castagniccia (PATRIMONIO, 1991). Il faut que la forêt puisse lui procurer des zones de chasse, de quiétude et de nidification, des peuplements âgés de type futaie principalement. Les biotopes favorables aux rapaces forestiers sont décrits dans la littérature (GEROUDET, 1965; GENSBOL, 1988; Anon., 1993).

Les 23 territoires recensés se répartissent en 4 types:

**Forêt de feuillus**

Chêne vert (*Quercus ilex*)

9

**Forêt mixte de conifères**

Pin maritime (*Pinus pinaster*)

et Pin laricio (*Pinus nigra* subsp. *laricio*)

10

**Forêt mixte de conifères / feuillus**

Pin maritime / Chêne vert

5

Pin maritime / Pin laricio / Hêtre (*Fagus sylvatica*)

4

Les observations d'Autour à Barcaggio concernent des individus erratiques (non reproducteurs) même si cette espèce est essentiellement sédentaire.

La majorité des territoires (67,9%; N=28) se situent donc en forêt mixte de *Pinus* sp., *Quercus ilex* et *Fagus*. Cette tendance est également vérifiée dans la région de Carso Triestino (Italie) où les pinèdes mixtes ou pures de laricio représentent 72,5% des territoires (N=10) (BENUSSI *et al.*, 1984). En Italie l'Autour fréquente également de préférence les forêts à *Picea*, *Pinus*, *Larix*, *Quercus* et *Fagus* (BENUSSI in BRICHETTI *et al.*, 1992). Les données concernant cette sous-espèce cyrno-sarde en Sardaigne indique qu'elle y occupe aussi les formations à *Quercus ilex* et *Pinus* spp. (MURGIA *et al.*, 1988).

D'après la répartition de ses biotopes préférenciels (futaies pures et futaies avec taillis de *Quercus* sp., de *Pinus* spp. et de *Fagus* en Corse; Anon., 1985), et une superficie par territoire d'Autour d'environ 28 km<sup>2</sup>, l'Autour occupe très certainement 27 autres forêts similaires de grande superficie (forêts domaniales ou comunales) et 30 territoires éventuels de mosaïque de petites forêts. La population d'Autour des Palombes en Corse est donc estimée à 50-80 couples. Une superficie de 28 km<sup>2</sup> correspondrait à un bonne densité en Corse puisque "les densités optimales relevées en France durant l'enquête FIR-UNAO 1979-1982 sont d'un couple pour 2.700 à 3.500 Ha (THIOLLAY, 1984). L'effectif est tout à fait comparable à celui de la Sardaigne, qui est estimé à 50-70 couples (SCHENK, 1995). En Corse, 89,3% des territoires recensés sont situés en forêts soumises au régime forestier.

L'aire mondiale de répartition de l'Autour des Palombes (*A. g. arrigonii*), c'est à dire uniquement la Corse et la Sardaigne, ne compterait que 100-150 couples. Ce faible effectif, qui est de plus séparé géographiquement en deux populations, mérite toute notre attention. L'Autour étant très sensible aux perturbations de son milieu, son statut à l'avenir dépendra de la volonté de prendre en compte cette espèce endémique dans la gestion forestière. Une politique de conservation de ce patrimoine sera mise en oeuvre en Corse, en collaboration avec les services de l'Office National des Forêts.

## CONCLUSION

Avec un effectif estimé de 50-80 couples, d'après la diversité des territoires recensés, l'Autour des Palombes est présent dans les principales Forêts Domaniales et Communales soumises au régime forestier ainsi que dans des forêts annexes. L'Autour "corse" étant une sous-espèce endémique cyrno-sarde, le contrôle de la population reste une priorité.

Il conviendra donc de compléter la base de données. Afin d'avoir une idée plus représentative de la répartition de l'Autour des Palombes en Corse (sous-espèce cyrno-sarde), un effort de prospection sera maintenu dans les années à venir, ceci grâce à une collaboration avec l'Office National des Forêts (acteur principal des forêts en Corse) suite à la formation et une sensibilisation de ses agents. Il sera important de centraliser régulièrement les données recueillies auprès des observateurs potentiels.

## Remerciements

Nous tenons à remercier J.-C. THIBAULT pour le suivi scientifique, les conseils et la relecture du document, N. BECK, G. BONACCORSI, M. BOURON, F. MOUGEOT, O. PATRIMONIO, T. ROSSI et J. TORRE pour leurs observations, ainsi que l'Office National des Forêts pour le prêt des cartes de peuplements. Cette étude a bénéficié d'un financement conjoint de l'Office de l'Environnement de la Corse et du Ministère de l'Environnement (DIREN de Corse).

## Références

- Anon. 1985 *Carte des types de peuplement de la Corse* (échelle: 1/200.000). Inventaire Forestier National.
- Anon. 1993 *Aménager les milieux fréquentés par les rapaces diurnes de plaine*. G.E.R.E.A. Université de Bordeaux I. 66 p.
- BENUSSI E. & PERCO F. 1984 Osservazioni eco-etologiche sull'Astore (*Accipiter gentilis gentilis*) nel Carso Triestino. *Gli Uccelli d'Italia*, 9 (12): 3-25.
- BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P. & BALETTI N. 1992 Astore (*Accipiter gentilis*). *Fauna d'Italia*. Ucelli I. Calderini: 550-557.
- CERASOLI M. & PENTERIANI V. 1992 Effectiveness of censusing woodland birds of prey by playback. *Avocetta*, 16: 35-39.
- DEL HOYO J., ELLIOTT A. & SARGATAL J. 1994 Northern Goshawk (*Accipiter gentilis*). *Handbook of the birds of the World*. Volume 2. Bird Life International, Lynx Edicions.
- GEROUDET P. 1965 *Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe*. Delachaux & Niestlé. 426 p.
- GENSBOL B. 1988 *Guide des rapaces diurnes*. Delachaux & Niestlé. 383 p.

- KENNEDY P.L. & STAHLER D.W. 1993 Responsiveness of nesting northern goshawks to taped broadcasts of three conspecific calls. *J. Wildl. Manage.*, 57 (2): 249-257.
- MURGIA C., MONNI A. & MARRAS G. 1988 Primi dati sulla riproduzione dell'Astore (*Accipiter gentilis arrigonii*) in Sardegna, con note sulla sua distribuzione e consistenza nella provincia di Cagliari. *Riv.It.Orn.*, 58: 1-7.
- PATRIMONIO O. 1985 Observations sur les rapaces non rupestres de Corse (année 1984). *Tr.Sc. du P.N.R.C. et des R.N. de Corse*, 1 : 17-18.
- PATRIMONIO O. 1991 Inventaire de l'avifaune de Castagniccia (Ampugnani et Orezza). *Tr.Sc. du P.N.R.C. et des R.N. de Corse*, 31 : 55-75.
- SCHENK H. 1995 Status faunistico e di conservazione dei vertebrati (*Amphibia, Reptilia, Aves, Mammiferi*) riproductibili in Sardegna, 1900-93: contributo preliminare. *Studio, gestione e conservazione della fauna selvatica in Sardegna*, 41-96. Atti del 1° Convegno Regionale sulla fauna selvatica in Sardegna, Oristano, 1993.
- SEGUIN J.-F. non publ. Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*): essais de prospection sur quelques forêts. P.N.R.C., décembre 1994.
- SEGUIN J.-F. non publ. Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*): prospection de forêts de Haute-Corse (suite). P.N.R.C., mai 1995.
- THIBAUT J.-C. 1983 *Les oiseaux de Corse. Histoire et répartition aux XIX et XX siècles*. Parc naturel régional de Corse, Ed. Gerfau. 255 p.
- THIBAUT J.-C., PATRIMONIO O. & TORRE J. 1992 Does the diurnal raptor community of Corsica (Western Mediterranean) show insular characteristics? *Journal of Biogeography*, 19: 363-373.
- THIOLLAY J.-M. 1984 *Enquête FIR-UNAO. Estimation des effectifs de rapaces nicheurs diurnes et non rupestres en France*. Ministère de l'Environnement. Direction de la Protection de la Nature: 1-36.
- VIDAL P. non publ. Autour des Palombes: test d'une nouvelle méthode de prospection et premiers résultats en Haute-Corse. P.N.R.C., décembre 1993.
- YEATMAN-BERTHELOT D. et JARRY G. 1995 *Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France*. Société Ornithologique de France, Paris.

**COMPLEMENT A L'AVIFAUNE**  
**DE LA BASSE VALLEE DE LA GRAVONA**  
**ET DU PRUNELLI**

par

Gilles BONACCORSI

Immeuble Azalée  
Chemin de Biancarello  
Résidence Biancarello  
20090 AJACCIO

## I INTRODUCTION

Il s'agira en la matière d'une réactualisation concernant 165 espèces parmi celles ayant été mentionnées dans la basse vallée de la Gravona : Capo di Feno, pont d'Ucciani, Isolella (zone I) telle que précédemment définie (BONACCORSI 1994). Cette mise à jour traitera des données recueillies entre le 1 août 1994 et les 29 février 1996. S'y ajouteront quelques correctifs au regard du travail précédent et quelques données anciennes méritant d'être citées.

S'agissant en particulier de Capitello, on relèvera que malgré un incendie survenu en août 1994 ayant détruit une partie de la végétation en limite sud de l'embouchure du Prunelli et de la Gravona, une partie de la végétation fut remplacée dès l'automne. Un autre incendie détruisit en octobre 1994 la quasi totalité de la végétation du marais de Casavone, elle fut totalement régénérée au printemps 1995. En juillet 1995 une partie de la jonçaille y fut détruite par la constitution d'une "voie d'eau" assez large pour éviter peut être l'immersion d'une portion du site aux alentours. En décembre 1995, une partie des ronciers à l'embouchure des deux cours d'eau fut détruite, et enfin une partie plus grande le fut en février 1996.

Au plan ornithologique en 1994 lors du passage postnuptial pour la première fois le mois d'octobre permit d'observer plus d'espèces que celui de septembre. Les mois de mai, juin, juillet août et novembre 1995 furent les plus importants en nombre d'espèces comptabilisés depuis le début des observations dans cette localité, de même pour le mois de février 1996.

Au printemps 1995, le passage des limicoles fut plus faible qu'à l'accoutumée, par contre le passage des anatidés fut important, et ce tant lors du passage pré-nuptial que postnuptial, enfin furent relevés plusieurs records d'arrivées pour différentes espèces. A relever un total de 70 espèces en un jour, le 29 avril 1995 constituant un record à Capitello.

Au 29 février 1996 au total 239 espèces avaient été notées à Capitello, et 267 en micro-région. Lors de l'année 1994 (1 janvier / 31 décembre) 166 espèces furent observées mais 172 en 1995 (1 janvier / 31 décembre) et 78 en 1996 (seulement entre le 1 janvier et le 29 février).

## II METHODE D'ETUDE

Un nombre régulier de sorties fut effectué à Capitello (N = 51 en 1994 1 août - 31 décembre ; N = 159 en 1995 entre le 1 janvier et le 31 décembre et N = 27 entre le 1 janvier et le 29 février 1996).

Durant chacune d'elles une à deux périodes d'observations d'au moins une heure chacune intervint (au minimum). De plus les autres sites furent également visités.

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <u>1994</u> | A = 11 sorties ; 60 espèces |
|             | S = 13 sorties ; 80 espèces |
|             | O = 10 sorties ; 83 espèces |
|             | N = 9 sorties ; 68 espèces  |
|             | D = 8 sorties ; 58 espèces  |

|             |                              |                             |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| <u>1995</u> | J = 12 sorties ; 64 espèces  | J = 12 sorties ; 65 espèces |
|             | F = 8 sorties ; 63 espèces   | A = 15 sorties ; 75 espèces |
|             | M = 17 sorties ; 103 espèces | S = 13 sorties ; 88 espèces |
|             | A = 17 sorties ; 128 espèces | O = 13 sorties ; 80 espèces |
|             | M = 15 sorties ; 96 espèces  | N = 12 sorties ; 75 espèces |
|             | J = 12 sorties ; 55 espèces  | D = 13 sorties ; 65 espèces |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <u>1996</u> | J = 11 sorties ; 55 espèces |
|             | F = 16 sorties ; 77 espèces |

### III RESULTATS OBTENUS

Nous avons réalisé toutes les mentions pour lesquelles aucun nom d'observateur ne fut précisé.

#### GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

Depuis l'hiver 1992/1993, les plus fortes concentrations hivernales à Capitello atteignent jusqu'à 10 et même 15 spécimens simultanément.

#### GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

Après une absence d'hivernage depuis l'hiver 1992/1993 ; en zone I, un fut noté à Capitello du 18 décembre 1994 au 1 janvier 1995. Puis en mer près de Capitello 1 le 11 mars ; 1 le 25 mars , 2 le 26 mars et 1 le 10 décembre 1995. Enfin un à Capitello du 9 au 28 février 1996.

#### GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

Nouvel hivernage dans le port de l'amirauté à Ajaccio : 1 du 21 janvier au 9 février 1995. Pas d'hivernage fin 1995/début 1996.

#### GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

A relever un passage remarquable en 1994 et 1995 à Capitello : en 1994, 1 du 13 août au 3 septembre et 2 le 17 et 18 septembre puis 1 le 22 octobre ; enfin B. RECORBET en observa 2 le 17 décembre 1994 dans le port d'Ajaccio. En 1995 : 1 en plumage nuptial le 30 juillet aux gravières de Baléone. A Capitello, 1 du 29 septembre au 6 octobre et 1 du 11 novembre au 7 décembre mais il fut réobservé les 5 et 7 janvier 1996, premier cas d'hivernage en zone I. On relèvera 1 noté par M. PHILIPPE aux gravières de Baléone le 26 mars 1986.

#### PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

Un dans le golfe d'Ajaccio noté depuis Capitello le 2 janvier 1995, premier cas d'hivernage en Corse. Le 7 octobre 1995, 4 observés dans le golfe également visibles depuis Capitello. De plus "plusieurs groupes" le 3 août 1981 dans le golfe d'Ajaccio notés par ARAGNO in C. VERHEYDEN. A noter concernant les deux espèces de Puffins observées en micro-région, que la plupart des spécimens restent observés depuis le côte et se rapprochent surtout des îles Sanguinaires et de la région Parata - Capo di Feno.

**GRAND CORMORAN** *Phalacrocorax carbo*

Un spécimen le 1 janvier 1995 dans le port d'Ajaccio où il est peu fréquent et 1 y fut noté le 30 avril 1995 (E. CHRISTOPHERSEN) ; 6 le 4 et également 6 le 14 janvier 1995 à Capitello et à Baléone soit un nombre d'hivernant assez important. Enfin un vol de 50 au dessus de Baléone le 11 novembre 1993. Aux gravières de Baléone un le 17 septembre 1995 mention la plus précoce en zone I. Enfin une mention ancienne concernant cette espèce : le 6 septembre 1981 par A. SAUVAGE dans le port d'Ajaccio. Passage dès janvier en 1996 le 21 janvier : 1 à Capitello et 16 à Baléone. Enfin 1 dans le port d'Ajaccio le 10 février 1996.

**BLONGIOS NAIN** *Ixobrychus minutus*

Un juvénile à Capitello le 21 août 1994 et 1 juvénile (le même ?) présent de juillet jusqu'au 2 septembre 1995. B. RECORBET observa un mâle le 6 mai et 1 femelle le 14 mai 1995 à Campo dell'Oro (marais temporaire). Nidification en 1995 de l'espèce en zone I : 1 couple aux gravières de Baléone (1ère nidification sur ce site) et 3 couples à Capitello ; soit avec 4 couples les effectifs les plus importants en une année depuis que cette espèce nidifie et ce en micro-région.

**HERON BIHOREAU** *Nycticorax nycticorax*

Un spécimen à Campo dell'Oro le 4 septembre 1994. Une mention précoce due à B. RECORBET : un au dessus de la base d'Aspretto le 17 mars 1995. A Capitello 80 spécimens le 5 mai 1995 (record insulaire) et 1 en estivage sur ce site la 14 juillet 1995 et 4 en micro-région le 18 août suivant, enfin une mention tardive 3 le 29 octobre 1995.

**HERON CRABIER** *Ardeola ralloides*

Rare à Campo dell'Oro : 1 y est présent du 27 avril au 1 mai 1995 et 1 autre le 27 mai suivant. A ajouter lors des printemps 1994 et 1995 plusieurs mentions à l'embouchure du Prunelli et de la Gravona où il est devenu régulier. Mention ancienne à Capitello 7 le 15 avril 1981 (J. SIGWALT).

**HERON GARDE BOEUF** *Bubulcus ibis*

Un spécimen au marais d'Alzone du 1 au 17 avril 1995, les 7, 8 et 15 avril il fut noté à Capitello et 1 sur le même site le 21 avril 1995 partant vers le nord (dernière donnée due à B. RECORBET). A Capitello 2 du 29 septembre au 3 novembre 1995 (premières données depuis 1980 à cette époque de l'année). Pas d'hivernage.

**AIGRETTE GARZETTE** *Egretta garzetta*

Elle est régulière depuis le printemps 1992 lors du passage pré-nuptial à Campo dell'Oro, avec un record de 9 simultanément au printemps 1994. Sur la zone de Vignetta à relever 1 à 2 notées du 30 avril au 27 mai 1995. Une en vol le 1 avril 1995 au dessus de la base d'Aspretto (notée par B. RECORBET). A relever lors du passage post-nuptial que l'espèce devient plus fréquente : 1 du 2 juillet au 9 septembre 1994 à Capitello et Baléone ; puis 1 à 4 jusqu'au 9 octobre ; hivernage d'1 à 2 suivant les cas à Campo dell'Oro, gravières de Baléone et Capitello et marais d'Alzone jusqu'au 14 avril 1995. Cet hivernage est très récent en micro-région. Après une dernière mention lors du mouvement pré-nuptial le 17 juin 1995 (à Baléone) le passage post-nuptial débute dès juillet ; première mention le 30 juillet avec un record de 8 à Capitello (record à cette époque de l'année) ; l'espèce fut observée sous des effectifs limités (1 à 3) durant tout le mois d'août et par la suite les dernières mentions intervinrent à Capitello le 22 octobre sauf pour 1 à 2 spécimens (2 le 15 décembre 1995) se déplaçant suivant les cas entre Baléone, Capitello et Alzone, en hivernage à noter que le 2 janvier 1996 l'une d'elles était présente à Ajaccio (chemin de Biancarello). Donc hivernage de 2, durant l'hiver 1995/1996, puis 1 seule fut observée après la fin janvier 1996 ; encore 1 à Capitello le 11 février 1996 et 2

le 18 février 1996 et 1 encore présente le 27 février 1996. Enfin à noter 1 aux gravières de Baléone le 4 juin 1995 marquée aux ailes, il s'agit de la première observation d'un tel oiseau en micro-région.

#### HERON CENDRE *Ardea cinerea*

Hivernage désormais annuel en zone I (1 à 6 spécimens) ; record de 12 en hivernage en 1994/1995. Un immature fut noté à Ajaccio, résidence Biancarello du 11 octobre 1994 au 12 juin 1995 avec un adulte le 8 mai et un autre du 28 mai au 6 juin 1995, enfin sur le même site 1 immature du 3 octobre au 13 octobre 1995. A relever au pont d'Ucciani 2 le 3 novembre 1994 et 1 le 2 février 1995. A Capitello effectifs remarquables de 23 le 8 octobre 1994 et 28 le 10 mars 1995. Estivage en micro-région de 2 spécimens en 1995 ; puis 5 le 12 août 1995, puis passage postnuptial habituel et hivernage en 1995-1996 : record de 14 à Capitello le 7 janvier 1996 (maximum à cette époque de l'année). Passage très précoce dès janvier : le 21 janvier 1996 11 à Capitello et 6 à Baléone (17 en micro-région) ; le 11 février 1996 18 à Capitello et 10 à Baléone : 28 en micro-région. Enfin à relever qu'il existe trois reprises de bagues concernant ce héron dans la région de Capitello et de Campo dell'Oro (2) et aux "abords d'Ajaccio" (1). Deux individus provenaient de Pologne : un bagué le 22 mai 1932 repris le 6 novembre suivant ; 1 bagué le 15 mai 1934 repris de 18 octobre suivant et 1 bagué en Suède le 31 mai 1936 repris le 31 mars 1937. On relèvera enfin plusieurs autres reprises de bagues concernant cette espèce : 1 spécimen bagué en Suède le 10 octobre 1949 fut repris le 21 janvier 1950 en région ajaccienne, de même pour un autre également bagué en Suède le 18 septembre 1957 et retrouvé le 2 février 1958. Enfin également dans ce pays un fut bagué le 13 octobre 1956 et repris en plaine de Péri en janvier 1958 (THIBAUT comm. pers. et centre régional de baguage de la Corse).

#### HERON POURPRE *Ardea purpurea*

Mentions estivales en 1994 à Capitello deux juvéniles du 7 août au 4 septembre et en 1995 un adulte et un immature du 3 juin au 30 juillet. Campo dell'Oro 1 le 6 mai et 2 le 7 mai 1995. Une donnée tardive 1 du 1 octobre au 26 novembre 1995 à Capitello puis à Baléone et 1 autre juvénile vu le 29 octobre 1995 à Baléone.

#### CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

Une à Campo dell'Oro et Capitello le 29 septembre 1995.

#### FLAMANT ROSE *Phoenicopterus ruber roseus*

Un adulte non bagué à Capitello du 3 au 10 juin 1995, mention tardive.

#### OIE CENDREE *Anser anser*

44 à Capitello les 2 et 3 février 1996 (record insulaire). Le 2 février arrivant elles allèrent se poser près de Baléone, et le 3 une fut tuée à Capitello où l'ensemble de la troupe était revenue le matin. En vol le 27 février 1996 passant entre Capitello et la base d'Aspretto : 15 adultes.

#### CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

A relever un passage postnuptial intéressant en 1994 : 3 le 22 octobre ; 1 le 5 novembre ; 3 le 6 décembre et 2 les 17 et 18 décembre. Lors du mouvement prénuptial 1995 : 12 le 11 février mention précoce et deux mentions tardives 1 mâle et 1 femelle le 13 mai 1995 à Capitello (B. RECORBET) et 1 femelle du 14 mai au 26 mai aux gravières de Baléone (constituant les données les plus tardives en micro-région).

**CANARD CHIPEAU** *Anas strepera*

Une mention ancienne, 1 mâle en vente au marché d'Ajaccio le 17 février 1910 (PARROT 1911 in THIBAUT 1978) et premières données postnuptiales en zone I : 1 mâle à Capitello le 30 octobre 1994 et 4 mâles et femelles le 3 décembre 1995 (sur le même site). A Capitello enfin 6 mâles et femelles le 27 février 1996.

**SARCELLE D'HIVER** *Anas crecca*

A Capitello un passage postnuptial remarquable en 1994 avec les mentions les plus précoces depuis 1980 : 2 du 7 au 20 août ; 6 le 27 et 28 août puis 1 du 2 au 30 septembre ; 4 du 16 au 22 octobre ; 2 à 3 du 12 au 19 novembre et 3 le 3 décembre ; 1 le 8 décembre. En 1995 un spécimen blessé hiverna et fut encore observé les 21 et 22 janvier : mais 5 furent observés le 8 janvier. L'hivernage de cette espèce étant irrégulier en zone I. Enfin record : 40 le 12 mars 1995 à Capitello (en zone I) et données précoces : 2 le 5 février 1995 et 4 le 11 février 1995. Et enfin 1 le 1 septembre 1995. Passage postnuptial plus limité en 1995 qu'en 1994 et ce pour l'ensemble des anatidés (sauf pour les canards plongeurs).

**CANARD COLVERT** *Anas platyrhynchos*

En 1994 à Capitello : 2 à 4 du 6 au 14 août ; 1 le 10 septembre ; 1 le 23 octobre et 1 le 11 novembre. Malgré l'absence de nidification locale l'espèce fut observée en été 1995 : 7 le 30 juillet à Capitello.

**CANARD PILET** *Anas acuta*

Une femelle le 10 septembre 1994 à Capitello, donnée la plus précoce depuis 1980. Chiffre remarquable de 35 le 15 mars 1995 à Capitello.

**SARCELLE D'ETE** *Anas querquedula*

Fort passage pré-nuptial en 1995 avec un effectif cumulé de 2345 individus à Capitello entre le 3 mars et le 15 avril avec des maxima de 200 le 8 avril (record pour un mois d'avril) : 504 le 19 mars ; 727 le 20 mars ; 200 le 24 mars ; 503 le 25 mars et 251 le 26 mars. A relever une seule donnée aux gravières de Baléone le 19 mars. Enfin une mention postnuptiale 2 à Capitello le 16 juillet 1995 alors que cette espèce est rare à cette époque.

**CANARD SOUCHET** *Anas clypeata*

Rare à l'automne et en hiver, à Capitello en 1994 ; 1 les 2 et 3 septembre ; 3 le 30 septembre ; 1 le 22 octobre ; 1 le 4 décembre. En 1995, 1 le 1 septembre et 6 le 15 septembre. En 1995 4 le 26 février soit une observation très précoce (B. RECORBET). A relever 50 le 3 mars et 49 le 20 mars ; enfin 82 le 26 mars et une mention tardive ; 1 mâle le 14 mai 1995 également à Capitello.

**NETTE ROUSSE** *Netta rufina*

Nouvelle espèce en zone I : 1 mâle et 1 femelle le 30 avril 1995 à Capitello.

**FULIGULE MILOUIN** *Aythya ferina*

Mentions précoces à Capitello en 1994 ; 1 femelle du 26 au 28 août ; à relever 6 le 22 octobre suivant. Record à Capitello 29 le 18 mars 1995. A noter à Vignetta, site peu fréquenté par les canards 1 mâle les 6 et 7 novembre 1993 hybride : *Aythya fuligula* X *Aythya ferina*. A noter à Capitello un record de 15 mâles et femelles le 11 novembre 1995 et 17 mâles et femelles le 12 novembre suivant. Mention la plus précoce en zone I : 1 le 3 février 1996.

**FULIGULE NYROCA** *Aythya nyroca*

Un mâle noté à Capitello le 22 mars 1995 et mentions estivales exceptionnelles sur le même site d'une femelle les 29 et 30 juillet 1995.

**FULIGULE MORILLON** *Aythya fuligula*

Espèce de plus en plus irrégulière ; 10 le 22 mars 1995, constituant une mention très remarquable à Capitello et 1 mâle fut noté le 12 novembre 1995 sur ce même site et 12 mâles et femelles les 3 et 15 décembre suivant au même endroit.

**HARLE HUPPE** *Mergus serrator*

Une femelle à Capitello le 19 novembre 1994 et à la base d'Aspretto mention la plus tardive : 1 mâle immature le 12 mai 1995 (B. RECORBET). Enfin 1 femelle à Capitello le 15 décembre 1995.

**BONDREE APIVORE** *Pernis apivorus*

Une observée aux gravières de Baléone le 23 avril 1995 constituant le date la plus précoce en zone I ; enfin 1 près de la gare de Caldaniccia le 26 mai 1995. Une notée près de Pisinale le 31 mai 1986 (S. NICOLLE).

**MILAN ROYAL** *Milvus milvus*

A relever à Ajaccio l'espèce peut désormais être notée toute l'année : résidence Biancarello 3 le 17 février et 4 le 25 mars 1995. Aux Milelli 3 le 6 octobre et 4 le 24 octobre 1994 (B. RECORBET). Record à la décharge de Saint Antoine de 6 le 3 juin 1995 et 6 à Capo di Feno le 4 novembre 1995 et 7 le lendemain au même endroit. A relever à Capitello où il est rare 1 le 11 mars 1995 et 1 le 6 mai suivant puis 1 le 8 et 1 le 16 septembre 1995 et 2 le 31 décembre 1995 (date la plus tardive sur ce site). Enfin à Vignetta 1 le 25 mars 1995 et au camping Benista (Rotolo) 1 le 7 mai ; 2 le 28 mai et 2 le 5 juin 1995 et 1 à la C.C.A.S. le 15 juillet 1995. A noter enfin 1 le 28 octobre 1995 à Campo dell'Oro et à Capitello, 1 le 16 février 1996 et 1 le 24 février 1996.

**BUSARD DES ROSEAUX** *Circus aeruginosus*

Mentions remarquables : 1 aux Milelli le 27 septembre 1994 (B. RECORBET). 1 à Campo dell'Oro le 13 mai 1995 et à Capitello 1 du 20 mai au 10 juin 1995. A noter une donnée tardive lors du mouvement postnuptial 1995 : une femelle le 22 octobre.

**BUSARD PALE** *Circus macrourus*

Jamais observé en zone I entre 1980 et 1995. Un spécimen fut noté "entre Ajaccio et Sagone au XIX ème siècle" (GIGLIOLI 1890 in THIBAUT 1983) donc en limite de la zone d'étude.

**EPERVIER D'EUROPE** *Accipiter nisus wolstertorffi*

A Capitello 1 le 10 septembre 1994 et 1 le 10 octobre 1995 ; un en plaine de Péri le 10 décembre 1994. Enfin B. RECORBET note 1 spécimen aux Milelli le 6 octobre 1994. L'ensemble des données se réfèrent à des jeunes femelles.

**BUSE FEROCÉ** *Buteo rufinus*

Nouvelle espèce pour la Corse, une observée aux gravières de Baléone le 3 septembre 1995.

**BALBUZARD PECHEUR** *Pandion haliaetus*

Un ou deux (?) en micro-région (jamais plus d'un simultanément à Capitello) jusqu'à l'automne 1994 et hivernage complet (à Capitello un jusqu'au 29 janvier 1995) ; puis aucun jusqu'au 5 mars ; aucune donnée n'est intervenue et ce jusqu'au 1 avril, puis 1 du 11 au 15 juin. Ces rares

observations tranchent avec la régularité de l'espèce depuis 1991 durant toute l'année. A relever un le 23 octobre 1994 sur un lampadaire au bord de la route des près de la pointe de Porticcio ; 1 le 15 avril 1995 et un les 21 et 22 juin 1995 dans le port d'Ajaccio ; un à Aspretto dès le 11 août 1995 et encore au delà du 24 octobre. Enfin un individu observé aux gravières de Baléone le 28 mai 1995 (seule mention cette année sur ce site) et à Capitello un le 8 septembre 1995 puis un juvénile non bagué, mentionné entre le 10 et le 22 octobre 1995, enfin à Capitello un du 10 au 16 décembre 1995 et 1 le 21 janvier 1996 (un spécimen en hivernage 1995/1996 pour la zone I). A noter à Capitello 1 le 20 février 1996.

#### FAUCON KOBZ *Falco vespertinus*

Une femelle et un mâle notés respectivement les 6 et 7 mai 1995 aux gravières de Baléone où cette espèce est très rare et à Caldaniccia un mâle le 1 mai 1995. Enfin la première mention insulaire remonte à 1930 : 2 le 20 mai à Campo dell'Oro par GLEGG (GLEGG 1936).

#### FAUCON HOBREAU *Falco subbuteo*

Pas de preuve de nidification en 1994 et 1995 mais l'espèce fut observée durant l'été. A Capitello un du 24 juillet au 24 septembre 1994 enfin aux gravières de Baléone le 13 mai 1995 tue une Guifette noire *Chlidonias niger* qu'un Faucon pèlerin *Falco peregrinus* essaya de lui voler. A noter enfin 1 le 20 septembre 1995 à Ajaccio (résidence Biancarello) et un à Suartello vu par B. RECORBET les 5 et 7 juillet 1995.

#### FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonorae*

Deux phases claires le 9 septembre 1994 aux gravières de Baléone (la dernière donnée en zone I remontait à 1989).

#### FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

Séries de nouvelles données concernant des isolés à Capitello le 9 septembre ; le 8 et 9 décembre 1994 ; les 21 et 27 janvier ; 11 mars ; 25 avril ; 15 mai 1995, cette dernière mention se rapportant à un spécimen n'appartenant pas à la sous espèce *F. p. brookei* ; enfin 1 le 30 septembre 1995 et 1 le 14 octobre 1995. En 1996 1 le 28 janvier fut également observé à Baléone (quelques heures plus tard). A Capitello également 1 le 23 février 1996. A Ajaccio (résidence Biancarello) 1 le 11 janvier 1995 et 1 immature venait y tuer une Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* le 14 août 1995 et y était encore présent le lendemain. A Vignetta un noté en décembre 1994 (B. RECORBET). Enfin un observé aux gravières de Baléone le 13 mai 1995 et 1 le 15 décembre 1995. A ajouter un spécimen à Ajaccio venant chasser les Etourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris* entre novembre 1995 et janvier 1996.

#### FAUCON LANIER *Falco biarmicus*

Un immature à Capitello le 3 décembre 1995. Première mention certaine dans l'île.

#### CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

Un mâle chanteur dans la région de Capo di Feno du 3 au 17 juin 1995 ; à Capitello 1 mâle chanteur le 4 juin et 3 mâles le 5 juin 1995 ; aux gravières de Baléone 1 mâle chanteur le 4 juin 1995. A noter en migration précoce 2 le 14 août 1995 à Capitello.

#### COLIN DE CALIFORNIE *Callipepla californica*

Introduit en Corse (PIETRI 1993) une tentative fut effectuée sans succès dans la région de Capo di Feno entre 1963 et 1967.

**COLIN DE VIRGINIE** *Colinus virginianus*

Introduit en Corse (THIBAUT 1983) dans la région d'Appietto en limite de la zone I (sans succès).

**FAISAN DE COLCHIDE** *Phasianus colchicus*

Un mâle près de la route nationale 193 le 27 octobre 1995 (embranchement menant à Carbuccia).

**MARQUETTE PONCTUÉE** *Porzana porzana*

A relever sa présence au marais de Caldaniccia 1 les 23 et 24 mars 1995, puis trois mentions entre le 1 et le 9 avril 1995 (1 à 2) (G. BONACCORSI et B. RECORBET). L'espèce y est à rechercher avec attention, le site étant très favorable pour cet oiseau d'autant que le 24 février 1996 une y était présente. Une à Capitello les 23 et 24 février 1996.

**MARQUETTE POUSSIN** *Porzana parva*

Espèce notée au marais de Caldaniccia (pour la première fois) 1 le 1 avril 1995 (B. RECORBET).

**FOULQUE MACROULE** *Fulica atra*

Mention précoce à Capitello 2 puis 1 du 7 au 27 août 1994 ; 7 le 3 septembre 1994 (record à cette époque). Hivernage faible de 2 spécimens puis 6 le 6 février 1995 et mention remarquable également sur ce site : 2 le 25 mai 1995 et 1 le 23 juillet 1995.

**HUITRIER PIE** *Haematopus ostralegus*

A ajouter 30 individus le 24 mars 1991 à Capitello. En dehors des sites habituels : 2 le 21 mai 1992 sur les rochers route des Sanguinaires (E. LEENHARDT). A Capitello donnée ancienne : 2 le 16 avril 1981 (J. SIGWALT).

**ECHASSE BLANCHE** *Himantopus himantopus*

A Campo dell'Oro 1 femelle du 14 au 29 mai 1994 où l'espèce n'avait pas été observée auparavant. A Capitello 1 du 5 au 26 mai 1995 soit le plus long séjour, enfin à ajouter 1 les 6 et 7 juillet 1991 également sur ce site. A ajouter enfin, 12 à Capitello le 26 mars 1989 (A. DESNOS).

**AVOCETTE ELEGANTE** *Recurvirostra avosetta*

A Capitello, nombre remarquable de 10 le 22 avril 1995. A relever 1 le 11 juin 1980 sur ce même site (J. SIGWALT).

**GLAREOLE A COLLIER** *Glareola pratincola*

Deux notées à Capitello le 4 mai et 1 le 5 mai 1995 (J. CALAS). A noter 2 le 15 octobre 1937 dans la région de Campo dell'Oro (COHEN in THIBAUT 1983), première donnée insulaire.

**PETIT GRAVELOT** *Charadrius dubius*

Aucune nidification en 1994 en zone I ; en 1995 trois couples nichant tous aux gravières de Baléone. A relever 2 le 20 mars 1995 à Campo dell'Oro. A noter 1 le 20 février 1996 à Capitello (arrivée très précoce).

**PLUVIER DORE** *Pluvialis apricaria*

Un spécimen précoce à Capitello le 19 octobre 1994 ; hivernage à Campo dell'Oro (4ème cas depuis 1980) et nombre record (4) hiver 1994/1995 ; 1 à Capitello le 21 janvier 1995 et 1 mars

1995 à Campo dell'Oro. Hivernage en 1995/1996 à Campo dell'Oro ; 1 le 7 janvier 1996 et 1 encore (le même ?) le 18 février 1996.

**PLUVIER ARGENTE** *Pluvialis squatarola*

L'année 1995 fut exceptionnelle pour cette espèce rare en micro-région. Toutes les mentions furent réalisées à Capitello : 1 immature du 30 avril au 2 mai ; puis un adulte le 12 mai puis un autre adulte du 12 au 14 août. Il n'y avait plus d'observations depuis 1992.

**VANNEAU HUPPE** *Vanellus vanellus*

A Capitello un maximum lors de l'hiver 1994/1995 : 60 le 28 janvier 1995 et à Campo dell'Oro 217 le 22 janvier 1995. Lors de l'hiver 1995/1996 à Capitello - Campo dell'Oro : 80 le 7 janvier 1996 et 81 le 17 février 1996 et 103 le 18 février 1996. A Capo di Feno 12 le 16 janvier 1996.

**BECASSEAU MINUTE** *Calidris minuta*

Un à quatre en avril et mai 1994 à Campo dell'Oro constituaient les premières mentions sur ce site. Une donnée tardive à Capitello le 3 juin 1995 ; l'espèce fut ensuite observée entre le 29 juillet et le 2 août 1995 et 1 à 4 furent notés ; record de 8 le 13 août 1995 lors du mouvement postnuptial après un record de 12 le 8 avril 1994. Dates les plus tardives en micro-région 3 les 23 et 24 septembre 1995. On relèvera enfin une observation ancienne à Capo di Feno 1 le 20 septembre 1981 (J. SIGWALT).

**BECASSEAU COCORLI** *Calidris ferruginea*

Très exceptionnel lors du mouvement postnuptial en micro-région, 1995 fut l'année du plus fort passage. A Capitello : 1 le 31 juillet ; 1 les 4 et 5 août puis 4 le 13 août. De plus au printemps à noter 10 spécimens les 6 et 7 mai 1995 également à Capitello.

**BECASSEAU VARIABLE** *Calidris alpina*

Aucune mention prénuptiale en micro-région en 1995. A Capitello 2 puis 1 du 6 août au 4 septembre 1994 et 1 du 1 au 22 octobre 1994 et en 1995 : 1 à 2 du 8 au 26 août.

**COMBATTANT VARIE** *Philomachus pugnax*

Espèce irrégulière à Campo dell'Oro notée au printemps 1994 ; puis 4 le 7 mai 1995. A Capitello une donnée précoce : 1 le 30 juillet 1995. Une donnée du 20 mai 1995 est sur ce site la date la plus tardive en micro-région.

**BECASSINE SOURDE** *Lymnocyptes minimus*

Mention précoce à Capitello 1 le 6 novembre 1994 et une y fut observée le 19 février 1995. Dans le marais de Caldaniccia B. RECORBET observa 2 spécimens le 23 mars ; 1 les 24 et 25 mars et 1 le 1 avril 1995.

**BECASSINE DES MARAIS** *Gallinago gallinago*

Au marais d'Alzone 1 le 20 février 1994 et 2 le 4 avril 1995 et 1 le 14 avril suivant. A Campo dell'Oro : 1 le 7 mai 1994.

**BECASSINE DOUBLE** *Gallinago media*

Espèce très rare à Capitello : une le 2 avril 1995.

**BARGE A QUEUE NOIRE** *Limosa limosa*

Le passage en micro-région est désormais plus faible : 1 observation en 1994 et 4 en 1995, sans raison apparente.

**COURLIS CORLIEU** *Numenius phaeopus*

A ajouter un record insulaire : 30 à Capitello le 31 mars 1991.

**CHEVALIER ARLEQUIN** *Tringa erythropus*

Rare en micro-région : 1 à Capitello le 28 avril 1995.

**CHEVALIER GAMBETTE** *Tringa totanus*

Records à Capitello de 13 le 28 avril et 14 le 29 avril 1995 ; très rare lors du mouvement postnuptial sur ce site : un fut observé les 14 et 16 juillet et 1 le 30 juillet 1995 et 1 le 4 août suivant (peut-être s'agissait-il du même spécimen ?). A noter à Capitello 1 le 3 juin 1981 (J. SIGWALT).

**CHEVALIER STAGNATILE** *Tringa stagnatilis*

Espèce irrégulière : à Capitello un le 28 avril 1995 et 1 le 30 avril 1995.

**CHEVALIER ABOYEUR** *Tringa nebularia*

A Capitello par exception passage important en 1994 lors du mouvement postnuptial : 1 le 31 juillet puis 1 à 2 du 8 au 19 septembre suivant. Dates très tardives : 1 à Capitello puis à Baléone le 24 septembre 1995.

**CHEVALIER CUL BLANC** *Tringa ochropus*

Record insulaire : 21 aux gravières de Baléone le 8 avril 1995. A Capitello : 1 à 2 du 8 juillet au 25 août 1995, pas d'estivage aux gravières de Baléone, premier spécimen au passage le 6 août 1995. A Capitello données très tardives 1 le 22 octobre et 1 le 10 novembre 1995 et 2 le 22 décembre 1995.

**CHEVALIER SYLVAIN** *Tringa glareola*

A Capitello mentions estivales en 1995, 2 y furent notés le 13 et 1 le 19 août. L'espèce reste peu fréquente en août en micro-région.

**CHEVALIER GUIGNETTE** *Actitis hypoleucos*

Aucune nidification en zone I en 1994 et 1995 alors qu'un couple avait niché en 1993. A Ajaccio, port de l'amirauté 1 le 13 mai 1995 et à relever 10 à Capitello le 29 avril et le 12 mai 1995. Anse de Minaccia plusieurs observations de cette espèce dues à J. CALAS : 5 le 30 août et 1 le 31 août 1993 puis 5 le 4 mai 1995. Mention exceptionnelle 1 le 12 décembre 1995 à Pévani (B. RECORBET).

**GRAND LABBE** *Stercorarius skua*

Dans le golfe d'Ajaccio 1 le 7 septembre 1992 (B. KERDELHUE *in litt* ; J.C. THIBAUT comm. pers.) et un observé à quelques distances d'Ajaccio le 2 ou le 3 août 1978 (V. BRETAGNOLLE *in litt.* ; J.C. THIBAUT comm. pers.).

**MOUETTE MELANOCEPHALE** *Larus melanocephalus*

Lors du mouvement pré-nuptial en mer près de Capitello : 80 le 18 mars et 60 le 26 mars 1995. Puis une série de mentions exceptionnelles : 1 immature le 19 mai ; 1 immature (la même ?) du 23 juillet au 25 août 1995 sur ce même site. Pas d'hivernage en zone I durant l'hiver 1995/1996. 60 adultes le 18 février 1996 à Capitello (donnée précoce) et 1 immature dans le port d'Ajaccio le 24 février 1996.

**MOUETTE PYGMEE** *Larus minutus*

Un spécimen immature le 16 octobre 1994 à Capitello. A remarquer 1ère donnée insulaire 1 le 26 octobre 1909 aux Sanguinaires (THIBAUT comm. pers.).

**MOUETTE RIEUSE** *Larus ridibundus*

Selon les cas à Capitello, sur la base d'Aspretto et jusque dans le port d'Ajaccio une immature en mai 1995 puis de 2 à 4 en juin dès le 24 et en juillet l'espèce est présente avec des effectifs oscillant entre 1 et 6 spécimens (le 23 et le 31), en août 1 à 7 (7 le 20) démontrant une tendance décelée depuis quelques années à être présente toute l'année en non plus seulement en hivernage. Une le 3 septembre 1995 aux gravières de Baléone où elle est peu fréquente. 3 y étaient le 28 janvier 1996 et 1 le 11 février 1996. A noter en hivernage un nombre remarquable dans le port d'Ajaccio de 410 en janvier 1980 (BRUNSTEIN et THIBAUT 1980). A Capitello le 5 janvier 1996 : record 220 spécimens pour ce site.

**GOELAND RAILLEUR** *Larus genei*

Record de 17 le 30 avril 1995 à Capitello et sur ce même site donnée tardive : 3 le 11 juin 1995.

**GOELAND D'AUDOUIN** *Larus audouinii*

Premières mentions depuis 1980 d'un juvénile à Capitello le 8 juillet 1994 et le 10 septembre suivant, après la nidification réussie à Aspretto où 10 couples nichèrent en 1994 et 15 couples en 1995. En 1994, la dernière donnée intervint le 5 novembre, pas d'hivernage. Cependant des mentions tardives furent constatées de longue date, ainsi 1 spécimen dans le golfe d'Ajaccio le 10 novembre 1979 (BRUNSTEIN et THIBAUT 1980). Puis l'espèce fut réobservée le 26 février 1995 à Capitello, et également en février ailleurs en micro-région. Le 2 avril 1995, 2 furent notés à la Parata. Des spécimens paradant et s'accouplant furent observés à Capitello les 23 avril et 6 mai ; le 28 avril fut observée sur la plage la récupération de matériaux. Le 7 mai un adulte fut observé allant en plaine de Péri puis revint aux gravières de Baléone avant de repartir en mer. A noter de plus un spécimen bagué présent du 19 mai au 3 septembre 1995 à Capitello et à deux reprises il fut observé à la base d'Aspretto (les 26 et 29 juillet B. RECORBET). Enfin dans le port d'Ajaccio (amirauté) 1 adulte fut observé à la recherche de nourriture les 15 et 17 juin 1995. Un y avait été noté le 30 avril 1995 (E. CHRISTOPHERSEN). En 1995 dernière mention 6 le 15 septembre à Capitello. En 1996 première donnée en micro-région : 1 à Capitello le 23 février.

**GOELAND CENDRE** *Larus canus*

Une seule mention entre juillet 1994 et février 1996 : 1 spécimen 1er hiver le 5 novembre 1994 dans le port d'Ajaccio.

**GOELAND BRUN** *Larus fuscus*

Un noté à Capitello le 28 mars 1995 (B. RECORBET) seule mention durant cette période.

**GOELAND LEUCOPHEE** *Larus cachinnans*

Nouveau record à Capitello : 450 le 26 mars 1995 et 350 à Baléone le 18 juin 1995.

**GOELAND MARIN** *Larus marinus*

Une mention sujette à caution : 1 près d'Ajaccio le 18 février 1944 (WARE , THIBAUT comm. pers.).

**STERNE CAUGEK** *Sterna sandvicensis*

Chiffres remarquables : 15 le 19 novembre 1994 ; 14 le 29 octobre 1994 et 12 le 11 février 1995 à Ajaccio (port de l'amirauté) ; 9 le 24 octobre 1995 à Aspretto. Données tardives : 1 le 10 juin 1995 à Capitello. A relever en zone I : 9 le 15 avril et 1 le 16 avril 1981 (J. SIGWALT) et près de la Parata 13 à 15 le 19 janvier 1982 (I. GUYOT).

**STERNE NAINÉ** *Sterna albifrons*

Après aucune donnée depuis 1992, une mention en 1995 à Capitello : 1 le 26 mai, soit la donnée la plus tardive en zone I. Plage d'Agosta à noter 2 le 4 mai 1991 (J.Y. FREMONT et Y. BERTHAULT).

**GUIFETTE NOIRE** *Chlidonias niger*

Record lors du mouvement prénuptial : 18 le 13 avril 1995 à Capitello puis observées aux gravières de Baléone et 1 le 10 août 1994 à Baléone (date précoce).

**PETIT PINGOUIN** *Alca torda*

Nouvelle espèce pour la micro-région. 3 collectés en octobre 1910 et 1 en février 1912 dans le golfe d'Ajaccio par F. CANESI (THIBAUT comm. pers.) et 1 immature les 17 et 18 décembre 1994 dans le port d'Ajaccio (B. RECORBET et BONACCORSI).

**PIGEON COLOMBIN** *Columba oenas*

A Capitello 3 observés le 8 octobre 1994 et 1 les 23 et 24 septembre puis 1 le 10 octobre et 1 le 3 novembre 1995.

**PIGEON RAMIER** *Columba palumbus*

Nouvelles mentions à Capitello : 2 le 8 octobre 1994 et 250 le 12 novembre suivant et 16 le 14 octobre 1995 ; 60 le 3 novembre 1995, 1 le 5 et 1 le 18 novembre suivant.

**TOURTERELLE TURQUE** *Streptopelia decaocto*

Cette espèce remarquable continue son expansion (cartes en annexe : 1 - 3) mais de manière plus limitée. 6 sont présentes le 8 octobre 1994 à l'embranchement entre la route de la Parata et celle aboutissant à Capo di Feno. Le même jour une était présente sur l'une des dernières maisons aux abords de Capo di Feno et une y était également présente le 17 juin 1995 ; (colonisation effectuée en 1994). Dans la région d'Ajaccio expansion au niveau des quartiers Saint-Joseph, l'espèce est présente en 1994 et 1995 aux abords de la base d'Aspretto au niveau des installations abritant les C.R.S. notamment, dès avril 1995 et encore en novembre, elle se pose sur les lampadaires de la route à la sortie de la ville. Le 29 juillet 1995 une était présente à la base d'Aspretto, 1 autre le 30 juillet suivant au même endroit. L'espèce est présente jusqu'au niveau de l'hôtel Campo dell'Oro se posant sur les lampadaires de la route devant cet hôtel le 15 juillet, le 30 juillet et 2 le 20 août 1995, ce sont les premières mentions à ce niveau. Les déplacements continuent vers le sud : le 31 mars 1995 deux survolent Capitello venues du N-NW allant à la C.C.A.S. ; même chose pour 1 le 29 juillet 1995. Elle est présente à la C.C.A.S. et régulière à Capitello où jusqu'à 5 à 6 furent notées de mai à août 1995 et 15 le 15 septembre et 17 le 16 septembre constituant des records locaux, encore 10 le 5 novembre (les spécimens étant nourris à l'hôtel de Casavone), et un couple y nidifia. En 1994 la dernière donnée intervint le 27 novembre et en 1995 la première le 11 février, elle y fut notée jusqu'au 31 décembre 1995 (premier cas d'hivernage) et y était encore en janvier et février 1996 (maxima 6 le 16 janvier et 6 à plusieurs reprises en février). Présente à Marina Viva, près du centre équestre 12 y furent observées, le 24 août 1994 et le 2 octobre 1994. Désormais plus visible à Porticcio, aux hameaux de Porticcio et jusqu'aux Molini des spécimens se reposent même dans les arbres du marais d'Alzone (3 le 8 avril 1995). Le 25 août 1995 une chante à Pietrosella et 1 aux gravières

de Baléone le 19 août 1995. L'effectif de la zone I est à présent plus difficile à estimer mais au minimum il doit être compris entre 500 et 1000 individus. Plus au sud, en 1994 elle est arrivée au niveau de la plage "Mare et Sol" près du pénitencier de Coti Chiavari où elle était absente en 1993. A noter 1 enfin le 21 octobre 1995 à Vignetta et 1 le 2 décembre 1995 sur le même site ; 1 le 15 décembre 1995 sur un lampadaire face à hôtel de Campo dell'Oro. A noter enfin 3 près du collège de Baléone le 14 janvier 1996 et 1 près de Capo di Feno le 26 janvier 1996 ; 2 le même jour près de l'hôtel Campo dell'Oro sur les lampadaires, 2 au même endroit le 11 février 1996 et 1 à Aspretto le 2 février 1996.

#### COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

Mention tardive, une femelle à Capitello jusqu'au 30 juillet 1995.

#### CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba ernesti*

A Capitello on relèvera plusieurs mentions en 1995. Après la reproduction (jeune erratique sans doute) : 1 le 23 juillet et 1 le 27 août. Puis 1 le 28 octobre et 1 le lendemain puis 1 les 11 et 12 novembre 1995. A signaler qu'une y avait été observée les 24 juillet et 13 août 1994. Enfin à Ajaccio, résidence Biancarello, 1 le 20 août 1995. A relever enfin 1 au pont d'Ucciani le 13 janvier 1996.

#### HIBOU PETIT DUC *Otus scops*

Hivernage d'au moins 2 spécimens de novembre 1994 à mars 1995 à Ajaccio (résidence Biancarello) sur le même site donnée la plus tardive en 1995, 1 le 13 novembre et en 1996 1er chant le 5 janvier.

#### CHOUETTE CHEVECHE *Athene noctua*

Une aux gravières de Baléone le 28 janvier 1996.

#### HIBOU MOYEN *Asio otus*

Espèce rare en micro-région, donnée exceptionnelle 1 le 28 juillet 1995 route de Bomorto en limite de la zone I.

#### MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

Un couple nicheur en micro-région en 1994 mais aucune présence de nicheur en 1995. Un à Ajaccio (résidence Biancarello) le 25 septembre 1994 et 1 à 2 sur le même site du 2 août au 3 septembre 1995 puis 1 du 12 au 20 novembre sur ce même site. Aux Milelli 1 le 6 octobre 1994 (B. RECORBET). Il s'agit d'une nouvelle espèce sur ce site. A noter 1 observé au niveau du ruisseau d'Agosta au village de Molini le 3 août 1991, première mention sur ce site et également une première : 1 à la base d'Aspretto en avril 1995 (B. RECORBET).

#### ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

Espèce difficile à observer, à Capitello un le 3 septembre 1995.

#### MARTINET NOIR *Apus apus*

La mention la plus tardive en zone I : 2 à Capitello le 23 septembre 1995. A Ajaccio B. RECORBET observa 2 à 3 Martinets sp. appartenant probablement à cette espèce le 26 septembre 1995.

#### MARTINET PALE *Apus pallidus*

Espèce jamais notée à Ajaccio : 4 le 25 août 1995 sur ce site (THIBAUT comm. pers.).

**MARTINET A VENTRE BLANC** *Apus melba*

Une donnée tardive pour cette espèce notée en juin 1995 près d'Ajaccio (Suartello, B. RECORBET) et près de Capo di Feno également en juin 1995. 220 à Ajaccio (résidence Biancarello) le 14 septembre 1995 après une journée d'orage (record).

**GUEPIER D'EUROPE** *Merops apiaster*

A relever un très fort passage postnuptial en 1994, le plus fort depuis 1980 dans la région Ajaccio - Mezzavia, Baléone, Capitello d'août au 20 septembre ; 10 à 20 notée au moins chaque jour passant vers le sud. Jusqu'à 40 à 50 le 25 août 1994 à Ajaccio (résidence Biancarello) et au début septembre ; jusqu'à 40 à 50 à Capitello. Le plus grand vol comptant 100 individus notés le 17 septembre à Suartello (B. RECORBET). A noter en 1995 une nouvelle colonie de 3 couples en région ajaccienne. Faible passage postnuptial en 1995, avec un record de 42 le 3 septembre à Capitello. L'espèce est connue de longue date comme nicheuse en micro-région mais y était plus abondante auparavant (JOURDAIN 1912 in THIBAUT 1983). A noter que cette espèce peut être observée dans la régions de la Parata - Capo di Feno (au passage).

**ROLLIER D'EUROPE** *Coracias garrulus*

Rare en micro-région, un adulte près de Pisinale le 17 juin 1995.

**HUPPE FASCIEE** *Upupa epops*

A Capitello 2 le 19 novembre 1994, puis hivernage 1 du 7 janvier au 5 février 1995.

**TORCOL FOURMILIER** *Jynx torquilla tschusii*

Un spécimen en hivernage à Capitello d'octobre 1994 au 23 janvier 1995 et 2 durant l'hiver 1995/1996. L'espèce fut régulière sur ce site tout au long de l'année 1995 mais n'y a pas niché.

**PIC EPEICHE** *Dendrocopos major harterti*

Un à Vignetta le 12 février 1995, première mention en ce lieu de cette espèce en expansion jusqu'en région ajaccienne où elle est régulière notamment dans la zone des Milelli ; un le 17 juin 1995 dans le maquis à quelques distances de Capo di Feno ; en 1995 deux couples nidifièrent aux gravières de Baléone et à Capitello si l'espèce n'a pas niché elle fut notée cependant jusqu'au 25 avril et à partir du 15 juin, un couple ayant niché à quelques distances de Capitello (plus à l'est) y était présent.

**ALOUETTE LULU** *Lulula arborea*

Mention tardive d'un spécimen à Capitello le 25 juin 1995.

**ALOUETTE DES CHAMPS** *Alauda arvensis*

A Capitello 50 le 3 décembre 1995 et 120 le 7 décembre suivant et 150 le 12 décembre, il s'agit là du record local ; soit 50 à 150 durant le mois de décembre 1995 et jusqu'en février 1996.

**ALOUETTE CALANDRE** *Melanocorypha calandra*

Troisième mention en micro-région : 1 le 17 avril 1995 à Capitello.

**ALOUETTE CALANDRELLE** *Calendrella brachydactyla*

Une observation aux gravières de Baléone le 24 avril 1994. Mention tardive, à Capitello 1 le 25 mai 1995 et B. RECORBET observa 1 mâle chanter près de la plage de Campo dell'Oro le 29 mai 1995. Rare lors du passage postnuptial, une à Capitello du 14 au 27 août 1995.

**HIRONDELLE DE ROCHERS** *Ptyonoprogne rupestris*

A Capitello où elle est peu fréquente : 10 le 8 janvier 1995 ; mention la plus tardive : 1 aux gravières de Baléone le 14 mai 1995 (record depuis 1980). A Capitello; 2 le 3 février 1996 et 5 le 20 février 1996 et 7 le 23 février 1996. Aux gravières de Baléone 40 le 25 février 1996.

**HIRONDELLE DE RIVAGE** *Riparia riparia*

Une donnée précoce lors du mouvement postnuptial : 4 à Capitello le 30 juillet 1995, puis aucune donnée en août. Une observation exceptionnelle : 1 le 20 février 1996 à Capitello.

**HIRONDELLE RUSTIQUE** *Hirundo rustica*

Record en micro-région : 1 le 20 février 1996 à Capitello.

**HIRONDELLE ROUSSELIN** *Hirundo daurica*

Rare en micro-région cette espèce y a niché : 1 couple en 1991 dans une buse métallique près de Saint Antoine (LOVATY 1991). A Capitello plusieurs données en 1995 : 1 le 21 mars (B. RECORBET), puis 1 le 1 mai et 1 le 21 mai. A Ajaccio 1 le 26 avril 1995 (résidence Biancarello). Désormais le passage pré-nuptial en zone I se situe entre le 21 mars et le 21 mai.

**HIRONDELLE DE FENETRE** *Delichon urbica*

Première donnée : 5 le 20 février 1996, donnée précoce (à Capitello) puis 1 le 23 février (même site).

**PIPIT DE RICHARD** *Anthus richardi*

1 spécimen (1er hiver) le 1 novembre 1995, à Capitello nouvelle espèce en micro-région. Espèce rarement observée en Corse (THIBAUT 1983).

**PIPIT ROUSSELIN** *Anthus campestris*

Un à Capitello le 9 octobre 1994 (donnée la plus tardive depuis 1980) ; record à l'automne : 12 le 3 septembre 1995 à Capitello.

**PIPIT DES ARBRES** *Anthus trivialis*

Exceptionnel au passage postnuptial en zone I : à Capitello 1 le 25 août et 1 le 2 septembre 1995.

**PIPIT FARLOUSE** *Anthus pratensis*

Record : 35 à Capitello le 28 janvier 1996 (maximum en hivernage en zone I).

**PIPIT A GORGE ROUSSE** *Anthus cervinus*

Important passage pré-nuptial en 1995, record de 11 spécimens le 15 et le 16 avril en zone I et record local de 10 à Capitello le 19 avril (B. RECORBET). L'espèce fut mentionnée à Alzone, Capitello, Baléone et dans le marais de Caldaniccia mais pas dans la région de Campo dell'Oro (tableau 4) ni en région ajaccienne. La période d'observation s'étend désormais : 8 avril - 30 mai. Exceptionnel à l'automne : 1 le 17 septembre 1995 aux gravières de Baléone et 1 du 24 septembre au 28 octobre 1995 à Capitello (probablement le même).

**BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** *Motacilla cinerea*

En 1994 observations à Capitello dès le 27 août (date précoce), en 1995 l'espèce fut observée toute l'année (1 à 4 de juin à août) mais n'y a pas nidifié.

**BERGERONNETTE GRISE** *Motacilla alba*

Un couple nicheur aux gravières de Baléone en 1994 et un sur le même site en 1995.

**ROUGE GORGE** *Erithacus rubecula*

Aucune nidification à Capitello en 1995 mais présence d'un à deux spécimens dont un chantant parfois jusqu'au 25 mai et le 1er à l'automne dès le 16 septembre : date la plus précoce, (auparavant le 17 septembre).

**GORGE-BLEUE** *Luscinia svecica*

A relever à Capitello le long séjour des spécimens lors du passage postnuptial ayant été constaté à plusieurs reprises. Certains individus séjournent plus d'une semaine (maximum 17 jours : 1 femelle du 2 au 18 septembre 1994), lors du mouvement prénuptial la durée peut atteindre une durée équivalente parfois (de 17 jours : 1 femelle du 3 au 19 mars 1995) (tableau 6). Net passage lors du printemps 1995 aux gravières de Baléone et ce encore en avril (entre le 3 mars et le 17 avril) en micro-région. Avec jusqu'à trois individus simultanément à Capitello, même nombre à Baléone et dans le marais de Caldaniccia où B. RECORBET mentionna 2 individus les 23 et 24 mars ; 1 le 25 mars et 3 le 1 avril (tableau 5).

**ROUGE QUEUE A FRONT BLANC** *Phoenicurus phoenicurus*

Rare à Capitello : 1 femelle le 29 avril 1995 et 1 mâle en mue le 16 septembre 1995 (huitième et neuvième mentions sur ce site).

**TARIER D'EUROPE** *Saxicola rubetra*

Mention la plus tardive en micro-région 1 femelle à Capitello le 30 octobre 1994 et espèce rare à Ajaccio (résidence Biancarello) 1 mâle le 26 avril 1995.

**MERLE BLEU** *Monticola solitarius*

Irrégulier à Ajaccio, 1 observé chemin de Loretto sur un immeuble le 25 novembre 1995.

**GRIVE LITORNE** *Turdus pilaris*

Espèce rare : 4 à Capitello le 23 février 1996 et 8 à Campo dell'Oro le 24 février 1996 et 6 le lendemain sur ce site.

**GRIVE MUSICIENNE** *Turdus philomelos*

A Capitello 200 le 22 février 1996 (lors du coup de froid) ; 140 le 23 et 150 le 24 février et 80 le 25 février suivant.

**GRIVE MAUVIS** *Turdus iliacus*

Rare à Capitello 1 le 5 février 1995. Le 5 novembre 1995 à Capitello 3 spécimens, mention la plus précoce en zone I. A Capitello 1 le 23 février 1996 et 1 y est également le 25 février 1996.

**GRIVE DRAINE** *Turdus viscivorus*

A Capitello 1 le 12 février 1995 et 2 le 10 mars suivant. Enfin 1 y fut notée le 9 et le 16 février 1996 et 6 le 22 février 1996 mais 20 le 23 et 15 le 24 février, 8 le 25 février (chiffres records) puis seulement 4 le 27 février et 2 le 28 février. A noter au moins 15 spécimens à Campo dell'Oro les 24 et 25 février.

**CISTICOLE DES JONCS** *Cisticola juncidis*

Pas d'hivernage en zone I mais données précoces 2 mâles à Capitello à partir du 4 février 1996 ; à signaler que le 17 février 1996 un mâle fut noté à Campo dell'Oro.

**LOCUSTELLE TACHETEE** *Locustella naevia*

Une à Capitello le 16 avril 1995 (la seconde mention en zone I depuis 1980).

**LUSCINIOLE A MOUSTACHES** *Acrocephalus melanopogon*

A Capitello présence record de 25 le 11 novembre 1995 (fort passage en novembre 1995, 10 à 20 le plus souvent).

**PHRAGMITE DES JONCS** *Acrocephalus schoenobaenus*

A Caldaniccia 1 le 25 mars 1995 (B. RECORBET). Rare aux gravières de Baléone 1 le 1 mai 1995. Donnée très remarquable pour cette espèce rare à l'automne : 1 le 10 novembre 1995 à Capitello et 1 sur le même site précocement au printemps le 25 et 26 mars 1995.

**ROUSSEROLLE TURDOIDE** *Acrocephalus arundinaceus*

En 1994 et 1995 pas de nidification à Capitello et faible passage pré-nuptial en 1995. Le seul couple ayant niché en micro-région se reproduisit aux gravières de Baléone (en 1995). A Capitello donnée remarquable : 1 le 1 septembre 1995.

**HYPOLAIS ICTERINE** *Hippolais icterina*

Très rare à Capitello : 1 le 13 août 1994.

**FAUVETTE SARDE** *Sylvia sarda*

Rarement observée à Capitello : 1 près de l'embouchure du Prunelli et de la Gravona le 15 octobre 1995.

**FAUVETTE PITCHOU** *Sylvia undata*

Nouvelle espèce à Capitello 1 le 19 novembre 1995 et 2 le même jour aux gravières de Baléone (également nouvelle sur ce site), elles y étaient encore le 3 décembre 1995 (Baléone).

**FAUVETTE A LUNETTES** *Sylvia conspicillata*

Jamais notée à Capitello depuis 1986, 1 spécimen y est présent du 9 au 11 septembre 1994.

**FAUVETTE PASSERINETTE** *Sylvia cantillans*

A l'amirauté à Ajaccio une le 11 septembre 1993 et à Capitello record de 10 le 4 septembre 1994.

**FAUVETTE BABILLARDE** *Sylvia curruca*

1 le 8 mai 1995 à Capitello (E. CHRISTOPHERSEN ) nouvelle espèce micro-régionale.

**POUILLOT SIFFLEUR** *Phylloscopus sibilatrix*

Rare à l'automne à Capitello : 1 le 25 septembre 1994.

**POUILLOT FITIS** *Phylloscopus trochilus*

Un en migration près de la tour de la Parata le 22 avril 1992 (P. MISIEK).

**ROITELET HUPPE** *Regulus regulus interni*

A Ajaccio (résidence Biancarello), 1 du 22 au 24 octobre 1994, de même qu'en octobre 1993 avec le même effectif alors qu'il est habituellement absent.

**ROITELET A TRIPLE BANDEAU** *Regulus ignicapillus minor*

Un à deux en hivernage de novembre 1994 à mars 1995 résidence Biancarello à Ajaccio. A Capitello premier cas d'hivernage avec 1 à 3 du 2 octobre 1994 au 11 mars 1995 puis 1 à 2 jusqu'au 21 mai 1995. Puis de nouveau le 1 septembre 1995, l'espèce s'est installée près de Capitello (C.C.A.S. d'où une progression de son aire de répartition).

**GOBE MOUCHE NOIR** *Ficedula hypoleuca*

Rare à Capitello : une femelle le 24 septembre 1994 (onzième mention sur ce site).

**REMIZ PENDULINE** *Remiz pendulinus*

Mention la plus tardive en micro-région : 1 le 8 mai 1995 à Capitello (E. CHRISTOPHERSEN). Passage restreint à l'automne 1994, hivernage en 1994/1995 quasi inexistant (2). Passage postnuptial 1995 très limité et pas d'hivernage en 1995/1996.

**LORIOT D'EUROPE** *Oriolus oriolus*

A relever, à Capitello une mention d'un mâle chanteur noté le 10 juin 1995 et plusieurs mentions lors du passage postnuptial alors que l'espèce y est plus rare à cette époque : 4 le 12 août, 3 le 13 août et 3 le 19 août 1995. Aux gravières de Baléone 1 à 2 mâles chanteurs en mai et juin (à remarquer sur ce site jusqu'à 5 spécimens en mai 1995) réguliers ils furent encore notés cantonnés jusqu'en juillet, derniers chants le 6 août 1995. Mais aucune nidification ne fut observée. Il ne semble pas qu'il y en ait réellement eu une.

**PIE GRIECHE ISABELLE** *Lanius isabellinus*

Nouvelle espèce pour la Corse, une immature à Pisinale du 1 au 3 novembre 1991 (in LEFRANC 1993).

**PIE GRIECHE ECORCHEUR** *Lanius collurio* X **PIE GRIECHE A TETE ROUSSE** *Lanius senator badius*

Un couple hybride dont le mâle était une Pie-grièche écorcheur a nidifié dans la région de Capo di Feno au printemps 1995.

**ETOURNEAU SANSONNET** *Sturnus vulgaris*

Plusieurs milliers entre décembre 1994 et mars 1995. A Capitello, passage de 5000 le 8 et 9 décembre 1994 et 6000 le 19 février 1995. Le dortoir ajaccien du fait de nombreux dérangements fut délaissé au début de 1995 au profit d'un autre au delà de la pointe de Porticcio. De nouveau un dortoir ajaccien fut constitué à l'automne 1995 comptant plusieurs milliers de novembre 1995 à février 1996 : 5000 à Capitello le 16 décembre 1995 et 6000 le 16 février 1996 (même changement de dortoir en janvier 1996 qu'au début 1995).

**ETOURNEAU UNICOLORE** *Sturnus unicolor*

Désormais plus fréquent en région ajaccienne jusqu'à 50 à 100 (100 le 1 septembre 1994) entre août et septembre 1994 jusqu'à 150 le 7 août 1994 à Capitello et jusqu'à 50 à 100 en septembre 1994. En 1994 l'avancée sur Marina Viva fut poursuivie, et en mai 1995, il fut noté aux abords du collège de Marina Viva ; à Pisciattello près du pont. En 1995 des rassemblements aussi importants furent observés en région ajaccienne et à Capitello aux mêmes époques et même 100 le 29 juillet (soit plus tôt qu'en 1994). Dans la région de Campo dell'Oro à l'est de l'aérodrome nidification de un à deux couples. Au moins trois couples à Capo di Feno (région de Pisinale et constructions plus au N.W. ). Effectifs importants à Capitello (record, tableau 3). A Molini l'espèce ne niche plus sur le site occupé en 1987 et ce depuis 1988.

**PIE BAVARDE** *Pica pica*

Une mention de cette espèce, la seule en zone I : PARROT collecta un spécimen en région ajaccienne en janvier 1910 (THIBAUT comm. pers.).

**GEAI DES CHENES** *Garrulus glandarius corsicanus*

Un le 8 octobre 1995 et un le 15 octobre 1995 à Capitello où l'espèce fut rarement mentionnée.

**CHOCARD A BEC JAUNE** *Pyrrhocorax graculus*

Exceptionnel en micro-région : observation de cette espèce près d'Ajaccio à l'automne 1992 (B. KERDELHUE *in litt.*, J.C. THIBAUT comm. pers.).

**CHOUCAS DES TOURS** *Corvus monedula*

E. CHRISTOPHERSEN affirme avoir observé un spécimen le 20 avril 1995 entre "Ajaccio et Vizzavona". Un à Capitello passant en vol le 18 février 1996.

**CORBEAU FREUX** *Corvus frugilegus*

Une mention ancienne, la seule concernant cette espèce en zone I : un collecté en région ajaccienne le 3 novembre 1911 par PARROT (J.C. THIBAUT comm. pers.).

**GRAND CORBEAU** *Corvus corax*

Espèce notée à une période inhabituelle en 1995 à Capitello : 1 le 29 juillet ; 1 le 13 août puis 2 les 2 et 3 septembre. A Baléone chiffre record de 6 le 19 août 1995. 40 le 25 mars 1995 à la décharge de Saint-Antoine, où sont notés les plus forts effectifs en zone I.

**MOINEAU SOULCIE** *Petronia petronia*

Ajaccio (résidence Biancarello) 1 couple nicheur pour la première fois en 1994, mais pas en 1995. A Capitello où il est exceptionnel, 1 le 22 décembre 1995.

**ASTRILD ONDULE** *Estrilda astrild*

Espèce échappée de captivité, 1 spécimen au marais de Casavone à Capitello le 15 juin 1986. Cette donnée n'a qu'un aspect anecdotique.

**TARIN DES AULNES** *Carduelis spinus*

Une femelle à Capitello le 17 janvier 1995 où l'espèce est peu fréquente et sur le même site 4 femelles et 1 mâle le 4 février 1996. Aux Milelli où il est peu souvent noté 2 le 10 novembre 1995 observés par B. RECORBET.

**VENTURON CORSE** *Serinus citrinella corsicana*

Nicheur chaque année aux gravières de Baléone depuis 1991, avec 1 couple sauf 2 couples en 1995. A Capitello au printemps donnée tardive : 2 le 23 avril 1995. Plusieurs dizaines à Capitello fin janvier 1996 et en février 1996 : record de 100 le 9 février.

**GROS BEC CASSE NOYAUX** *Coccothraustes coccothraustes*

A relever un spécimen bagué en septembre 1937 en Allemagne occidentale qui fut retrouvé à Ajaccio en janvier 1938 (THIBAUT 1983). Exceptionnel à Capitello : 1 le 11 novembre 1994. En 1995, 1 couple aux gravières de Baléone et 1 couple à Molini.

**BRUANT ZIZI** *Emberiza cirulus nigrostriata*

Mentions tardives (records) à Capitello 1 femelle le 1 mai 1995 et 1 mâle chanteur le 2 mai 1995.

**BRUANT ORTOLAN** *Emberiza hortulana*

Rare en micro-région : 1 mâle à Capitello le 28 avril 1995.

**BRUANT DES ROSEAUX** *Emberiza schoeniclus*

Rare à Alzone : 1 femelle le 18 mars 1994. Faible passage et hivernage en 1994/1995 et de même en 1995/1996 ce jusqu'au coup de froid de décembre 1995. 3 - 6 en novembre 1995 à

Capitello 5-8 à Baléone (8 à Capitello le 16 décembre 1995). Puis faible nombre en janvier 1996 et février 1996 (dernière donnée le 18 février 1996 à Capitello).

#### BRUANT PROYER *Miliaria calandra*

Un cas d'hivernage à Capitello : 1 de novembre 1994 à février 1995 et un autre cas sur ce site 1 du 29 novembre 1995 à février 1996. Année 1995 faible population en zone I. Hivernage de deux spécimens dans la région de Capo di Feno (hiver 1995/1996).

## REMERCIEMENTS

Ceux-ci vont à J.C. THIBAUT qui a bien voulu me fournir certaines données et aux observateurs dont les mentions furent évoquées il s'agit de : Y. BERTHAULT ; V. BRETAGNOLLE ; J. CALAS ; E. CHRISTOPHERSEN ; A. DESNOS ; J.Y. FREMONT ; I. GUYOT ; B. KERDELHUE ; E. LEENHARDT ; P. MISIEK ; S. NICOLLE ; M. PHILIPPE ; B. RECORBET ; J. SIGWALT et C. VERHEYDEN.

## ADDENDA ET ERRATA

- Au niveau de l'étude publiée dans les Trav. sci. du Parc nat. rég. et des Res. de la Corse 1994 n° 49 : 1 - 88.
- p.3 Tableau relatif au nombre de sorties lire : 152 sorties en 1987 et non 162 et 114 sorties en 1989 et non 124. Ajouter pour 1982 janvier N = 4 ; février N = 2 et pas 1, mars N = 8 ; avril N = 10 ; mai N = 4 et pas 1 et août N = 4 soit 64 sorties dans l'année. A relever première sortie à Capitello en avril 1979 et très peu d'observations en 1980 et 1981. Au total plus de 50 000 données furent recueillies à Capitello entre le 1 janvier 1982 et le 31 décembre 1995.
- p.8 Tableau relatif au nombre d'espèces lire : 88 espèces en mars 1993 et non 18 espèces.
- p.15 Article relatif au Héron crabier : un seul autre site permet l'observation régulière de cette espèce au passage en dehors de Capitello, les gravières de Baléone (N = 32 données 1983 - 1995 mais Capitello N = 126 et micro-région 1983 - 1995 N = 183).
- p.15 Article relatif au Héron garde boeuf : le nombre de mentions évoqué au niveau du début du paragraphe ne concerne qu'une partie des observations, le nombre total étant de N = 73 au 15 novembre 1994 et N = 91 au 31 décembre 1995. Aucun hivernage ne fut plus observé seul le passage pré-nuptial et le passage post-nuptial furent constatés.
- p.46 Sterne hansel à jour de 1995, un total de 19 observations en micro-région dont 15 à Capitello et passage du 23 mars au 21 mai et 19 puis 24 juin.
- p 35 Vanneau huppé ajouter : espèce assez régulière dans les champs entre la Parata et Capo di Feno au passage toujours sous de faibles effectifs (par exemple 3 le 4 novembre 1995) très rare en hivernage (maximum observé 1980 - 1995 : 26 le 11 novembre 1984).
- p 60 L'Alouette des champs ajouter : espèce régulière en migration et hivernage dans les champs entre la Parata et Capo di Feno, un maximum de 40 à 50 spécimens mentionnés (à l'automne).
- p.61 Hironde rustique, précision, le nombre record de 6000 observées le fut le 12 septembre 1985.

- S'agissant de la bibliographie ajouter :

- BONACCORSI G. (1994) Avifaune de la basse vallée de la Gravona et du Prunelli, Trav. sci. Parc nat. Reg. et Res. de la Corse 49 : 1-88.
- BRUNSTEIN D. et THIBAUT J.C. (1980) Oiseaux de mer hivernant en Corse 1979-1980 Association des amis du Parc naturel régional de la Corse.
- LOVATY F. (1991) Nidification de l'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* dans une buse métallique en Corse Nos oiseaux vol. 41 : 203 - 204.
- LOVATY F. (1992) Observations sur le comportement territorial et vocal de la Fauvette sarde *Sylvia sarda* durant un cycle de reproduction Nos oiseaux vol. 41: 463 - 487.
- LOVATY F. (1993) Notes sur l'abondance de la Fauvette sarde *Sylvia sarda* près d'Ajaccio (Corse du Sud) L'oiseau et RFO 63 : 194 - 201.
- PIETRI C. (1993) Le Colin de Californie *Callipepla californica* (Shaw) 1798 : historique, distribution et habitat en Corse Ecole pratique des hautes études, Montpellier.
- THIBAUT J.C (1978). Statut et effectifs de quelques oiseaux d'eau de la Corse Association des amis du Parc Naturel Régional de la Corse Ajaccio.

## ANNEXES

- Tableau 1 : Sous espèces de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* mentionnées au passage lors du printemps 1995 à Capitello entre le 10 mars et le 14 mai.
- Tableau 2 : Records d'arrivées pour 19 espèces en 1995 à Capitello.
- Tableau 3 : Effectifs nicheurs de chacune des espèces (nb. de couples) à Capitello de 1993 à 1995.
- Tableau 4 : Sorties au cours desquelles furent observés des Pipits à gorges rousses *Anthus cervinus* au printemps 1995 en zone I.
- Tableau 5 : Sorties au cours desquelles furent mentionnées des Gorges bleues *Luscinia svecica* au printemps 1995 en zone I.
- Tableau 6 : Nombre d'observations de Gorges bleues *Luscinia svecica* à Capitello entre 1983 et 1995.
- Tableau 7 : Nombre de données par espèces de limicoles à Capitello en 1995.
- Cartes 1-3 : Répartition de la Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* en zone I.

| Sous espèces / Mois         | Mars | Avril | Mai | Totaux |
|-----------------------------|------|-------|-----|--------|
| <i>M. f. flava</i>          | 2    | 22    | 5   | 29     |
| <i>M. f. cinereocapilla</i> | 14   | 11    | 16  | 41     |
| <i>M. f. iberiae</i>        |      | 3     |     | 3      |
| <i>M. f. thunbergi</i>      |      |       | 1   | 1      |
| <i>M. f. sp.</i>            | 5    | 4     |     | 9      |
| Totaux                      | 21   | 40    | 22  | 83     |

Tableau 1 : Sous espèces de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* mentionnées au passage lors du printemps 1995 à Capitello entre le 10 mars et le 14 mai.  
A noter que quatre des six sous espèces observées en Corse le furent durant cette année.

| Espèces                   | Dates d'arrivée en 1995 | Dates les plus précoces depuis 1980 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Caille des blés           | 26 mars / 14 août       | 7 avril / 11 octobre                |
| Petit gravelot            | 3 mars                  | 7 mars                              |
| Vanneau huppé             | 3 septembre             | 10 octobre                          |
| Bécasseau minute          | 24 mars                 | 1 avril                             |
| Chevalier guignette       | 3 mars                  | 19 mars                             |
| Huppe fasciée             | 24 mars *               | 26 mars                             |
| Hirondelle de rivage      | 12 mars / 2 septembre   | 13 mars / 3 septembre               |
| Hirondelle de fenêtre     | 4 mars **               | 11 mars                             |
| Hirondelle rousseline     | 21 mars                 | 15 avril                            |
| Pipit des arbres          | 25 août                 | 6 septembre                         |
| Pipit à gorge rousse      | 8 avril                 | 15 avril                            |
| Pipit spioncelle          | 24 septembre            | 4 octobre                           |
| Bergeronnette printanière | 10 mars                 | 17 mars                             |
| Gorge bleue               | 3 mars                  | 6 mars                              |
| Traquet motteux           | 25 mars / 14 août       | 27 mars / 23 août                   |
| Lusciniole à moustaches   | 14 octobre              | 15 octobre                          |
| Phragmite des joncs       | 25 mars                 | 28 mars                             |
| Tarier d'Europe           | 25 août                 | 2 septembre                         |
| Venturon Corse            | 3 septembre             | 12 octobre                          |

Tableau 2 : Records d'arrivées pour 19 espèces en 1995 à Capitello.

A noter que le Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* fut noté dans le port d'Ajaccio le 23 février 1995, donc très précocement au regard des différentes données en zone I (obs. B. RECORBET).

\* A l'exclusion des données relatives à l'hivernage.

\*\* A l'exclusion d'une observation exceptionnelle un 11 février 1989, sur un autre site de la microrégion.

| Espèces / Années          | 1993 | 1994 | 1995 |
|---------------------------|------|------|------|
| Grébe castagneux          | 2    | 2    | 4    |
| Blongios nain             | 2    |      | 3    |
| Faucon crecerelle         | 1    |      |      |
| Râle d'eau                | 2    | 2    | 2    |
| Poule d'eau               | 6    | 6    | 8    |
| Foulque macroule          | 1    |      |      |
| Tourterelle des bois      | 2    | 2    | 2    |
| Tourterelle turque        |      |      | 1    |
| Huppe fasciée             | 2    | 2    | 1    |
| Guêpier d'Europe          | 4    | 2    | 3    |
| Pic epeiche               | 1    | 1    |      |
| Hirondelle rustique       | 2    | 2    | 3    |
| Hirondelle de fenêtre     |      | 2    | 1    |
| Pipit rousseline          | 2    | 2    | 2    |
| Troglodyte mignon         |      | 1    | 2    |
| Rossignol philomèle       | 5    | 5    | 5    |
| Tarier pâtre              | 4    | 5    | 5    |
| Rouge gorge               |      | 1    |      |
| Merle noir                | 4    | 4    | 5    |
| Bouscarle de Cetti        | 5    | 6    | 9    |
| Cisticole des joncs       | 1    | 2    | 4    |
| Rousserolle effarvatte    | 10   | 8    | 11   |
| Rousserolle turdoïde      | 2    |      |      |
| Fauvette mélanocéphale    | 6    | 7    | 7    |
| Fauvette à tête noire     | 2    | 3    | 3    |
| Gobe mouche gris          | 2    | 3    | 3    |
| Mésange bleue             | 2    | 2    | 3    |
| Mésange charbonnière      | 2    | 2    | 4    |
| Mésange à longue queue    | 1    | 1    | 2    |
| Serin cini                | 1    | 1    | 2    |
| Verdier d'Europe          | 2    | 2    | 3    |
| Chardonneret élégant      | 5    | 5    | 5    |
| Pinson des arbres         | 2    | 2    | 2    |
| Linotte mélodieuse        | 2    | 2    | 2    |
| Pie grièche à tête rousse | 1    | 1    |      |
| Moineau cisalpin          | 18   | 16   | 17   |
| Moineau friquet           | 2    | 4    | 5    |
| Etourneau unicolore       | 3    | 3    | 8    |
| Corneille mantelée        | 3    | 3    | 3    |
| Bruant proyer             | 1    | 1    | 2    |

Tableau 3 : Effectifs nicheurs de chacune des espèces (nb. de couples) à Capitello de 1993 à 1995.

A noter qu'aucun nid parasité par le Coucou gris *Cuculus canorus* ne fut découvert durant cette période.

| Dates / Lieux | Capitello | Baléone | Alzone | Caldanicia | Totaux |
|---------------|-----------|---------|--------|------------|--------|
| 8 IV          | 1         |         |        |            | 1      |
| 9 IV          | 1         |         |        |            | 1      |
| 14 IV         | 2         |         |        |            | 2      |
| 15 IV         | 6         | 1       | 4      |            | 11     |
| 16 IV         | 8         | 1       | 1 *    | 1 *        | 11     |
| 17 IV         | 6         | 1       |        |            | 7      |
| 19 IV         | 10 *      |         |        |            | 10     |
| 22 IV         | 4         |         |        |            | 4      |
| 23 IV         | 4         |         |        |            | 4      |
| 29 IV         | 1         |         |        |            | 1      |
| 30 IV         | 1         |         |        |            | 1      |
| 1 V           | 1         |         |        |            | 1      |
| 2 V           | 4         |         |        |            | 4      |
| 5 V           | 1         |         |        |            | 1      |
| 25 V          | 1         |         |        |            | 1      |

Tableau 4 : Sorties au cours desquelles furent observés des Pipits à gorges rouges *Anthus cervinus* au printemps 1995 en zone I. (\* obs. dues à B. RECORBET)

| Dates / Lieux | Capitello | Caldanicia | Baléone   | Totaux |
|---------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 3 III         | 1 f       |            |           | 1      |
| 4 III         | 1 f       |            |           | 1      |
| 5 III         | 1 f       |            |           | 1      |
| 10 III        | 1 f       |            |           | 1      |
| 11 III        | 1 f       |            |           | 1      |
| 12 III        | 1 f       |            |           | 1      |
| 17 III        | 1 f       |            |           | 1      |
| 18 III        | 1 f       |            |           | 1      |
| 19 III        | 1 f       |            | 1 m       | 2      |
| 22 III        | 2 f + 1 m |            |           | 3      |
| 23 III        |           | 2 sp. *    |           | 2      |
| 24 III        | 1 m + 1 f | 2 sp. *    | 1 m + 2 f | 7      |
| 25 III        | 1 m + 1 f | 1 sp. *    | 2 m + 1 f | 6      |
| 26 III        | 2 m       |            | 1 f       | 3      |
| 28 III        | 2 m       |            |           | 2      |
| 31 III        | 1 m       |            | 2 m + 1 f | 4      |
| 1 IV          | 2 m       | 3 sp. *    | 2 m + 1 f | 8      |
| 2 IV          | 1 m + 1 f |            | 2 m + 1 f | 5      |
| 4 IV          | 1 m       |            |           | 1      |
| 16 IV         | 1 m       |            |           | 1      |
| 17 IV         | 1 m       |            |           | 1      |

Tableau 5 : Sorties au cours desquelles furent mentionnées des Gorges bleues *Luscinia svecica* au printemps 1995 en zone I. (\* obs. dues à B. RECORBET)

L'année 1995 fut celle du plus important passage pré-nuptial depuis 1983 à Capitello et en micro-région (n = 31).

| Années / Passages | Printemps<br>(mars/avril) | automne<br>(septembre/octobre) | Totaux |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| 1983              | 5                         | 3                              | 8      |
| 1984              | 8                         | 12                             | 20     |
| 1985              | 12                        | 5                              | 17     |
| 1986              | 13                        | 16                             | 29     |
| 1987              | 18                        | 9                              | 27     |
| 1988              | 14                        | 4                              | 18     |
| 1989              | 10                        | 13                             | 23     |
| 1990              | 19                        | 9                              | 28     |
| 1991              | 12                        | 12                             | 24     |
| 1992              | 8                         | 7                              | 15     |
| 1993              | 9                         | 8                              | 17     |
| 1994              | 7                         | 20                             | 27     |
| 1995              | 20                        | 10                             | 30     |
| Totaux            | 155                       | 128                            | 283    |

Tableau 6 : Nombre d'observations de Gorges bleues *Luscinia svecica* à Capitello de 1983 à 1995 (N = 283)


Toutes furent réalisées par G.B.. Toutes les données intervinrent entre le 3 mars et le 19 avril mais pour l'essentiel entre le 10 mars et le 10 avril. Puis entre le 2 septembre et le 20 octobre surtout entre le début septembre et le 10 octobre. Chaque fois 1 à 3 individus furent notés. On relèvera que le passage pré-nuptial est un peu plus important que le passage post-nuptial (N = 155/128 soit 54,77% / 45,28%). Le nombre d'observations dans les autres parties de la micro-région reste beaucoup plus restreint.

| Espèces \ Mois                | J  | F | M  | A  | M  | J | J  | A  | S  | O  | N  | D |
|-------------------------------|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|
| Vanneau huppé                 | 5  |   | 3  |    |    |   |    |    | 1  | 3  | 10 | 2 |
| Huitrier pie                  |    |   | 1  | 1  |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Avocette élégante             |    |   | 3  | 2  | 1  |   |    |    |    |    |    |   |
| Echasse blanche               |    |   | 1  | 1  | 13 |   |    |    |    |    |    |   |
| Glaréole à collier            |    |   |    |    | 2  |   |    |    |    |    |    |   |
| Gravelot à collier interrompu |    |   | 3  | 4  | 1  |   |    |    |    |    |    |   |
| Grand gravelot                |    |   | 1  | 3  | 7  |   |    |    | 2  | 1  |    |   |
| Petit gravelot                |    |   | 11 | 9  | 3  |   | 4  | 2  |    |    |    |   |
| Bécasseau minute              |    |   | 1  | 1  | 11 | 1 | 3  | 8  | 4  |    |    |   |
| Bécasseau cocorli             |    |   |    | 3  | 8  |   | 1  | 3  |    |    |    |   |
| Bécasseau variable            |    |   |    |    |    |   |    | 5  |    |    |    |   |
| Bécassine sourde              |    | 1 |    |    |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Bécassine des marais          | 5  | 4 | 13 | 4  |    |   |    | 1  | 8  | 6  | 8  | 2 |
| Bécassine double              |    |   |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Pluvier doré                  | 1  |   | 1  |    |    |   |    |    |    |    | 3  |   |
| Pluvier argenté               |    |   |    | 1  | 3  |   |    | 3  |    |    |    |   |
| Chevalier aboyeur             |    |   |    | 5  | 6  |   |    |    | 1  |    |    |   |
| Chevalier arlequin            |    |   |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Chevalier gambette            |    |   | 8  | 5  | 4  |   | 3  | 1  |    |    |    |   |
| Chevalier cul blanc           |    |   | 7  | 3  | 1  |   | 3  | 2  |    | 1  | 1  | 1 |
| Chevalier sylvain             |    |   | 1  | 9  | 3  |   |    | 2  |    |    |    |   |
| Courlis corlieu               |    |   |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Courlis cendré                |    |   | 3  | 4  |    |   |    |    |    |    | 1  |   |
| Barge à queue noire           |    |   | 2  | 2  |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Chevalier guignette           |    |   | 1  | 12 | 8  |   | 8  | 14 | 6  | 1  | 1  |   |
| Chevalier stagnatile          |    |   |    | 2  |    |   |    |    |    |    |    |   |
| Combattant                    |    |   | 6  | 6  | 5  |   | 1  |    | 1  |    |    |   |
| Totaux cumulés                | 11 | 5 | 66 | 80 | 76 | 1 | 23 | 41 | 23 | 12 | 24 | 5 |

Tableau 7 : Nombre de données par espèces de limicoles à Capitello en 1995 (N = 367)


On relèvera un faible passage durant cette année, mais surtout un passage postnuptial plus important qu'à l'accoutumée (nb. d'observations de limicoles à capitello 1 janvier 1982 - 31 décembre 1995 N = 6301 soit 450 données en moyenne chaque année). Outre la présence d'espèces rares (Bécassine double) les deux espèces les plus fréquentes restent la Bécassine des marais (N = 51) et le Chevalier guignette (N = 51) ; (pour des 2 espèces N = 102 / 367 : 27,79%). Le passage pré-nuptial (mars - mai) concentre le plus grand nombre de données (N = 222 / 367 : 60,49%). Comme en règle générale le mois concentrant le plus grand nombre d'observations reste celui du mois d'avril (N = 80) et par exception l'apogée du passage postnuptial est intervenu en août (N = 41) et non en septembre. Au total 27 espèces furent notées parmi les 34 ayant été rencontrées sur ce site.

TOURTERELLE TURQUE répartition au 1 septembre 1985



Carte 1 : Répartition de la Tourterelle turque au 1 septembre 1985  
L'expansion est nette et ne fut pas freinée par la vague de froid du mois de janvier.

TOURTERELLE TURQUE répartition au 1 septembre 1990



Carte 2 : Répartition de la Tourterelle turque au 1 septembre 1990  
L'essentiel de l'expansion n'est plus visible dans la ville mais en dehors de celle ci.



Carte 3 : Répartition de la Tourterelle turque au 29 février 1996

L'expansion semble avoir atteint son apogée en ville et elle n'est désormais plus sensible qu'au dehors de celle-ci de ce plus à l'écart que jamais.

**NOUVEAU COMPLEMENT A L'AVIFAUNE**  
**DE LA BASSE VALLEE DE LA GRAVONA**

par

Gilles BONACCORSI

Immeuble Azalée  
Chemin de Biancarello  
Résidence Biancarello  
20090 AJACCIO

## I INTRODUCTION

Il s'agira ici d'une mise à jour des données publiées *in* BONACCORSI 1994 et BONACCORSI 1998. Le travail présenté expose les informations importantes obtenues pour une partie des espèces en micro-région (zone 1) entre le 1 mars 1996 et le 30 juin 1998.

Sur le site de Capitello, plusieurs incendies sporadiques intervinrent au début de 1996 (le dernier début mars) dans la partie occidentale de l'embouchure des deux cours d'eau, et en fin juin 1998 une partie des ronciers y fut détruite. Début octobre 1996, une partie des ronciers près d'un petit marais a été brûlé. Début septembre 1996 l'essentiel du champ séparant les deux étang a été mis en culture, encore en 1997 (fourrage pour le bétail). Aux gravières de Baléone le changement se poursuit pour l'extraction des graviers et localement la végétation a été détruite. Près de Pisinale en fin 1995 a été réalisée une retenue d'eau et fin 1997 une autre y a été constituée. Pour l'instant elles accueillent surtout des Goélands leucophées *Larus cachinnans*. Depuis 1994 et surtout 1995 à Capitello la végétation se « refermant » le marais de Casavone étant moins intéressant au plan ornithologique en particulier pour les limicoles, ceci a généré une augmentation de la valeur de Campo dell'Oro (zone humide temporaire).

## II METHODE D'ETUDE

Des sorties au cours desquelles des observations furent effectuées sont intervenues sur les différents sites de la micro-région et en particulier à Capitello. A titre indicatif figure ici le nombre de journées durant lesquelles une ou plusieurs sorties intervinrent à Capitello (en 1996 1 janvier / 31 décembre N = 201 jours, en 1997 1 janvier / 31 décembre N = 289 jours, en 1998 1 janvier 30 juin N = 158 jours). Outre le nombre de sorties figure le nombre d'espèces observées lors des mois concernés (en 1996. 198 espèces furent observées, 184 en 1997 et pour 1998 au 30 juin 177 espèces).

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| <u>1996</u> | M = 27 / 130 | A = 25 / 83  |
|             | A = 26 / 148 | S = 15 / 102 |
|             | M = 23 / 98  | O = 13 / 84  |
|             | J = 12 / 67  | N = 16 / 71  |
|             | J = 10 / 61  | D = 7 / 57   |

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| <u>1997</u> | J = 13 / 60  | J = 30 / 70  |
|             | F = 15 / 62  | A = 31 / 93  |
|             | M = 23 / 91  | S = 29 / 100 |
|             | A = 22 / 128 | O = 31 / 109 |
|             | M = 25 / 100 | N = 28 / 76  |
|             | J = 22 / 66  | D = 20 / 70  |

|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| <u>1998</u> | J = 23 / 63  | J = 30 / 73 |
|             | F = 15 / 65  |             |
|             | M = 30 / 111 |             |
|             | A = 30 / 142 |             |
|             | M = 30 / 116 |             |

### III LISTE COMMENTEE DES ESPECES

Celle ci traitera d'estimations relatives à 209 espèces. A présent plus de 250 espèces ont été notées à Capitello et plus de 270 en micro-région.

#### PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

En mer près de Capitello, 1 le 17 novembre 1996.

#### GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

Nicheur occasionnel à Campo dell'Oro (mare temporaire), a régressé à Baléone (période 1996/1998).

#### GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

A Capitello 1 : le 7 mars, 1 le 17 avril et 1 le 17 décembre 1997. Puis 2 le 29 mars 1998 sur le même site. Pas d'hivernage dans le port d'Ajaccio sauf 1 du 12 au 28 janvier 1997.

#### GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

A Capitello 1 du 4 au 5 octobre 1996, 1 du 23 septembre au 3 octobre 1997. L'espèce est désormais régulière en zone I.

#### PUFFIN CENDRE *Calonectris diomedea*

Capitello, en mer 1 le 1 novembre 1996 et 8 le 2 juin 1997

#### FOU DE BASSAN *Morus bassanus*

Un premier hiver près de la Parata le 9 novembre 1997 (B. RECORBET).

#### GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

A Capitello, des données tardives 3 le 12 mai 1996, 1 du 17 au 24 mai 1998 ; a relever sur ce site 8 : les 8 décembre 1996 et le 2 janvier 1997 ainsi que le 24 mars 1997 et le 14 décembre 1997. Dans le port d'Ajaccio, l'espèce est désormais régulière : 1 : le 19 octobre, 2 : 25 octobre 1996 ; 3 : 4 janvier, 2 : le 2 décembre ; 1 : le 3 décembre 1997 ; 4 le 20 janvier et 1 le 4 février 1998. De plus, 22 le 3 mars 1996 à Baléone. Sur les rochers de la base d'Aspretto 11 le 10 mars 1996. Entre le cimetière d'Ajaccio et la plage de l'Ariadne 1 : le 13 mars 1996 et 1 le 18 décembre 1997. Faible hivernage en 1997/1998.

#### CORMORAN HUPPE *Phalacrocorax aristotelis*

Le 4 octobre 1996, 1 sur l'embouchure du Prunelli, une première depuis 1982. A Capitello 8 le 31 octobre 1997.

#### BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

En 1996, à Capitello 1 le 12 mars et 1 du 8 au 13 avril 1996 au marais de Caldaniccia (B. RECORBET et M. DUQUET). En 1997, à Campo dell'Oro 1 les 14 et 15 mars, puis réobservé de fin mars au 3 avril par B. RECORBET, 1 les 5 et 9 mai à Capitello ; sur ce site, 1 en hivernage du 17 décembre au 15 janvier 1998 (date de sa mort). A Campo dell'Oro 1 du 26 mars (B. RECORBET) au 5 avril puis 1 à Caldaniccia le 13 avril. Nette progression du nombre d'observations (hivernage remarquable au plan insulaire).

**BLONGIOS NAIN** *Ixobrychus minutus*

Aucun couple nicheur en micro-région de 1996 à 1998. A Capitello, à relever un couple stationne encore jusqu'au 19 juillet 1997, un juvénile sera observé du 28 juillet jusqu'au 22 septembre 1997.

**HERON BIHOREAU** *Nycticorax nycticorax*

A Ajaccio (Résidence Biancarello) 1 : le 9 avril et 3 le 25 avril 1996. 5 le 18 août 1996 au dessus de Molini. A Baléone B. RECORBET en note 51 le 28 avril 1996. A Capitello 2 le 3 juin et 1 le 7 juin 1997, 4 le 20 août et 5 le 22 août 1997.

**HERON CRABIER** *Ardeola ralloides*

Au marais d'Alzone 1 du 6 au 12 avril 1996, puis le 11 mai 1996. A Campo dell'Oro 3 du 1 au 6 mai puis 1 du 11 au 17 mai 1996, sur ce même site 1 le 27 avril 1997. A Capitello 1 du 1 au 7 juin 1997. A Caldaniccia 1 le 18 avril 1997 non loin du marais. A Capitello enfin 1 le 1, 2 et 13 juin 1998.

**HERON GARDE BOEUF** *Bubulcus ibis*

Un adulte noté sur plusieurs sites en 1996 : Marina Viva du 22 au 24 avril, les 23 et 24 avril vint à Capitello, le 26 avril à Alzone. La même année 2 adultes nuptiaux et 1 juvénile le 31 juillet, puis le juvénile du 2 au 11 août. Enfin 2 le 19 avril 1996 à Baléone (B. et B. ROCHE) et 1 le 2 décembre 1996 également sur ce site. A Campo dell'Oro 1 le 27 septembre et à Capitello 3 le 1 novembre. En 1997, à Caldaniccia vu par plusieurs observateurs (dont B. RECORBET) 1 à 2 du 8 au 27 février, 2 du 20 au 23 mars puis 2 les 2 et 3 novembre, enfin sur cette même localité 1 entre les 1 et 21 mai. 1 le 25 avril à Marina Viva, 1 le 2 juin à Capitello. Puis à l'automne et en hiver, à noter à Capitello 1 du 15 au 29 septembre, 1 du 9 au 12 octobre, en novembre 2 à 5 du 3 au 12 (avec 5 les 4 et 5 novembre) puis 11 le 10 décembre, 2 le 12 décembre ; hivernage complet à Caldaniccia : 6 le 24 décembre 1997, 9 le 10 janvier 1998 (mais 11 du 12 au 18 décembre 1997) ; les observations continuent et à Caldaniccia jusqu'à 8 furent observés le 11 février 1998, jusqu'à 9 le 5 mars ; jusqu'à 8 en avril (le 9, B. RECORBET). Dernière donnée, 3 le 11 avril. Certains se déplacèrent et 1 à 3 furent notés à Campo dell'Oro entre le 6 mars 1998 et le 19 avril (dernière donnée B. RECORBET). Enfin, à Capitello 2 du 21 au 27 avril. L'automne 1997 et l'hiver 1997 / 1998 furent remarquables au plan microrégional pour ce héron autrefois impossible à observer en automne. Enfin à Capitello 1 les 27 et 28 mai 1998, il fut noté à Caldaniccia le 28 mai 1998.

**AIGRETTE GARZETTE** *Egretta garzetta*

Beaucoup plus fréquente qu'il y a une décennie. Au marais d'Alzone jusqu'à 6 du 12 au 26 avril 1996. A Aspretto (sur les rochers) 12 le 6 avril 1996, le 15 avril 1996 record microrégional (G.B. et B. RECORBET) N = 100 ; 20 à Capitello, 55 au dessus du Golfe d'Ajaccio et 25 au dessus d'Aspretto. Près de la retenue d'eau artificielle de Pisinale 1 le 8 mai 1996 et 1 le 20 mai 1998. A Ajaccio en, 1996 (Résidence Biancarello) 1 le 21 avril, 1 le 30 septembre puis 1 du 4 octobre au 27 novembre ; en 1997 sur ce site, 1 le 23, le 29 et le 30 avril puis 2 le 1 mai, toujours sur ce site 1 le 30 avril et 2 le 1 mai 1998. A l'Amirauté 1 le 13 novembre 1997. A Vignetta 2 en hivernage du 1 au 10 janvier 1997 ; 1 au marais d'Alzone en hivernage en 1997/1998. A relever à Capitello 5 le 7 juin 1996 puis 1 jusqu'au 15 juin, 1 fut notée à partir du 31 juillet puis 3 le 14 août. Ensuite 1 à 3 jusqu'au 3 décembre 1996, une seule hiverne jusqu'en fin février 1997. A noter de plus, 22 le 21 avril 1997, 1 à 3 du 1 au 4 juin 1997 (dont 3 le 2 juin) : puis aucune donnée en juillet, 1 du 10 au 24 août et 1 du 6 septembre

1997 au 19 février 1998. A mentionner 20 le 15 avril et 10 le 19 mai 1998. Sur le marais de Campo dell'Oro l'espèce fut régulière de mars à mai 1998 (jusqu'à 7 le 30 avril 1998) comme elle l'avait été en 1996 et 1997. A Baléone encore 4 le 29 mai 1998 et à Capitello encore 2 le 2 juin 1998.

#### GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

Semble devoir devenir de plus en plus régulière. A Capitello 1 le 15 mars 1996 et 2 le 7 avril 1996 ; 1 le 31 mars 1997 et 1 le 30 avril 1998, les deux derniers individus furent seulement notés en vol se dirigeant vers le nord.

#### HERON CENDRE *Ardea cinerea*

A Capitello, 8 le 5 janvier 1997 et 7 le 16 février suivant. Sur les rochers de la base d'Aspretto 2 le 3 mars et 3 le 10 mars 1996. A Ajaccio sur le port, 1 le 29 octobre 1997 (posé), 1 en vol W ⇒ E le 2 septembre 1997, un posé le 10 mars 1998, au Finosello en vol 1 le 11 octobre 1996, Résidence Biancarello, 1 le 4 mars 1996, 2 le 16 octobre 1996, 2 le 10 janvier 1997 puis 1 du 12 janvier au 12 février, 1 du 14 au 31 mars, 1 le 24 avril, 1 le 8 mai, 1 le 19 et le 22 septembre 1997 et 1 en 1998 sur ce site du 26 au 29 janvier, 1 du 25 au 26 mars, 1 du 1 au 6 avril suivant. En 1996, 1 seul en estivage en micro-région, 4 en 1997. En hivernage en 1996/1997, jusqu'à 8 à Capitello (le 5 janvier) et 9 en micro-région, en 1997/1998 seulement 3. A Capitello à noter 24 le 24 mars 1996 ; l'attaque sur ce site du héron par les Goélands leucophées est occasionnelle (exemple le 15 février 1998).

#### HERON POURPRE *Ardea purpurea*

A Campo dell'Oro 1 à 2 du 8 au 22 avril 1996. A Capitello 1 le 14 août et 2 le 15 août 1996, 1 semi albinos le 19 avril 1997, 1 le 26 juillet, puis 1 les 5, 21 et 28 août 1997. En 1998, à Capitello 1 encore observé le 31 mai et le 1 juin.

#### CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

Une le 29 avril 1998 notée entre entre 13 h 59 et 14 h 16 au dessus de Capitello, puis allant vers Campo dell'Oro, Caldaniccia et repartant vers le NW. Espèce exceptionnelle en zone I.

#### IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

A Capitello, 2 adultes l'après midi du 9 mai 1998. Espèce exceptionnelle en zone I.

#### FLAMANT ROSE *Phoenicopterus ruber roseus*

A Capitello 3 le 17 avril 1997 puis 3 le 27 octobre 1997, puis un immature du 2 au 10 novembre 1997. Un immature le 23 décembre 1997 passe de Vignetta au dessus du port d' Ajaccio puis disparaît vers l'Ouest. Aucun en 1996, ni en 1998. Jamais d'oiseau bague.

#### OIE CENDREE *Anser anser*

A Capitello 2 en vol le 26 mars 1996.

#### TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

A Capitello 1 immature le 22 mai 1997 et 3 adultes le 25 mars 1998.

#### CANARD CAROLIN *Aix sponsa*

Une femelle à Capitello le 11 novembre 1996 (échappée de captivité).

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

A Capitello : en 1996 : 4 le 5 mars, 1 le 9 mars, 2 le 24 mars ; en 1997 4 les 15, 18 et 22 mars, 1 le 26 octobre (donnée exceptionnelle car à l'automne) ; en 1998 : 3 le 16 mars et 4 le 3 avril. Cette espèce apparaît donc comme étant régulière sous de faibles effectifs.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

Donnée tardive à Capitello 1 mâle et 1 femelle le 4 mai 1996 puis sur ce site 1 le 31 mai et 3 le 23 juin 1996. Pas de reproduction en micro-région en 1996, de même pour 1997 et 1998 mais à Capitello en 1997 1 noté le 17 janvier (précoce) puis 1 noté le 8 mai (tardif), 7 le 2 juillet et 3 le 16 juillet. A relever cette même année 1 à 2 du 16 au 30 août, 6 le 27 octobre et 1 spécimen le 1 décembre.

CANARD PILET *Anas acuta*

A Capitello, 1 femelle le 4 mai 1996, 2 individus le 13 septembre 1996 (dates tardives et précoces). En 1997 : sur le même site 11 le 24 février, 1 femelle le 26 août, 1 le 27 septembre, 4 le 29 octobre et 2 le 30 octobre. En 1998 une donnée tardive de 5 le 3 avril sur le site de Capitello.

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

Record insulaire près de Capitello 2460 le 30 mars 1996 (899 le 20 mars et 1165 le 26 mars de la même année) ; il s'agit du plus fort passage pré-nuptial jamais constaté. En 1996 effectif cumulé pour cette espèce en mars de 6067 specimens. En 1997 également un fort passage avec un effectif cumulé en mars de 5267 individus (jusqu'à 990 le 22 mars et 900 le 28 mars). On relèvera cette année-ci en outre qu'1 spécimen fut noté le 10 août. En 1998 encore un fort passage avec un total cumulé de 4967, à noter des passages importants dès la première quinzaine de mars : 976 le 7 mars, 584 le 8 mars puis 674 le 19 mars. Un passage exceptionnel en avril avec : 700 le 5 avril soit le record de cette époque de l'année. Une donnée tardive d'un mâle à Capitello le 16 mai. Sur le plan d'eau temporaire de Campo dell'Oro l'espèce fut régulière en mars et en début avril : avec un effectif de 126 le 14 mars (B. RECORBET) constituant l'un des records pour cette partie de la zone 1. 1 femelle individualisable par sa voix fut observée à Capitello du 12 au 29 mars 1998.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

A Capitello, 1 du 17 au 25 janvier, puis chiffres élevés de 21 le 23 février et 31 le 25 février 1997, ensuite 1 à 2 du 12 au 25 août ; en hiver à noter 1 le 10 décembre, 6 le 20 décembre, 1 le 21 décembre. Effectifs intéressants au printemps 1998 : 16 le 7 mars, 18 le 8 mars et 21 le 9 mars enfin une donnée tardive 1 couple le 11 mai. De plus, à Capitello 1 le 25 août 1996.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

A Capitello un record de 217 le 30 mars 1996 et 2 le 30 juin 1996. Sur ce même site plusieurs données tardives en 1997 : 1 les 25, 26 et 28 août ; 3 le 29 octobre et 1 le 30 octobre. A noter enfin à Capitello 132 le 8 mars 1998 et 54 le 2 avril 1998 soit un record à cette époque. A Campo dell'Oro 1 mâle noté du 25 au 29 mars 1998 venant régulièrement de Capitello avec des Sarcelles d'été.

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

A Capitello à noter 5 le 20 décembre 1997 et 1 le 28 août 1997 sur ce même site.

**NETTE ROUSSE** *Netta rufina*

Un mâle à Capitello, en mer le 8 mars 1996, part avec des Sarcelles d'été à Caldaniccia puis revient en mars près de Capitello. Seconde donnée micro-régionale.

**FULIGULE MILOUIN** *Aythya ferina*

Capitello, record de 98 le 18 mars 1996, donnée tardive 1 mâle le 15 mai 1996. Aux gravières de Baléone 1 couple « cantonné » puis un mâle du 16 mars au 27 mai 1996. En 1997 on relèvera 1 mâle à Capitello du 25 au 31 juillet, puis de nouveau du 2 au 4 août, à noter 8 le 8 novembre 1997. En 1998 chiffre remarquable de 62 le 17 mars et 49 le 2 avril à Capitello et sur ce même site 1 femelle le 7 mai. A Capitello enfin 1 mâle noté le 22 avril puis observé jusqu'au 26 avril aux gravières de Baléone.

**FULIGULE NYROCA** *Aythya nyroca*

En 1996 à Capitello 1 le 21 avril et 2 le 10 août. Aucun en 1997 mais en 1998 sur ce même site 1 du 23 avril au 1 mai.

**FULIGULE MORILLON** *Aythya fuligula*

Peu fréquent en micro-région. A Capitello en 1996, 2 le 18 mars et le 25 mars, 4 le 3 mars, 1 le 19 octobre. En 1997, aucun cette année. En 1998, aucun au printemps.

**HARLE HUPPE** *Mergus serrator*

A Capitello 2 femelles le 18 mars 1996, puis 1 femelle le 20 novembre 1997 et 2 femelles les 21 et 22 novembre suivant. En 1998, 2 femelles le 24 mars sur ce même site.

**BONDREE APIVORE** *Pernis apivorus*

Capitello, 1 le 3 mai 1996, 6 le 15 mai et 1 le 13 septembre 1996.

**MILAN NOIR** *Milvus migrans*

Très rare en micro-région : 1 à Capitello le 8 mars 1996.

**MILAN ROYAL** *Milvus milvus*

Recrudescence d'observations en micro-région et notamment à Capitello. En 1996 : 1 le 1 mars, 1 le 7 avril, 1 le 11 avril, 1 le 19 avril, 1 le 14 mai, 1 le 13 octobre, 1 le 20 octobre. En 1997 : 1 le 26 janvier, 1 le 23 février, 1 les 5, 9 et 11 mars, 2 les 18 et 30 mars (parade le 18 mars en vol), 1 le 1 mai, 2 les 16 et 25 août, 1 le 31 octobre. En 1998 : 1 le 10 janvier, 1 les 15 et 16 février, 4 le 2 mars, 2 les 5, 6, 7 mars, 1 le 9, 14, 16 et 19 mars, 1 le 4 avril, 1 le 22 avril enfin 1 le 8 mai. L'espèce est présente toute l'année en micro-région, à noter 8 à Capo di Feno le 30 novembre 1996. C'est dans la région s'étendant de Saint Antoine à Pisinale et Capo di Feno qui permet d'observer les plus forts effectifs : 12 le 2 décembre 1997, 12 les 1 et 2 janvier 1998 à Saint Antoine. A Campo dell'Oro le 19 avril 1996 des démonstrations aériennes furent observées, puis de nouveaux indices en 1997 laissaient supposer une reproduction et en 1998 le premier couple nicheur fut découvert : site proche de Caldaniccia.

**BUSARD DES ROSEAUX** *Circus aeruginosus*

Un mâle le 6 avril 1996 à Porticcio (M. DUQUET). A Capitello 1 femelle le 7 décembre 1996 et 1 le 2 juin 1997 puis 8 le 24 mars 1998 (record micro-régional), à Campo Dell'Oro 1 le 29 mars 1997.

**BUSARD CENDRE** *Circus pygargus*

Exceptionnel en micro-région 1 femelle à Capitello le 27 avril 1996 et 1 mâle le 27 avril 1998.

**BUSARD SAINT MARTIN** *Circus cyaneus*

Exceptionnel en micro-région, 1 femelle en hivernage fut observée en 1996/1997 entre le 25 octobre et le 6 février suivant les cas entre Capo di Feno, Saint Antoine puis Campo dell'Oro et à Capitello (elle y fut notée entre le 1 novembre et le 7 décembre 1996) ; puis en 1997 entre le 29 octobre et le 28 novembre une femelle fut observée dans la région de Capo di Feno / Saint Antoine. Elle ne fut pas retrouvée au début de l'année 1998.

**AIGLE BOTTE** *Hieraaetus pennatus*

Nouvelle espèce en micro-région, 1 spécimen phase claire fut observé au posé à Capitello le 22 avril 1998 (sur un piquet puis dissimulé dans le feuillage des arbres) entre 9 h 55 et 10 h 05.

**BUSE VARIABLE** *Buteo buteo*

L'effectif nicheur en micro-région oscille à présent entre 10 et 14 couples nicheurs. A Capitello en 1997 observée jusqu'au 24 juin puis dès le 16 août. A noter sur ce site 5 le 18 mars 1997 et 1 couple nicheur en 1998 près de Capitello.

**AUTOUR DES PALOMBES** *Accipiter gentilis*

Nouvelle espèce à Capitello, 1 immature les 12 et 14 octobre 1997 et un autre le 3 mai 1998.

**EPERVIER D'EUROPE** *Accipiter nisus wolstertorffi*

A Capitello, 1 le 12 septembre 1996 ; en 1997 : 1 le 29 août, 1 le 6 septembre. A noter dans la région comprise entre Capo di Feno et Saint Antoine 1 à 2 en hivernage entre le 12 octobre et le 10 février durant les hivers 1996/1997 et 1997/1998. Aux gravières de Baléone 1 épervier le 31 août 1997.

**BALBUZARD PECHEUR** *Pandion haliaetus*

En 1996, curieuse raréfaction, 1 à Ajaccio le 13 mars, 1 plage d'Agosta le 31 mars. 1 spécimen à Aspretto de fin juillet à septembre (B. RECORBET). A Capitello la même année 1 noté une fois en janvier puis le 20 février, enfin 1 entre le 18 mars et le 24 avril aucune observation avant août. 1 du 24 août au 31 août comme au printemps, il va régulièrement à Aspretto et aux gravières de Baléone, enfin 1 le 12 octobre. En 1997 observation d'1 du 15 avril au 8 mai à Capitello et Baléone, puis 1 du 29 juillet au 12 octobre et à noter 2 le 19 avril 1997 à Pisciatello (B. RECORBET). En 1998, à Capitello 1 le 14 février, puis 1 le 5 mars enfin 1 à 3 en avril et mai avec des parades aériennes entre le 26 avril et le 5 mai (3 les 26 et 28 avril et le 5 mai), puis 1 à 2 aux gravières de Baléone ou à Capitello suivant les cas jusqu'au 24 juin. A noter enfin en 1997, 1 à Baléone le 9 mai, 1 le 25 juillet plage d'Agosta et 1 le 9 septembre près de Porticcio. Capo di Feno 1 le 7 avril 1998.

**FAUCON KOBEZ** *Falco vespertinus*

A Capitello, 1 mâle le 22 avril 1996 et 1 mâle le 23 avril 1996 au marais d'Alzone ( le même ?). 1 femelle près du camping Benista le 1 mai 1997, aucun en 1998. Cette espèce reste toujours peu fréquente.

**FAUCON CRECERELLE** *Falco tinnunculus*

L'effectif nicheur micro-régional est compris entre 15 et 16 couples. A Molini durant la période 1996/1998 dans une ruine (près du site de nidification de la Chouette effraie), chaque année nidifia 1 couple de crecerelle (2 jeunes à l'envol le 16 juillet en 1996).

FAUCON CRECERELLETTE *Falco naumanni*

Espèce beaucoup plus rare : A Capitello 1 mâle le 17 avril et 1 le 22 avril 1996, 1 autre spécimen le 26 avril 1996 aux gravières de Baléone.

FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonorae*

A Capitello 3 le 13 septembre 1996 et 1 le 18 avril 1998. Espèce exceptionnelle.

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius*

Espèce très exceptionnelle. A Capitello 1 le 19 octobre 1996, 1 le 26 mars 1997 et 1 le 3 décembre 1997.

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

Espèce plus régulière à Capitello. En 1996 : 1 le 24 avril, 1 le 30 juin, 1 le 7 juillet (adulte) puis 1 juvénile les 10, 11, 12, 15, 16 et 18 août, 1 adulte les 8, 21, 22 septembre, 1 les 18 et 19 octobre, et 1 le 15 décembre. En 1997, cependant, aucune donnée avant 1 le 11 juillet, puis 1 les 3, 4, 10, 11, 22, 28, 29 et 30 août, 1 le 1 septembre, 1 les 14, 28 et 29 octobre, enfin le 14 décembre. Enfin en 1998 1 les 27 et 30 juin. Sur les autres sites à relever : A Porticcio 1 le 6 avril 1996 (M. DUQUET) et 1 près de ce site le 23 avril suivant. 1 à Suartello le 22 septembre 1996 (B. RECORBET). 1 à Ajaccio du 11 octobre 1996 au 2 janvier 1997. Aux gravières de Baléone en 1997 : 1 le 19 septembre, le 21 septembre et le 30 novembre. A Ajaccio à relever 1 du 26 septembre au 12 décembre 1997.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

A Capitello à noter 1 les 8 et 10 août 1996 puis 1 les 2, 3, et 8 août 1997, de plus 1 le 6 septembre et 1 autre du 20 septembre au 3 octobre 1997. A Baléone 1 le 28 septembre 1997. A Capitello 1 le 7 juin et 1 le 15 juin 1998. Un couple a niché en micro-région en 1998 (région de Baléone (Caldanicia)).

CAÏLLE DES BLES *Coturnix coturnix*

A signaler à Capitello, 1 du 7 au 28 avril 1997 et 1 mâle du 8 mai au 22 juin 1997 puis 1 le 31 octobre 1997. En 1998 1 à 2 entre le 18 mai et le 30 juin.

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa*

Une à Capitello le 23 février 1997 (spécimen échappé de captivité ?).

RALE D'EAU *Rallus aquaticus*

La régression en tant que nicheur, continue, le dernier site important reste le marais de Caldanicia. A Capitello hivernage important en 1995/1996 (record de 20 le 26 janvier 1996, encore 10 le 27 mars 1996), et en 1997/1998 déjà 10 le 13 octobre 1997 puis encore jusqu'à 10 en hivernage.

MAROQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

Première observation au marais d'Alzone 1 le 6 avril 1996. Au marais de Caldanicia 1 à 2 observées entre le 31 mars et le 28 avril 1996 (B. RECORBET). Puis, en 1997 : 1 le 19 janvier à Capitello (date précoce). Caldanicia 1 dans le marais le 30 mars 1998. A Capitello 1 en hivernage du 4 au 19 janvier 1998.

**MARQUETTE POUSSIN** *Porzana parva*

A noter à Capitello 1 du 10 au 15 avril 1996 ; 1 mâle les 1 et 2 juin 1996 sans indice de reproduction ; en 1997 1 femelle les 10 et 11 mars, 1 mâle le 14 et 2 mâles les 15 et 16 mars. Une juvénile les 29 et 31 octobre 1997 alors qu'elle est très rare à l'automne. En 1998, plusieurs séjours plus longs qu'à l'accoutumée dont 1 femelle du 20 mars au 6 avril et 1 mâle du 21 mars au 13 avril. A noter jusqu'à 5 le 30 mars. A Caldaniccia 1 les 12, 13, 14 et 28 avril 1996 (B.RECORBET). A Campo Dell'Oro 1 mâle vu par B. RECORBET les 18 et 29 mars, puis le 13 avril 1996 enfin sur ce site 1 femelle les 30 et 31 mars 1996. En 1997, à Caldaniccia 1 à 2 du 20 mars au 7 avril (B. RECORBET) et 1 à Campo Dell'Oro du 24 au 29 mars 1997 (B. RECORBET). Aux gravières de Baléone 1 femelle du 30 mars au 13 avril 1998, aucune à Caldaniccia en 1998 ; à Campo Dell'Oro 1 mâle du 23 au 30 mars 1998.

**MARQUETTE DE BAILLON** *Porzana pusilla*

1 à Capitello le 27 mars et le 8 avril 1996 ; 1 le 22 mars 1998 sur ce même site.

**POULE SULTANE** *Porphyrio porphyrio*

1 adulte en septembre 1984 aux gravières de Baléone (J.N. LIVRELLI).

**POULE D'EAU** *Gallinula chloropus*

A noter une morte le 5 novembre 1995 près du camping Benista.

**FOULQUE MACROULE** *Fulica atra*

A Capitello, 1 du 10 au 18 avril 1996 et 1 du 15 au 24 août 1996. A Campo dell'Oro 1 du 17 au 22 avril 1996. A Capitello 1 le 16 août 1997 et à relever 20 le 30 octobre 1997 dont 14 en mer près de la plage.

**GRUE CENDREE** *Grus grus*

Espèce exceptionnelle. A Capitello : 3 le 29 octobre 1997, puis 13 le matin suivant le 30 octobre. Le soir du 29 octobre 1997, 60 passent au dessus d'Ajaccio.

**HUITRIER PIE** *Haematopus ostralegus*

A signaler 13 à Aspretto le 17 avril 1997, mais aussi 2 le 5 mai 1998 (B. RECORBET) et à Capitello 16 le 21 avril 1998, et 2 notés à Capitello puis sur la plage de Campo dell'Oro le 17 mars, et 1 à Capitello le 18 mars 1998.

**ECHASSE BLANCHE** *Himantopus himantopus*

Base d'Aspretto 4 le 25 avril 1998 (B. RECORBET). A Capitello , 11 le 13 juin 1998 et 1 du 26 au 29 juin 1998.

**AVOCETTE ELEGANTE** *Recurvirostra avosetta*

A Capitello belle série d'observations en 1998 (N=17 entre le 15 mars et le 16 mai) dont plusieurs relatives à des groupes , 7 le 15 mars , 8 le 21 mars, 15 le 27 mars , 11 le 2 avril.

**OEDICNEME CRIARD** *Burhinus oediconemus*

Espèce exceptionnelle, 1 le 24 octobre 1997 entre Capitello et Campo dell'Oro (vu et entendu) à 6 h 50.

**GLAREOLE A COLLIER** *Glareola pratincola*

A Capitello, 1 passe le 17 avril 1998 et 1 y fut observée du 13 au 16 mai 1998.

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

Seul limicole nicheur en zone 1 : 1 couple aux gravières de Baléone en 1996, 1 couple en 1997, 1 couple en 1998. A Campo dell'Oro 15 le 24 mars 1997 (B. RECORBET). En 1998 à Capitello 1 dès le 4 mars et sur ce site 1 du 3 au 14 juin 1998. A Campo dell'Oro 1 le 8 mars 1998.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

Sur la plage de Campo dell'Oro 1 le 27 septembre 1996.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

1 le 28 avril 1996 aux gravières de Baléone (B. RECORBET).

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

1 à Vignetta le 5 octobre 1996. A Capitello absent au printemps sauf 1 les 26 et 27 mars 1998, à noter en 1997 : 1 le 9 août, réobservé en septembre (1 du 23 au 30), puis 11 le 1 novembre (donnée tardive).

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

A Capitello, 1 le 10 mai 1998, cette espèce semble devenir plus fréquente. A Aspretto, 1 noté par B. RECORBET le 5 mai 1998.

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

A Capitello, 1 tardif le 12 avril 1998.

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*

A Caldaniccia, 2 le 5 avril 1996 (B. RECORBET) et sur ce même site le même observateur à noter 1 le 20 mars 1997. A noter qu'en 1998 à Capitello 2 furent observés du 28 au 30 mars, puis 1 du 10 au 14 avril suivant. A Caldaniccia en 1998 (meilleur site pour cette espèce) 1 à 2 entre le 13 mars et le 30 mars.

BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

Ajaccio (résidence Biancarello) 1 observé le 11 mars 1997, à Campo dell'Oro jusqu'à 19 spécimens en mars 1997 (record dû à B. RECORBET le 15 mars).

BECASSINE DOUBLE *Gallinago media*

A Capitello, deux données en 1998 : 1 le 12 mars et 1 le 13 mai.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

1 immature à Capitello du 26 avril au 14 mai 1998.

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

Toujours aussi exceptionnelle 1 à Capitello le 23 mars 1998, elle fut réobservée à Campo dell'Oro jusqu'au 3 avril 1998. Sur ce même site 2 avaient été notés par B. RECORBET le 8 mars 1997 puis 1 du 10 au 12 mars 1997.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

A Capitello en 1998 série de données remarquables 7 le 29 mars, 2 le 30 mars et en avril : 2 le 1, 13 le 2, 1 le 7, 5 le 19, 1 le 28 et 8 le 29.

**COURLIS CENDRE** *Numenius arquata*

A Capitello, 5 le 8 mars 1998 et record insulaire de 12 le 29 mars 1998.

**BECASSEAU SANDERLING** *Calidris alba*

A Capitello, 3 le 15 mai 1998.

**CHEVALIER ABOYEUR** *Tringa nebularia*

Base d'Aspretto 4 le 25 avril 1998 (B. RECORBET).

**CHEVALIER SYLVAIN** *Tringa glareola*

A Campo dell'Oro, jusqu'à 16 en avril 1996.

**CHEVALIER CUL BLANC** *Tringa ochropus*

2 aux gravières de Baléone le 14 juillet 1996, et 13 le 13 avril 1998 (chiffre remarquable). A Capitello 1 à 3 du 24 au 25 juin 1998.

**CHEVALIER GAMBETTE** *Tringa totanus*

A Capitello, à noter 7 le 5 mai et 8 le 15 mai 1998 et 24 le 18 avril et 1 le 4 juin 1998. A Aspretto 1 le 5 mai 1998 vu par B. RECORBET.

**CHEVALIER ARLEQUIN** *Tringa erythropus*

A Capitello, espèce irrégulière : 1 les 22 et 23 mars 1998.

**CHEVALIER GUIGNETTE** *Actitis hypoleucos*

Aucune reproduction en micro-région. A Capitello 1 en hivernage du 6 au 27 janvier 1998 ; à Aspretto 1 le 25 janvier 1997 (B. RECORBET). A l'Amirauté (port d'Ajaccio) 1 du 2 septembre au 13 novembre 1997 sur ce même site 1 le 25 avril 1996 et 2 en octobre 1996 à Aspretto (B. RECORBET). A l'embouchure du ruisseau d'Agosta : 1 le 6 mai 1998. A Capitello 1 le 28 juin 1998.

**BECASSEAU COCORLI** *Calidris ferruginea*

A Capitello, 42 (dont un vol de 39 à 18 h) le 8 mai 1998.

**BECASSEAU MINUTE** *Calidris minuta*

A Capitello, 16 le 14 mars 1998 et 1 le 2 juin 1998, 1 le 26 avril 1998 à Campo dell'Oro.

**COMBATTANT VARIE** *Philomachus pugnax*

A Capitello une donnée très précoce : 1 le 19 février 1998. A Campo dell'Oro observé à plusieurs reprises (à noter : 7 le 8 mars et 8 le 9 mars 1997).

**VANNEAU HUPPE** *Vanellus vanellus*

A noter 7 le 30 novembre 1997 à Capo di Fenò et hivernage sur ce site encore 11 le 9 janvier 1998 et 9 le 16 janvier 1998. Donnée exceptionnelle : 1 à Capitello le 28 juin 1998.

**TOURNEPIERRE A COLLIER** *Arenaria interpres*

Si rare pendant tant d'années à Capitello, 1 : le 29 avril 1998 et 1 le 13 mai 1998.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

Première donnée certaine pour la Corse, 1 de 18 h 40 à 19 h 45 le 14 avril 1996 à Capitello puis dans le golfe d'Ajaccio.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

Très peu fréquente. A Capitello 1 le 30 mars 1996 et 1 le 19 mai 1998.

GOELAND RAILLEUR *Larus genei*

A Capitello 1 le 15 mars 1996, 7 le 25 mars 1996, 4 le 27 avril 1997 puis 1 immature les 19 et 25 septembre et le 9 octobre toujours à Capitello puis réobservé à plusieurs reprises à Ajaccio dans le port jusqu'au 12 octobre 1997. A Capitello 3 le 10 mai 1998.

GOELAND CENDRE *Larus canus*

A Capitello 1 le 2 janvier 1997 puis réobservé les 15 et 16 février suivant. A Ajaccio, à l'Amirauté 1 le 12 février 1997 (B. RECORBET) et 1 le 3 janvier à Vignetta, le 5 janvier 1997, 2 les 10 et 12 janvier 1997 sur le même site (mais 3 le 7 janvier : B. RECORBET). Un suivant les cas entre Ajaccio et Capitello du 10 décembre 1997 au 6 février 1998. Tous les oiseaux notés portaient un plumage de premier hiver.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*

A Capitello, en 1996 des adultes furent observés : 1 le 23 mars, 1 le 14 avril, 1 le 6 août, 1 le 23 août, 1 le 7 et le 28 septembre et 1 le 16 octobre. En 1997 à Ajaccio (port) 1 noté les 31 mai et 1 juin, 1 le 4 octobre fut observé à Capitello puis le même jour à Ajaccio (peu après). A Capitello record de 7 le 24 mars, 1 le 20 avril, 1 le 3 octobre. En 1998, à Capitello 1 le 8 mars, 1 le 12 mars, 2 le 10 avril et 1 le 12 avril, et 1 le 14 mai. A noter enfin 1 à Caldaniccia *L.f. graellsii* le 7 mars 1998 (B. RECORBET). Toutes les autres données se réfèrent à *L.f. fuscus*.

GOELAND ICHTHYAETE *Larus ichthyaetus*

Nouvelle espèce pour la France : 1 en plumage de deuxième hiver de 6 h 50 à 7 h le 3 novembre 1997 à Capitello.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*

A Capitello, 2 le 30 juin 1996 ; estivage de cette espèce durant l'été 1996 en micro-région. En 1997 1 à 2 à Ajaccio entre le 28 juin et le 7 août (à signaler à Capitello 3 le 29 juin, et l'espèce fut réobservée sur ce site dès le 6 août ; à noter déjà 7 le 17 août). En 1998, à Capitello encore 6 le 14 mai et 1 le 15 mai, puis 1 le 12, le 22 et le 28 juin.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*

216 à Capitello le 23 mars 1996 et alors que l'essentiel du passage pré-nuptial concerne des adultes ou individus de deuxième année, 83 en majorité (1<sup>er</sup> hiver) le 24 avril 1996. A Capitello 1 immature le 28 juillet 1996, à noter 4 le 30 novembre 1996 à Vignetta. En 1997, 1 dans le port (immature) d'Ajaccio le 13 juillet ; à Capitello 130 le 11 mars et record de 340 le 14 mars et 1 immature le 22 mai. En 1998, une immature le 17 mai et 4 le 27 avril 1998. 1 adulte sur la base d'Aspretto le 6 juin 1998 (B. RECORBET).

GOELAND D'AUDOUIN *Larus audouinii*

A Capitello 1 individu bagué vu le 30 mars, 14 avril et 23 juin 1996. L'ancien effectif record de 6 est régulièrement atteint dès 1996 entre mars et août (1996/1998). En 1996 première donnée micro-régionale : 1 le 23 février à Capitello. A Aspretto en 1996 effectif nicheur : 22

couples (B. RECORBET). Les 6 et 14 septembre 1996, un adulte vient dans le champ labour à Capitello se repose et s'y nourrit ( le 6 septembre prise de 3 coléoptères). Première observation d'un juvénile à Capitello : 1 du 28 juillet au 3 août 1996. Dernières données micro-régionales 1 le 3 octobre 1996 (port d'Ajaccio B. RECORBET) et 1 à Capitello le 11 novembre 1996. En 1997 pas de reproduction à Aspretto (B. RECORBET) ; à Capitello noté dès le 23 janvier, record de 15 le 2 juin et 1 dans un champ le 12 septembre, encore 1 le 10 novembre et à noter dernière observation le 20 décembre. En fait ce spécimen restera présent en hivernage et sera réobservé les 12 et 22 janvier 1998 puis en février de manière très occasionnelle, à relever un chiffre remarquable de 12 le 15 mai 1998 et la nidification de 19 couples à Aspretto (à noter 52 sur ce site le 29 mai B. RECORBET). Dès 1997 l'espèce devient plus régulière dans le port (plus qu'en 1996) 1 les 18 et 21 mars, et surtout 1 à 3 durant l'été (1 le 14 mai, 3 le 10 mai et régulièrement du 31 juillet au 12 septembre), il fut également régulier en 1998 dès le mois de mars et encore en été.

#### GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*

A Capitello records de 1000 le 12 septembre 1997, 1700 le 1 novembre 1997 et 2100 le 18 décembre 1997.

#### STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

A noter 3 le 6 mai 1998 à Capitello et 1 sur le même site les 22 et 23 mai 1998, elle va le 23 mai à Baléone (gravières). 1 adulte à Aspretto le 28 mai 1998 (B. RECORBET).

#### STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*

A Aspretto 3 le 27 avril 1996 (B. RECORBET). A Capitello 1 juvénile du 23 au 28 juillet 1996 (le 28 va se nourrir à Baléone) puis à Capitello (toujours) 2 le 16 mai 1997 et 1 baguee le 5 septembre 1997 (T. FOURNET).

#### STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

2 immatures vues à Aspretto (B. RECORBET) durant la seconde quinzaine de juin 1996 et sur le même site 9 le 24 mars 1996. 3 dans le port d'Ajaccio le 17 septembre 1996. En 1997, à Capitello 1 le 2 août et 2 le 13 août (données très précoces), puis l'espèce fut réobservée à partir du 27 septembre. En 1998 à noter sur le site de Capitello 1 à 3 encore en mai, jusqu'au 20 mai et 1 le 6 juin. A Ajaccio à noter 16 le 12 novembre 1997 et 2 dès le 22 septembre. Jusqu'à plus de 20 en hivernage en micro-région (ainsi à relever : outre 12 le 30 novembre 1996 à Ajaccio, et 21 le 25 janvier 1997 en micro-région).

#### STERNE NAINE *Sterna albifrons*

Espèce régulière sous de très faibles effectifs, en 1996 passage exceptionnel : Capitello : 1 le 23 avril, 18 le 24 avril, 6 le 26 avril, 1 le 27 avril et 1 le 1 mai. A noter à Aspretto 2 le 25 avril 1996 (B. RECORBET) et 2 sans doute les mêmes, à Capitello le 25 avril (B. et B. ROCHE). En 1997, à Capitello 1 le 27 avril, 1 le 8 et le 9 mai, 1 le 2 juin. En 1998 à Capitello 1 le 25 avril et 1 le 14 mai suivant.

#### GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

Espèce exceptionnelle : 1 à Capitello le 14 avril 1996 et 1 le 25 mai 1998.

#### GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

A Capitello une donnée exceptionnelle : 1 immature les 1 et 2 juillet 1997 ; 1 le 3 août puis 16 le 25 août, 6 le 29, 12 le 30 et 2 le 31 août.

**GUIFETTE LEUCOPTERE** *Chlidonias leucopterus*

A Capitello à relever 1 le 28 août 1997.

**PETIT PINGOUIN** *Alca torda*

1 près de la plage de Marinella le 24 novembre 1996 vu par B. LEFEUVRE.

**PIGEON BISET** *Columba livia*

Régulier dans les rochers au dessus de Saint Antoine jusqu'à 60 à 80 durant la période novembre 1997 – février 1998 ; à Capo di Feno 40 le 7 novembre et 150 le 1 novembre 1997 sont des mentions exceptionnelles.

**PIGEON COLOMBIN** *Columba oenas*

A Capitello, 4 le 17 octobre, 2 le 19 octobre 1997.

**PIGEON RAMIER** *Columba palumbus*

A Capitello en 1996, 3 le 13 octobre, 1 le 19 octobre, 1700 le 20 octobre entre 7 h 50 et 8 h 20 ; 423 le 2 novembre et 500 le 3 novembre. En 1997 sur ce site, 1 le 8 octobre, 1 le 11 octobre, 13 le 17 octobre, 7 le 19 octobre, 4 le 23 octobre, 3 le 27 octobre et 1 le 30 octobre passage exceptionnel en novembre : 60 le 3 novembre, 6364 entre 7 h 10 et 9 h 10 le 4 novembre (jusqu'à 550 simultanément), 508 le 5 novembre, 1 le 14 novembre, 1 le 20 novembre, 46 le 15 novembre, 1 le 16 novembre et 1 le 26 novembre, enfin 1 le 4 décembre. En 1998 une donnée exceptionnelle : première observation au printemps 1 le 30 avril 1998 à 6h 40. Dans le reste de la micro-région alors que l'espèce est régulière à relever : 5 le 8 décembre 1996 à Baléone, 150 le 19 octobre 1997 à Ajaccio (en vol) et 500 le 20 octobre 1997 passant au dessus de la ville, 250 le 11 novembre 1997 à Capo di Feno (à 9 h) descendant vers le Sud.

**TOURTERELLE TURQUE** *Streptopelia decaocto*

Le mouvement d'expansion a marqué le pas. Des allées et venues sont encore notées entre Porticcio et les hameaux de Porticcio ou entre cette localité et Molini et ses abords durant la période 1996-1998 concernant chaque fois 1 à 3 spécimens. Certaines tourterelles vont jusque vers Pietrosella. A Capitello, jusqu'à 10 le 1 avril 1996 et 15 le 22 novembre 1997, (simultanément), les déplacements (1 à 2) entre N et S ou S et N au dessus de Capitello continuent (6 avril, 15 octobre, 28 mars, 27 mai, 4 octobre en 1996. En 1997 : 4 février, 1 mars, 12 avril, 21 avril, 3 mai, 31 mai (3), 7 juin, 19 juin, 16 août, 28 septembre et 4 octobre ; en 1998 : 8 mars, 14 avril, 14 avril, 6 mai, 10 mai, 11 mai, 14, 18 et 20 mai, 22 mai, 4 juin, 29 juin). En 1996 : 9 le 11 novembre, dernières données le 1 décembre. En 1997 : 1 à 4 en janvier et observations régulières, aucune reproduction (construction de nid) puis abandon (pour quelles raisons ?). 6 le 5 et 5 le 19 octobre 1997, dernière donnée 1 le 14 décembre. A noter que le 4 octobre 1996 une passant à Capitello une va se poser sur un arbre près de la route nationale jouxtant la piste de l'aéroport. A noter 1 mâle chanteur à l'embouchure du Prunelli le 10 avril 1997. A Molini on relèvera des records de 16 le 25 mai 1997, de 17 le 14 mai 1997 et 21 le 17 juillet, le nombre total est d'au moins 70 spécimens en août 1997 (sur ce site). Près du Rotolo 1 le 19 mai 1997 et 1 près du pont de Pisciatello le 12 mai 1996 ; près du camping Benista 1 mâle chante le 6 juillet 1996 (1<sup>er</sup> chant sur ce site) ; 1 le 11 novembre 1997 près de Caldaniccia et 1 chante le 7 avril 1996 près des gravières de Baléone. A l'embranchement de la route de Parata / Capo di Feno où l'espèce est régulière, à noter 6 le 17 septembre 1997, 10 le 26 octobre et 12 le 2 octobre 1997 et record de 34 le 18 décembre 1997. 2 le 13 avril passent d'ouest en est de Campo dell'Oro vers Baléone. 1 près des gravières de Baléone le 22

mai 1998. Elle est présente jusqu'à l'Isollella et ce dès avant le printemps 1996 et 9 (record) sont présentes le 7 octobre 1997 à l'embranchement de la route menant vers Isolella / Cruciata. L'observation sur les pylônes près de la base d'Aspretto et près de l'Hôtel Campo dell'Oro est régulière. Sur le premier des deux sites en 1996 (Aspretto) entre les 4 mars et le 22 septembre (mars N= 2, mai N=1, juin N=2, juillet N=4, août N=8, septembre N=5) puis en 1997 entre le 2 avril et le 30 novembre (avril N=3, mai N=5, juin N=3, juillet N=5, août N=4, septembre N=7, octobre N=8, novembre N=2). En 1998, 2 le 13 juin. Pour le second de ces deux sites (Hotel Campo dell'Oro). En 1996 entre le 19 mars et le 3 novembre (mars N=2, avril N=1, mai N=1, août N=3, septembre N=1, novembre N=1). En 1997 entre le 3 février et le 13 août (février N=1, mars N=3, avril N=3, mai N=2, juin N=1, août N=1). En 1998 entre le 8 mars et le 2 juin (mars N=1, avril N=2, mai N=1, juin N=1). Une près de l'hôtel restaurant le Ranch le 31 mai 1996 ; à Aspretto sur les lampadaires 3 le 2 avril 1996 et 3 le 30 novembre 1997 alors qu'à l'accoutumée 1 ou 2 avaient été notées. Une le 11 mars 1997 va de Campo dell'Oro à Aspretto.

#### TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*

A signaler à Capitello 30 le 14 août 1996 et 40 le 28 avril 1996 ; 10 le 8 mai 1997.

#### CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba ernesti*

Le site de nidification de Molini n'est plus réoccupé depuis 1994 jusqu'en 1997 date d'installation d'un nouveau couple. 1 en vol à Campo dell'Oro le 23 septembre 1996 (B. RECORBET). Des cadavres sont régulièrement trouvés entre Caldaniccia et Campo dell'Oro. A Capitello en 1996 : 1 le 29 mars, 1 le 23 et le 27 juillet. En 1998 : 1 le 29 juin sur le même site. Au Rotolo 1 le 8 septembre 1996 (morte).

#### MARTINET NOIR *Apus apus*

Entre Campo dell'Oro et Molini 10 à 40 (40 le 16 août) entre le 16 et le 21 août 1996, à Capitello 2 le 17 août et 9 le 6 septembre 1996 ; en 1997 sur le site 1 le 9 septembre et en 1998 le 1<sup>er</sup> dès le 25 mars et 6 le 26 mars). A noter également, 4 le 20 août 1997 à Caldaniccia. A Capo di Feno / Pisinale 180 le 20 mai 1998. A Capitello 80 le 15 juin 1998.

#### MARTINET PALE *Apus pallidus*

Recrudescence d'observations : à Capitello en 1996 : 1 le 21 avril, 1 le 24 mai, 2 le 21 juin, 1 le 4 septembre et 1 le 6 septembre ; en 1997 aucun et en 1998 : 1 le 12 avril, 1 le 21 mai et 2 les 22 et 23 mai et 1 le 4 juin. A Ajaccio près de la Citadelle en septembre 1996 B. RECORBET a observé cette espèce à deux reprises.

#### MARTINET ALPIN *Apus melba*

A Capitello 3 le 6 septembre 1996, en 1997 sur ce site on relèvera 1 le 11 juin ; en 1998 : 1 le 1 mai et 2 le 29 mai, mais aussi 1 le 15 juin. A Baléone 1 le 9 mai 1998.

#### ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

1 mort à Capitello le 31 mai 1996. B. RECORBET en note 1 en vol à Campo dell'Oro le 23 septembre 1996 et 1 le 30 août 1996 près de la base d'Aspretto.

#### MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

L'espèce est présente toute l'année à Capitello mais rare en été, 1 les 19 et 24 juin 1997. En micro-région 1 couple nicheur en 1996 et 1997 mais 2 en 1998. 1 le 30 juin 1996 à Campo dell'Oro, 1 à Ajaccio résidence Biancarello le 5 septembre 1996 et 1 dans le port à partir du 17

septembre 1996, 1 le 18 octobre 1996 à Vignetta. A noter de plus, en 1997, à Ajaccio résidence Biancarello 1 du 6 au 8 septembre, 1 à Alzone le 19 août, dans le port d'Ajaccio, le premier dès le 22 septembre. Enfin 1 à 2 à Capitello en juin 1998.

#### GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

Régression en tant que nicheur. En 1996 aux gravières de Baléone 51 le 21 août. A noter en 1997, à Capitello déjà 40 le 31 juillet, 40 le 17 août, 30 le 22 et 35 le 31 août ; en 1997 (toujours) 30 le 1 septembre à Ajaccio (grotte Napoléon) et 50 le 31 août aux gravières de Baléone. A signaler à Ajaccio le 2 juin 1998 à 14 h, 14 passent en vol au dessus du port. A Capitello le 20 mai 1998 un couple visite la tour et pénètre dans les trous pour s'y installer sans succès.

#### ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus*

A Capitello, 1 le 27 avril 1997 et 1 le 1 mai 1998.

#### HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

Régression en micro-région au plan de la reproduction. A Capitello encore 1 le 4 octobre 1996 ; en 1997 à Capo di Feno une reproduction tardive : jeunes non envolés chez un couple en août. En 1998 première donnée à Capitello 1 : le 16 février, seconde donnée : 3 le 11 mars.

#### TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla tchusii*

Record à Capitello 10 le 24 mars 1996, 1 le 27 juillet 1996 (l'espèce n'a pas niché), noté à l'automne, 1 à 2 jusqu'au 17 novembre 1996, régulier en 1997, au printemps puis 1 du 13 au 26 juillet, 1 à 2 du 18 août en novembre, 1 en hivernage encore présent en janvier 1998. En 1998, premier cas de reproduction en micro-région.

#### PIC EPEICHE *Dendrocopos major harterti*

A noter, 1 couple supplémentaire à Ajaccio (résidence Biancarello) depuis le printemps 1995, l'effectif de la région Caldaniccia -gravières de Baléone est passé de 1 à 3 couples. En 1997, 1 à Marina Viva le 28 avril, 1 près du Camping Benista le 18 juillet, 1 le 25 septembre à Suartello. En 1997 régulière toute l'année à Capitello, 1 à 2 furent notés encore en été (un couple ayant niché près du site) les oiseaux furent notés dès le 6 juin ; en 1998 il était encore présent en juin (et ce depuis le début de l'année) avec 1 couple nicheur sur le site. 1 couple nicheur en 1997 et en 1998 au Rotolo (Pisciattello 1 le 8 avril 1998) et au marais d'Alzone 1 le 21 avril 1998.

#### ALOUETTE CALANDRE *Melanocorypha calandra*

Espèce très irrégulière, à Capitello 1 les 23, 24, 25 et 27 avril 1997 puis 1 le 26 mai 1997.

#### ALOUETTE CALANDRELLE *Calendrella brachydactyla*

A Capitello 18 le 29 avril 1996, 2 le 16 juin 1996 ; alors qu'elle est rare à l'automne 1 le 21 août, 1 le 6 septembre, 2 le 7 septembre, 1 les 8 et 13 septembre 1996. En 1997 on relèvera : 1 du 1 au 7 juin sur ce même site, en 1998 à Capitello : 2 le 3 juin 1 le 14 et 2 le 15 juin, à relever : 22 à 29 entre le 28 et le 30 avril (29 le 29 avril) puis 25 le 1 mai et 16 à 31 du 3 au 7 mai, puis 1 le 30 mai. 2 alouettes calandrelles furent observées par CHAMBRIS, AUBRY et GFELLER le 13 avril 1998 près du marais d'Alzone.

#### ALOUETTE LULU *Lulula arborea*

A noter 10 près de Pisinale le 9 janvier 1998.

**ALOUETTE DES CHAMPS** *Alauda arvensis*

Passage très important en mars 1996 à Capitello, du SW (mer) vers le N-NE des groupes de 5 à 50 plus ou moins séparés les uns des autres passaient à faible altitude, tandis que le nombre observé sur le même site oscillait entre 80 et 360 (150 à 200 en moyenne entre le 12 et le 19 mars, 300 du 13 au 17 mars, 250 le 15 mars, 360 le 12 mars). Chiffres records depuis 1982. En tout les passages oscillaient entre 40 et 150 par jour. En avril les effectifs étaient résiduels (au total plusieurs milliers furent observés lors de ce mois de mars 1996). En 1996, à noter encore jusqu'à 50 le 15 novembre sur le même site. En 1997, 1 jusqu'au 30 mai, jusqu'à 67 le 23 novembre ; en hivernage (1997-1998) jusqu'à 60 à 80 en janvier, février et jusqu'à fin mars (80 le 14 février et le 28 mars ainsi que le 12 janvier) toujours à Capitello.

**HIRONDELLE ROUSSELIN** *Hirundo daurica*

A Capitello, 1 le 1 avril 1996 ; en 1997 : 1 le 18, le 19, le 22 et le 23 avril ; en 1998 : 1 le 5 avril réobservée ensuite (le même jour) aux gravières de Baléone, et 1 à Capitello le 16 mai. 1 notée près du pont de Carbuccia le 20 avril 1997 par B. RECORBET.

**HIRONDELLE RUSTIQUE** *Hirundo rustica*

1 à Capitello le 16 février 1998 : donnée très précoce. En 1996 sur ce site 1 du 20 octobre au 1 novembre. 1 trouvée morte à Capitello le 17 avril 1997 portant une bague italienne.

**HIRONDELLE DE ROCHERS** *Ptyonoprogne rupestris*

Irrégulière à Capitello : 3 le 9 mars 1996, 3 le 12 mars, 1 le 17 mars 1996. Aux gravières de Baléone un record de 200 le 3 mars 1996. A Capitello aucune en 1997 et en 1998 : 4 le 13 mars. En 1997 à Saint Antoine 11 à 12 entre le 7 et le 11 novembre. A la Parata, 3 le 5 novembre 1995.

**HIRONDELLE DE RIVAGE** *Riparia riparia*

A noter à Baléone, 1 le 9 juin 1996, à Capitello 1 du 3 au 24 juin 1997 ; puis 1 les 2 et 3 juillet 1997 ( la même ?), 1 le 27 août 1997. En 1998, à Capitello 1 le 5 juin, 2 le 13 et 1 les 14 et 21 juin.

**HIRONDELLE DE FENETRE** *Delichon urbica*

Records à Capitello en 1996 : 250 le 29 août et 300 le 31 août. En 1997 troupes mixtes avec *H. rustica* où à plusieurs reprises l'Hirondelle de fenêtre dominait 600 à 800 (800 le 16 août) entre le 12 et le 23 août, puis 180 à 750 (700 le 16 septembre, 750 le 17 septembre) en septembre.

**PIPIT DE RICHARD** *Anthus richardi*

Seconde donnée en micro-région, 1 à Capitello le 8 mai 1996 et troisième donnée : 1 le 23 octobre 1997.

**PIPIT DES ARBRES** *Anthus trivialis*

A Capitello, à noter, plusieurs observations lors du passage postnuptial en 1996 : 1 le 31 août, 1 les 7, 8, 13 et 27 septembre ; 1 le 22 mai 1997 (donnée tardive).

**PIPIT FARLOUSE** *Anthus pratensis*

A Capitello données précoces 1 : le 27 septembre 1996 et 2 : le 26 septembre 1997. A noter 15 le 6 avril 1996 ; 20 le 12 avril 1998 et donnée tardive 1 le 8 mai 1998.

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

Passage très important en zone 1 en 1996 : à Capitello entre le 18 mars et le 6 mai (*in* BONACCORSI 1997) ; en micro-région à noter à Alzone en 1996 1 le 8 avril, 1 le 11 et 1 (le même ?) le 12 avril ; au marais de Caldaniccia 2 le 9 avril et 1 le 18 avril. A Campo dell'Oro 1 le 13 avril et 1 le 17 avril ; soit entre 1 et 8 en micro-région (8 à Capitello le 6 avril). En 1997 à noter un passage moyen et surtout 1 le 17 octobre alors que cette espèce est très rare à l'automne. En 1998 passage exceptionnellement faible.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*

A Capitello 1 encore le 13 octobre 1996 et 1 le 22 septembre 1997. Sur ce même site 10 le 31 août 1997 (record).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

Faible hivernage en micro-région et notamment à Capitello depuis l'hiver 1994/1995, l'espèce étant plus observée lors des deux passages (désormais moins de 5 en hivernage à Capitello) avec un record de 30 le 13 avril 1996 à Capitello.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*

A Capitello en 1996 1 le 27 juillet, puis observations régulières dès le 14 août ; en 1997, 1 du 4 au 22 juin puis des observations plus tardives (aucune en juillet ni en août). En 1998, en juin 1 du 20 au 29.

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Données tardives à Capitello 1 le 2 juin 1996 et 1 le 30 mai 1998 ; données inter-nuptiales, à noter : 5 à Capitello le 18 octobre 1996 et 1 le 1 novembre 1996. De plus première observation de la sous espèce *m. f. flavissima* 1 mâle le 14 avril 1996 aux gravières de Baléone. A Capitello 16 le 27 août 1997 (effectif important à cette époque, première donnée 1 dès le 12 août). A Ajaccio (résidence Biancarello 12 le 3 septembre 1997).

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

Nicheuse en micro-région entre Caldaniccia et la partie nord des gravières de Baléone : 4 couples en 1996, 2 en 1997 et 1 en 1998. A Capitello à noter encore 1 le 24 avril 1998.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola*

Nouvelle espèce pour la Corse, notée moins de dix fois en France : 1 mâle (premier été) le 11 mai 1996 de 8 h 25 à 8 h 59 à Capitello.

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

Aux gravières de Baléone 2 le 16 novembre 1997 ( donnée exceptionnelle). Noté au pont de Péri au printemps 1998 par B. RECORBET.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris*

Dans les rochers en limite de la zone 1 près de Saint Antoine le plus souvent 1 à 2 (jusqu'à 4 le 5 décembre) entre le 26 novembre et le 9 décembre 1997.

GORGE-BLEUE *Luscinia svecica*

A Caldaniccia 1 le 18 mars 1996 (B. RECORBET) et 1 près de l'anse de Minaccia le 9 avril 1996 (M. DUQUET). En 1997 à Capitello 1 femelle le 28 août, donnée la plus précoce.

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

Rare à Capitello en 1996 : 1 mâle le 6 avril et 1 femelle le 24 avril. En 1997, 1 femelle le 17 avril et 1 mâle les 18, 27 et 28 avril, puis 1 femelle le 1 septembre et 1 mâle en mue le 30 septembre. En 1998, 2 femelles le 19 avril et 1 les 20 et 21 avril. A Capo di Feno donnée exceptionnelle 1 : le 1 novembre 1997 (mâle en plumage de premier hiver).

TARIER D'EUROPE *Saxicola rubetra*

A Capitello 1 du 26 au 30 août et 5 le 31 août 1997.

TRAQUET DU DESERT *Oenanthe deserti*

Seconde donnée insulaire, 1 femelle à Capitello les 7 et 8 septembre 1996.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

A Capitello 1 femelle le 8 novembre 1996, à Ajaccio (port) 1 le 11 octobre 1996, près de l'aéroport de Campo dell'Oro, 1 le 12 octobre 1996 et à Capo di Feno 1 le 1 décembre 1996 constituant une remarquable série d'observations tardives. A Capitello 1 du 21 au 31 août 1997 (données précoces), record de 16 le 23 septembre 1997 sur ce site et 1 jusqu'au 19 novembre 1997.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*

Peu fréquent : 1 à Capitello le 23 mai 1997 (aucun en micro-région ni en 1996, ni en 1998).

MERLE BLEU *Monticola solitarius*

1 aux gravières de Baléone du 15 septembre au 6 octobre 1996, 1 couple nicheur probable à Ajaccio (B. RECORBET).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus alpestris*

Rare en micro-région 1 mâle à Capitello le 12 mars 1996.

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

A Capitello 1 le 4 mars et 2 le 6 mars 1996 ; 1 le 8 mars 1996 au marais de Caldaniccia. A Capitello 1 le 5 janvier 1997 et 6 le même jour à Campo dell'Oro. A Capitello 1 le 5 mars 1998.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

A Capitello 1 le 21 décembre 1997. Espèce rare en micro-région.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

A Capitello 2 à 6 du 1 au 8 mars 1996 (6 le 8 mars), 1 du 20 au 25 mars 1996. Au marais d'Alzone 1 le 8 avril 1996. A Capitello 1 le 5 janvier 1997 et 1 le 10 mars 1997.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

A Capitello 1 le 22 avril 1996 et 1 le 20 avril 1998 ; sur ce même site ; 6 le 3 avril 1998 au marais d'Alzone.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*

Faible passage en 1995, 1996 et 1997 en micro-région : 1 à Capitello le 13 octobre 1996.

**CISTICOLE DES JONCS** *Cisticola juncidis*

Dès 1996 l'espèce est remontée plus haut qu'avant l'impact des vagues de fonds de 1985 et 1986. A noter à Capitello 1 le 3 février 1996 et dernière observation le 13 septembre 1996. Pas d'hivernage en 1996/1997. En 1997 à relever, à Capitello observée entre le 21 mars et le 11 novembre, encore notée à Caldaniccia jusqu'au 30 novembre 1997 (3 spécimens). A noter 1 à Vignetta le 22 mars 1997 et 1 le 26 avril 1997 Péri (bar la Comète).

**LOCUSTELLE TACHETEE** *Locustella naevia*

Rare en micro-région : à Capitello 1 les 17 et 18 avril 1997 ; 1 du 15 au 22 avril 1998. Au marais d'Alzone 1 locustelle sp. le 13 avril 1998 (S. CHAMBRIS ; E. GFELLER et R. AUBRY).

**PHRAGMITE DES JONCS** *Acrocephalus schoenobaenus*

Rare à Caldaniccia 1 le 7 avril 1996 et à Capitello, rare à l'automne 1 le 7 septembre 1996 et 1 le 24 août 1997. A Caldaniccia 1 le 18 avril 1997.

**LUSCINIOLE A MOUSTACHES** *Acrocephalus melanopogon*

Donnée la plus précoce 1 le 30 septembre 1997 à Capitello. Faible hivernage en 1996/1997 et 1997/1998.

**ROUSSEROLLE TURDOIDE** *Acrocephalus arundinaceus*

Aucune reproduction en 1997 en micro-région ni en 1998. A noter qu'en 1996 un seul couple avait niché en zone 1 (gravières de Baléone). A Capitello 1 le 10 août 1996 alors qu'elle est rare à l'automne et 1 le 10 août 1997 puis 1 le 13 septembre 1997. Au marais de Caldaniccia où elle est rare 1 le 31 mars 1998. A Capitello 1 les 17 et 23 juin 1998. Entre 1995 et 1998 très faibles passages.

**HYPOLAIS ICTERINE** *Hippolais icterina*

Rare à Capitello 1 le 28 avril 1996, 1 mâle chanteur le 17 mai 1996, 1 le 14 août 1996. En 1997 : 2 le 11 mai et 1 le 14 mai, 1 le 17 juillet, 1 le 12 septembre, toujours sur le même site. En 1998 à Capitello, 1 le 30 avril et 1 le 13 mai.

**FAUVETTE A LUNETTES** *Sylvia conspicillata*

Très rare en micro-région à Capitello 1 mâle le 18 avril 1996, aucune en 1997 et 1 le 20 mars 1998 (donnée précoce) puis sur ce site 1 juvénile observée le 29 juin 1998 (indice d'une reproduction en zone 1).

**FAUVETTE GRISETTE** *Sylvia communis*

A Capitello 6 le 23 avril 1997 et 1 le 19 août 1997.

**FAUVETTE SARDE** *Sylvia sarda*

A Capitello, 1 notée du 6 au 20 octobre 1996, 1 le 17 avril 1997, puis 1 du 7 au 23 mars 1998 puis 1 du 10 au 14 avril 1998.

**FAUVETTE PITCHOU** *Sylvia undata*

A Capitello espèce exceptionnelle : 1 du 19 septembre au 9 octobre 1997, 1 le 28 mars 1998.

**FAUVETTE PASSERINETTE** *Sylvia cantillans*

A Capitello à relever : 1 le 30 juillet 1997 puis 1 à 4 du 1 au 31 août 1997, en septembre jusqu'à 20 (record le 3 septembre) et dernière donnée le 2 octobre 1997.

**FAUVETTE A TETE NOIRE** *Sylvia atricapilla*

Fort passage migratoire au printemps 1998 en mars ( fin du mois surtout), avril et jusqu'à la mi-mai jusqu'à 30 à 40 spécimens étant observables simultanément.

**FAUVETTE DES JARDINS** *Sylvia borin*

1 à Caldaniccia le 1 octobre 1997 (date tardive).

**POUILLOT VELOCE** *Phylloscopus collybita*

A Capitello, où les effectifs hivernant sont généralement inférieurs à 20 spécimens, 1 mâle chanteur jusqu'au 20 mai 1998 et aux gravières de Baléone 1 mâle le 25 mai 1996 et 1 mâle le 22 mai 1998. Aucune nidification ne fut constatée.

**POUILLOT FITIS** *Phylloscopus trochilus*

A Capitello 1 à 2 du 10 au 27 septembre 1997, 2 le 4 et 1 le 6 octobre 1997 sur le même site. En 1998 il y fut noté à partir du 18 mars (date précoce).

**POUILLOT DE BONELLI** *Phylloscopus bonelli*

Nouvelle espèce à Capitello et seconde donnée depuis 1980 en micro-région : 1 les 23 et 24 avril 1996.

**ROITELET HUPPE** *Regulus regulus interni*

Nouvelle espèce à Capitello : 1 femelle le 1 novembre 1996.

**ROITELET A TRIPLE BANDEAU** *Regulus ignicapillus minor*

Espèce en expansion en micro-région : rare à Capitello désormais présent à la C.C.A.S. En 1996 à Capitello, 1 le 8 mars, 1 chanteur le 18 mars et 1 le 15 juin sans reproduction ; puis 1 le 13 septembre, 1 le 13 octobre ; 1 les 3 et 8 novembre puis 3 le 15 décembre, 1 en hivernage sera observé jusqu'au 18 janvier 1997. En 1997, 1 le 16 avril puis 1 à partir du 17 octobre jusqu'au (sauf 2 les 17 et 18 novembre) puis 26 novembre. En 1998, 1 tout au long des mois de janvier, février, 1 à 2 en mars et en avril, en mai (chants). Ensuite un couple s'est reproduit, les oiseaux étant encore notés en juin.

**GOBE MOUCHE NOIR** *Ficedula hypoleuca*

Rare à Capitello : en 1996 1 mâle le 20 avril ; en 1997 1 mâle le 17 avril, 2 mâles et 3 femelles le 21 avril et 1 femelle le 22 avril (fort passage pré-nuptial en micro-région en 1997). En 1998 1 femelle le 16 avril.

**GOBE MOUCHE GRIS** *Muscicapa striata*

Une donnée précoce : 1 à Porticcio le 6 avril 1996 (M. DUQUET). A noter 16 à Capitello le 28 mai 1998.

**REMIZ PENDULINE** *Remiz pendulinus*

Absence d'hivernage en micro-région de 1995/1996 à 1997/1998 seulement observable au passage à Capitello. En 1996 : 3 le 17 mars, 1 le 18 mars, 2 le 19 et le 23 mars. A l'automne 2 les 19 et 20 octobre, 1 à 2 du 1 au 10 novembre. En 1997 : 1 à 3 du 10 au 15 mars sur ce

même site, puis aucune avant l'automne. 9 le 20 octobre, 5 le 24, 1 le 25, 5 le 28, 3 le 29 et 3 le 30 octobre puis 2 le 3 novembre, 5 le 4 et 3 le 5 novembre. En 1998 enfin 2 à 20 entre le 16 et le 26 mars (20 le 22 mars) et 1 le 10 avril.

#### LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

Un mâle près du pont d'Ucciani le 30 avril 1996 ; 1 mâle à Campo dell'Oro le 5 mai 1996. Un couple nicheur aux gravières de Baléone en 1996. A Capitello lors du passage postnuptial 1 du 14 au 19 août 1996 et à Baléone 2 le 18 et le 25 août 1996. En 1997, à Capitello 1 le 6 juin, 1 les 1 et 3 août. Cette même année aux gravières de Baléone 1 couple nicheur, encore 1 couple et 3 juvéniles le 17 août (l'espèce y avait été notée dès le 18 mai), encore 1 loriot le 7 septembre sur ce site : dernière observation. A Capitello 1 le 6 juin et 1 le 26 juin 1998. Aux gravières de Baléone encore 2 mâles le 8 juin 1998 (un couple en 1998).

#### GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius corsicanus*

Progression des observations à Capitello : 2 le 15 mars 1996, 1 le 8 septembre 1997, 2 le 4 octobre 1997 et 3 le 8 avril 1998.

#### PIE BAVARDE *Pica pica*

Un spécimen très peu farouche (relâché ?) en août 1996 en plaine de Péri (COLONNA).

#### CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*

A Capitello 1 le 22 avril 1996 et 1 le 26 octobre 1997.

#### CORNEILLE NOIRE *Corvus corone corone*

A Capitello 1 le 5 avril 1996 (première donnée en micro-région).

#### GRAND CORBEAU *Corvus corax*

Période d'observation désormais plus longue à Capitello. 1 le 11 août 1996 et 2 le 7 septembre 1996 ; 1 le 27 juillet 1997 puis 1 à 3 entre le 3 et le 30 août, ensuite 1 à 3 dès le 1 septembre, ensuite d'autres données intervinrent jusqu'à la fin du mois (7 le 1 mars 1997). Aux alentours de la décharge de Saint Antoine régulièrement jusqu'à plusieurs dizaines d'oiseaux (maxima 50 à 70). En 1998 à Capitello 1 du 14 au 17 juin 1998.

#### SPREO SUPERBE *Spreo superbus*

Un adulte de cette espèce africaine, le 3 octobre 1996 près de la base d'Aspretto (B. RECORBET), espèce échappée de captivité.

#### PIE GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

Donnée tardive : 1 juvénile à Capitello le 29 octobre 1997.

#### PIE GRIECHE A POITRINE ROSE *Lanius minor*

Nouvelle espèce en micro-région : 1 à Capitello le 26 mai 1997.

#### ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*

Aux gravières de Baléone 200 le 8 décembre 1996 alors qu'il y ait peu fréquent, à Capitello 8000 le 2 janvier et 15000 les 4 et 26 janvier 1997, 6000 le 9 novembre 1997.

ETOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor*

En 1996, 1 couple nicheur au Rotolo (premier cas), 1 à 2 couples à la C.C.A.S. (premier cas), et premier cas de reproduction au pénitencier de Coti Chiavari. En 1997 nidification au centre équestre de Marina Viva ; dès la mi juillet à Ajaccio entre 100 et 200 en dortoir. A Capitello le 17 mai 1998 : 26 oiseaux , visites répétées de la tour génoise 1998 (pas de reproduction dans celle-ci).

SERIN CINI *Serinus serinus*

A noter en hivernage en janvier 1998 jusqu'à 40 (le 8 janvier) et déjà 19 le 16 octobre 1997.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

Nouvelle espèce en micro-région près de la plage de l'Ariadne 1 le 17 août 1997 (immature), 1 autre le 25 septembre 1997 près de Saint Antoine ( pinèdes) et à Suartello, B. RECORBET en observa 8 le 19 août 1997 (toujours femelles ou immatures).

CAPUCIN DE L'INDE *Lonchura malacca*

Un spécimen à Capitello noté entre le 15 septembre et le 6 novembre 1997 (échappé de captivité d'origine asiatique).

ASTRILD CENDRE *Estrilda troglodytes*

1 à Capitello du 2 au 6 octobre 1997 (échappé de captivité d'origine africaine).

MOINEAU CISALPIN *Passer italiae*

Un spécimen présentant des caractères hybrides *Passer italiae* x *Passer hispaniolensis* a été observé à Capitello entre le 20 mars et le 3 mai 1998.

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*

A Capitello 50 en hivernage en janvier 1998.

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia*

Un couple installé en 1996 à la C.C.A.S., d'où à Capitello 1 observé les 3 mai puis les 8, 14, 15 juin et 9 août 1996. Sur ce site : 1 le 11 novembre 1997. A Ajaccio (résidence Biancarello) 1 le 25 mars 1996. Faible présence en micro-région en 1997/1998.

SERIN DES CANARIES *Serinus canaria*

1 spécimen échappé de captivité à Capitello du 8 au 19 mars 1998.

VENTURON CORSE *Serinus citrinella corsicana*

A Capitello effectifs records en février et mars 1996 (120 le 1 mars, 130 le 8 mars, 90 le 29 mars) encore 30 le 5 avril, puis quelques spécimens encore, 2 le 28 avril 1996, dernière donnée puis 1 couple nicheur avec un jeune pas encore indépendant le 31 mai. Expansion locale de l'espèce (2 couples en 1996, 1 en 1997, 1 en 1998 aux gravières de Baléone). En 1997 à Capitello le dernier le 9 mai, puis première donnée : 1 le 31 août. A noter en 1998, 2 le 11 mai puis encore un couple nicheur sur ce site alors qu'en 1997 aucun n'avait niché à Capitello.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

A Capitello 1 le 5 janvier 1997. Passage et hivernage exceptionnels en 1997/1998 : déjà 1 à Vignetta le 19 septembre (donnée précoce), aux gravières de Baléone déjà 2 le 18 novembre 1997, jusqu'à 20 le 28 novembre suivant, 10 à 15 en hivernage puis observations jusqu'au

printemps et dernière donnée 1 le 1 mai 1998. A Saint Antoine 16 le 2 décembre 1997. A Capitello 1 déjà le 20 octobre 1997, 3 à 40 entre le 14 et le 26 novembre (40 le 14 novembre), 2 à 6 du 5 au 21 décembre 1997, puis 1 à 15 en janvier 1998 (12 le 18 et 15 le 22 janvier) ; en février 5 à 10 (10 le 15 février) puis 1 à 8 en mars et jusqu'à 5 en avril, dernière donnée le 23 avril 1998.

**GROS BEC CASSE NOYAUX** *Coccothraustes coccothraustes*

A Capitello 2 le 8 mars 1996, aucun ni en 1997, ni en 1998. Aux gravières de Baléone 1 le 25 mai 1996 et 1 les 26 avril, 1 mai et 24 mai 1998. A noter 1 couple nicheur au pénitencier de Coti-Chiavari en 1996, 1997 et 1998.

**BRUANT ZIZI** *Emberiza cirlus nigrostriata*

Première donnée précoce à Capitello en 1997 : 1 le 11 août.

**BRUANT ORTOLAN** *Emberiza hortulana*

Espèce peu fréquente entre 1996 et 1998, une seule donnée à Capitello 1 femelle le 28 avril 1997.

**BRUANT DES ROSEAUX** *Emberiza schoeniclus*

A Capitello jusqu'à 16 le 10 novembre 1996, (1 à 6 du 11 au 19 novembre) ; 2 à 3 jusqu'au 15 décembre puis 1 à 2 en janvier 1997, 1 seul jusqu'au 23 février, 1 à 3 jusqu'en mars 1997, 1 mâle encore le 22 avril (hivernage désormais très faible). En 1997 hivernage d'un seul à Capitello jusqu'en décembre puis 1 à 3 en janvier 1998 mais seulement 1 en février 1998.

**BRUANT PROYER** *Miliaria calandra*

A noter 2 en hivernage à Campo dell' Oro en 1997/1998 et 1 à la même époque à Capitello puis 1 à 2 en février 1998 sur ce dernier site.

## REMERCIEMENTS

Ceux-ci vont à J.C. THIBAUT qui a bien voulu relire ce texte, puis à l'ensemble des personnes ayant fourni des observations : R. AUBRY ; S. CHAMBRIS ; COLONNA ; S. DANIELS ; H. DAVIERE ; S. DELOPPE ; P.-J. DUBOIS ; M. DUQUET ; G. FLOHART ; T. FOURNET ; E. GFELLER ; R. JORDAN ; L. LEFEUVRE ; E. LEPOUS ; J.-N. LIVRELLI ; B. RECORBET ; B. et B. ROCHE ; P. SIMEONOV ; G. TERRASSE ; D. TIRMARCHES.

## BIBLIOGRAPHIE

- BONACCORSI G. (1994) Avifaune de la Basse Vallée de la Gravona et du Prunelli *Trav. sci. Parc nat. Reg. et Res. de la Corse* 49 : 1-88.  
 BONACCORSI G. (1998) Complément à l'Avifaune de la Basse Vallée de la Gravona.

## ADDENDA ET ERRATA

Il conviendra d'ajouter aux *errata* évoquées in BONACCORSI 1998 s'agissant de BONACCORSI 1994 *Trav. sci. Parc nat. Reg. et Rés. de la Corse* 49 : 1-88.

- p.19 Lire janvier 1983 et non « 1983 » dans l'article consacré à l'Oie cendrée *Anser anser*.
- p.19 Ajouter à l'article relatif au Flamant rose *Phoenicopterus ruber roseus* un spécimen, suivant les cas était présent à Capitello et Vignetta du 14 au 27 novembre 1993.
- p.25 Lire femelle et non 17 dans l'article consacré à l'Epervier d'Europe *Accipiter nisus wolstertorffi*.
- p.29 Lire femelle et non 17 dans l'article consacré au Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*,
- p.52 Lire nombre d'espèces parasitées au sujet du Coucou gris *Cuculus canorus* et non du Coucou geai.
- p. 59 Lire *Calendrella brachydactyla* et non *Calendrella brachidactyla*.
- p. 71 Lire rousserolle et non rousserole dans le cadre de l'article consacré à la Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*.
- p.72 Lire 1985 et non 1965 dans l'article consacré à l'Hypolais icterine *Hippolais icterina*.
- p.82 Lire *Emberiza cirrus nigrostriata* et non *E.c. migrostriata*.

## ANNEXES

Tableau 1 : Effectifs nicheurs des différentes espèces à Capitello de 1996 et 1998.

Tableau 2 : Données relatives aux limicoles à Capitello en 1996 et 1997.

Tableau 3 : Records d'arrivées de plusieurs espèces à Capitello en 1996.

| Espèces \ Mois                | J  | F  | M  | A  | M  | J | J  | A  | S  | O  | N  | D  | Total |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|-------|
| Huitrier pie                  |    |    | 15 | 11 | 1  |   |    |    |    |    |    |    | 27    |
| Echasse blanche               |    |    | 16 | 11 | 1  | 1 |    | 1  |    |    |    |    | 30    |
| Avocette élégante             |    |    | 6  | 6  | 4  | 9 |    |    |    |    |    |    | 25    |
| Oedicneme criard              |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 1  |    |    | 1     |
| Glaréole à collier            |    |    |    |    | 2  |   | 3  |    |    |    |    |    | 5     |
| Petit gravelot                |    | 1  | 31 | 34 | 5  | 1 | 13 | 7  | 20 | 4  |    |    | 116   |
| Grand gravelot                |    |    | 6  | 12 | 19 | 3 |    | 1  | 1  |    |    |    | 42    |
| Gravelot à collier interrompu |    |    | 1  | 6  | 1  |   |    |    | 1  |    |    |    | 9     |
| Pluvier dominicain            |    |    | 1  |    |    |   |    |    |    |    |    |    | 1     |
| Pluvier doré                  | 2  | 1  | 10 | 1  |    |   |    |    | 8  | 2  | 6  | 17 | 47    |
| Pluvier argenté               |    |    |    |    | 5  |   |    |    |    | 16 |    |    | 21    |
| Vanneau huppé                 | 10 | 12 | 19 | 2  |    |   | 1  |    | 3  | 9  | 24 | 6  | 86    |
| Bécasseau sanderling          |    |    |    |    | 2  | 1 |    |    | 1  |    | 2  |    | 6     |
| Bécasseau minute              |    |    | 2  | 9  | 18 | 5 | 28 | 18 | 4  |    |    |    | 84    |
| Bécasseau de temminck         |    |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |    | 1     |
| Bécasseau cocorli             |    |    |    | 2  | 6  |   | 4  | 2  | 5  |    |    |    | 19    |
| Bécasseau variable            |    |    |    |    |    |   |    | 3  | 15 | 13 | 1  |    | 32    |
| Bécasseau falcinelle          |    |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |    | 1     |
| Combattant varié              |    |    | 13 | 25 | 6  |   |    | 2  | 4  | 2  |    |    | 52    |
| Bécassine sourde              |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 2  |    |    | 2     |
| Bécassine des marais          |    | 6  | 32 | 24 | 1  |   |    | 11 | 19 | 24 | 28 | 5  | 150   |
| Bécassine double              |    |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |    | 1     |
| Barge à queue noire           |    | 1  | 4  | 2  |    |   |    |    |    |    |    |    | 7     |
| Barge rousse                  |    |    |    |    |    |   |    |    | 17 |    |    |    | 17    |
| Courtis corlicu               |    |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |    | 1     |
| Courlis cendré                |    |    | 14 | 6  |    |   |    |    |    | 1  |    | 1  | 22    |
| Chevalier arlequin            |    |    |    | 3  | 1  |   |    |    |    |    |    |    | 4     |
| Chevalier gambette            |    |    | 7  | 15 | 10 | 5 | 1  | 2  | 7  |    |    |    | 47    |
| Chevalier stagnatile          |    |    |    | 8  |    |   |    |    |    |    |    |    | 8     |
| Chevalier aboyeur             |    |    | 2  | 13 | 4  |   | 1  | 7  | 2  |    |    |    | 29    |
| Chevalier cul blanc           |    |    | 29 | 17 | 4  | 2 | 5  | 9  | 18 |    |    |    | 84    |
| Chevalier sylvain             |    |    | 7  | 37 | 16 |   | 3  | 11 | 7  |    |    |    | 81    |
| Chevalier guignette           |    |    | 5  | 34 | 28 | 3 | 10 | 53 | 34 | 27 | 9  |    | 203   |
| Tournepietre à collier        |    |    |    |    | 1  |   |    | 8  | 3  |    |    |    | 12    |

Tableau 1 : Données mensuelles en 1996 et 1997 relatives aux limicoles à Capitello (30 espèces en 1996 et 30 en 1997) N = 1273

Deux années plus intéressantes que l'année 1995. En 1996 on remarquera l'observation de deux espèces nouvelles pour le site : le Pluvier dominicain *Pluvialis dominica* le 15 mars et le Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* le 28 avril, chacun représentés par un seul spécimen. Pour les espèces peu fréquente on évoquera une Glaréole à collier *Glareola pratincola*, espèce sans doute régulière sous des effectifs ridicules : le 4 mai ; le Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* devenu semble-t-il régulier : 1 du 19 au 25 mai et 1 le 28 septembre ; un Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* les 13 et 14 avril, 2 le 15 et 1 du 16 au 18, puis 1 le 27 avril. Un Tournepietre à collier *Arenaria interpres* les 6, 7 et 8 septembre, un Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* le 28 avril, un Chevalier arlequin *Tringa erythropus* le 8 avril, pour le Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 1 le 12 août et 1 les 5 et 6 octobre, s'agissant de la

Barge à queue noire devenue si rare *Limosa limosa* 1 : le 8 avril et 2 le 14 avril. Pour les autres espèces, il conviendra de mentionner : 1 Bécasseau minute *Calidris minuta* les 29 et 30 mars, 1 les 2 et 3 juin enfin 2 le 8 juin, 4 le 3 août et 1 le 5 octobre ; pour le Courlis cendré *Numenius arquata* : 5 le 14 avril et 2 le 7 décembre ; au sujet du Vanneau huppé *Vanellus vanellus* 1 le 14 juillet, 1 à trois reprises en septembre. Pour l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* 6 le 2 juin et 2 le 21 juin. Pour deux espèces deux records de précocité Petit gravelot *Charadrius dubius* 1 le 20 février (et donnée tardive 1 le 20 septembre) et Grand gravelot *Charadrius hiaticula* 1 le 12 mars (et donnée tardive 1 : le 31 mai à noter 1 du 6 au 20 septembre), pour le Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* jusque là si rare à l'automne 1 le 3 août et 2 le 4 août (et 1 du 1 au 3 juin). Huitrier pie *Haematopus ostralegus* passage remarquable avec 28 données dont 15 en mars, 17 le 20 avril (vus par B. RECORBET). Avocette *Recurvirostra avosetta* 1 du 14 au 16 mai. Combattant varié *Philomachus pugnax* 1 les 4 et 5 octobre et 3 le 14 septembre. Bécasseau variable *Calidris alpina* seulement lors du passage postnuptial 1 le 3 août et 2 le 4 août puis 1 du 12 septembre au 11 octobre ; Pluvier doré *Pluvialis apricaria* passage précoce : 1 à 2 du 7 au 21 septembre puis aucune donnée à l'automne. Alors que 1 avait été noté les 7 et 12 janvier, il fut ensuite réobservé du 23 février au 27 mars et 1 le 14 avril. Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* 1 le 17 mars, 1 du 8 au 27 avril et 1 le 16 mai. Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* une donnée précoce : 1 le 15 mars, à noter à l'automne : 1 du 22 au 29 août, 1 enfin le 22 septembre. Chevalier gambette *Tringa totanus* 1 les 2 et 3 août puis 1 à 2 du 6 au 22 septembre. Chevalier cul blanc *Tringa ochropus* 1 noté le 8 juin et 1 le 14 juillet.

En 1997 on notera sur ce même site : la donnée la plus précoce relative à la Barge à queue noire *Limosa limosa* toujours aussi rare 1 le 24 février (puis quatre données en mars entre le 7 et le 12), au printemps toujours : 16 Echasses blanches *Himantopus himantopus* le 27 avril et donnée remarquable à propos de cette espèce une famille et deux juvéniles le 26 août, 17 Avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta* le 20 avril, à noter 3 le 2 juin et 1 du 3 au 11 juin (qui faisait partie du groupe), et 11 avaient été notées les 14 mars. 21 Chevalier sylvain *Tringa glareola* le 21 avril et 1 du 27 au 31 juillet ; une Bécassine double *Gallinago media* le 12 avril alors que l'espèce n'avait pas été notée en 1996. Un Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* le 22 avril et 12 Huitriers pies *Haematopus ostralegus* le 17 avril ; le Chevalier arlequin *Tringa erythropus* si peu fréquent a été noté 1 : le 17 avril, un autre le 28 avril, enfin le 8 mai. Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* 1 le 8 mai et à l'automne : 1 du 3 au 24 octobre, Vanneau huppé *Vanellus vanellus* passage automne remarquable de 230 le 29 octobre et 120 le 30 octobre ; Glaréole à collier *Glareola pratincola* 1 le 14 mai et surtout de manière encore plus exceptionnelle 1 du 24 au 26 juillet. Bécasseau sanderling *Calidris alba* 2 le 7 mai et 3 le 8 mai, 1 le 2 juin. Tournepierre à collier *Arenaria interpres* si exceptionnel jusque là 1 le 8 mai et 1 à 2 entre le 17 et le 23 août ; Grand gravelot *Charadrius hiaticula* à la suite d'un violent orage qui arrêta plusieurs migrateurs 15 le 2 juin et 1 le 3 juin, 4 le 4 juin, 1 le 18 août et 1 le 21 septembre. Bécasseau minute *Calidris minuta* 1 le 2 juin, 3 le 3 juin et 1 les 4 et 7 juin ; jusqu'à 7 le 25 août (noté entre le 30 juillet et le 10 septembre à noter 4 le 7 septembre) et 1 du 6 au 7 octobre (donnée tardive). Chevalier gambette *Tringa totanus* 1 du 26 juin au 7 juillet, Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* 2 le 25 juillet, 1 les 9, 11, 14 et 29 août et 1 le 10 septembre, Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* plus régulier à présent à l'automne 1 : le 30 juillet, 1 du 3 au 8 septembre, Bécassine des marais *Gallinago gallinago* notée dès le 14 août, Bécasseau variable *Calidris alpina* seulement noté à l'automne : 1 le 9 août, puis 1 du 23 au 29 septembre, 3 le 30 septembre, ensuite 1 du 1 au 17 octobre et 1 le 1 novembre. Chevalier cul blanc *Tringa ochropus* 1 le 28 juin, 1 dès le 6 juillet puis 1 les 10, 19 et 29 juillet ; 1 entre le 1 et le 30 août de manière régulière puis 1 à 4 (4 le 8 septembre) jusqu'au 23 septembre. Barge rousse *Limosa lapponica* absente pendant plusieurs années 1 du 12 au 28 septembre ;

Petit gravelot *Charadrius dubius*, 1 encore observé le 4 octobre (donnée tardive). Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* 1 le 24 octobre : espèce exceptionnelle. Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* 2 le 27 et 1 le 29 octobre (données précoces) ; Courlis cendré *Numenius arquata* : 2 le 30 octobre, Pluvier doré *Pluvialis apricaria* observé à l'automne entre le 29 octobre et le 22 novembre (1 à 3 mais 11 le 19 novembre) puis entre 2 et 4 du 4 au 21 décembre (pas d'observation en janvier 1998). Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* encore 1 le 25 octobre et 1 le 21 novembre et 21 le 9 août. Combattant varié *Philomachus pugnax* 1 les 23 et 24 août.

| Espèces                   |            |
|---------------------------|------------|
| Petit gravelot            | 20 février |
| Grand gravelot            | 12 mars    |
| Chevalier aboyeur         | 15 mars    |
| Guifette moustac          | 14 avril   |
| Huppe fasciée **          | 6 mars     |
| Martinet noir             | 15 mars    |
| Alouette calandrelle      | 7 avril    |
| Hirondelle rustique       | 20 février |
| Hirondelle de fenêtre     | 20 février |
| Hirondelle de rivage      | 20 février |
| Pipit rousseline          | 5 avril    |
| Pipit des arbres          | 30 mars    |
| Pipit à gorge rousse      | 18 mars    |
| Rouge queue à front blanc | 6 avril    |
| Tarier d'Europe           | 15 mars    |
| Traquet motteux           | 15 mars    |
| Rousserolle effarvatte    | 1 avril    |
| Fauvette passerinette *   | 24 mars    |
| Pouillot fitis            | 25 mars    |

Tableau 3 : Records d'arrivées pour 19 espèces à Capitello (passage prénuptial) en 1996.

\* Observation due à Pavel Simeonov.

\*\* à l'exclusion des cas d'hivernage.

| Espèces / Années          | 1996 | 1997 | 1998                    |
|---------------------------|------|------|-------------------------|
| Grébe castagneux          | 2    | 2    | 4                       |
| Poule d'eau               | 11   | 11   | 14                      |
| Râle d'eau                | 4    | 1    | 1                       |
| Buse variable             | 1    | 0    | 0                       |
| Tourterelle des bois      | 2    | 2    | 2                       |
| Guêpier d'Europe          | 5    | 2    | 2                       |
| Pic epeiche               | 0    | 0    | 1                       |
| Torcol fourmilier         | 0    | 0    | 1 (1 <sup>er</sup> cas) |
| Pipit rousseline          | 2    | 2    | 2                       |
| Pie grièche à tête rousse | 1    | 1    | 1                       |
| Pie grièche écorcheur     | 1    | 1    | 1                       |
| Rossignol philomèle       | 7    | 5    | 8                       |
| Tarier pâtre              | 6    | 8    | 8                       |
| Merle noir                | 6    | 9    | 16                      |
| Etourneau unicolore       | 5    | 3    | 9                       |
| Gobe mouche gris          | 4    | 5    | 6                       |
| Hirondelle rustique       | 3    | 4    | 3                       |
| Troglodyte mignon         | 2    | 1    | 1                       |
| Cisticole des joncs       | 3    | 4    | 2                       |
| Rousserolle effarvatte    | 12   | 14   | 16                      |
| Rouge gorge               | 0    | 3    | 0*                      |
| Fauvette à tête noire     | 4    | 5    | 5                       |
| Fauvette mélanocéphale    | 16   | 13   | 17                      |
| Bouscarle de Cetti        | 10   | 15   | 19                      |
| Bruant zizi               | 1    | 0    | 2                       |
| Verdier d'Europe          | 3    | 3    | 4                       |
| Serin cini                | 2    | 2    | 2                       |
| Pinson des arbres         | 2    | 3    | 3                       |
| Venturon Corse            | 1    | 0    | 1                       |
| Corneille mantelée        | 4    | 4    | 4                       |
| Mésange bleue             | 3    | 2    | 2                       |
| Mésange charbonnière      | 5    | 3    | 4                       |
| Linotte mélodieuse        | 2    | 3    | 3                       |
| Chardonneret élégant      | 4    | 4    | 5                       |
| Mésange à longue queue    | 1    | 2    | 2                       |
| Bruant proyer             | 4    | 3    | 3                       |
| Moineau cisalpin          | 15   | 12   | 14                      |
| Moineau friquet           | 4    | 3    | 3                       |

Tableau 2 : Effectifs des espèces nicheuses à Capitello à Capitello en 1996, 1997 et 1998 (35, 32 et 35 espèces  
1 mâle chanteur sans reproduction



N° ISSN : 0246-1579

Cette revue est publiée et diffusée grâce au concours financier  
de la DIREN Corse  
et de l'Office de l'Environnement de la Corse



OFFICE DE  
L'ENVIRONNEMENT  
DE LA CORSE



DIRECTION RÉGIONALE DE  
L'ENVIRONNEMENT  
CORSE