

PARC



NATUREL REGIONAL DE CORSE

PALAIS LANTIVY - AJACCIO - 20000 CORSE - TÉL : 21.56.54



TRAVAUX SCIENTIFIQUES

1982

Prix : 5F

N°: 1 Vol.: 1



**ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA CORSE**

OBSERVATIONS DES OISEAUX MIGRATEURS ET ESTIVANTS A LA VASIÈRE

DE TAMBOLO BIANCO EN 1981

(Biguglia)

Par D. BRUNSTEIN-ALBERTINI

25 avril 1982

TRAVAIL REALISE PAR LE CLUB ORNITHOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION DES AMIS DU PARC
AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE.

AVANT PROPOS

Comme les deux années précédentes, le Club Ornithologique de l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de la Corse publie la synthèse des observations faites à la vasière de Tambolo Bianco à Biguglia.

Les observations se sont étalées du 1er mars au 23 août 1981. La vasière a régulièrement été visitée, de début mars à début juin ce qui nous a permis d'amasser un nombre important de notes.

Malheureusement les observations furent rares lors des mois de juillet et d'août, trop peu de visites ayant été effectuées.

Observateurs :

F. BOUVET, M. et D. BRUNSTEIN-ALBERTINI,
M.-C. GALETTI, I. GUYOT, D. MIEGE, T. ROSSI, J. SIGWALT,
J.-C. THIBAUT, Y. THONNERIEUX et J.-M. VUILLAMIER.

LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES RENCONTREES

Ardeidae

<u>Ixobrychus minutus</u>	Butor blongios
<u>Nycticorax nycticorax</u>	Héron bihoreau
<u>Ardeola ralloïdes</u>	Héron crabier
<u>Egretta garzetta</u>	Aigrette garzette
<u>Ardea cinerea</u>	Héron cendré
<u>Ardea purpurea</u>	Héron pourpré

Threskiornithidae

<u>Plegadis falcinellus</u>	Ibis falcinelle
-----------------------------	-----------------

Anatidae

<u>Anas penelope</u>	Canard siffleur
<u>Anas crecca</u>	Sarcelle d'hiver
<u>Anas platyrhynchos</u>	Canard colvert
<u>Anas acuta</u>	Canard pilet
<u>Anas querquedula</u>	Sarcelle d'été
<u>Anas clypeata</u>	Canard souchet

Haematopodidae

<u>Haematopus ostralegus</u>	Huitrier-pie
------------------------------	--------------

Recurvirostridae

<u>Himantopus himantopus</u>	Echasse blanche
<u>Recurvirostra avosetta</u>	Avocette

Charadriidae

<u>Charadrius dubius</u>	Petit gravelot
<u>Charadrius hiaticula</u>	Grand gravelot
<u>Charadrius alexandrinus</u>	Gravelot à collier interrompu

.../...

Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola

Pluvier doré
Pluvier argenté

Calidrinidae

Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Philomachus pugnax

Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau cocorli
Bécasseau variable
Combattant

Gallinaginae

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Tringinae

Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos

Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis cendré
Courlis corlieu
Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier stagnatile
Chevalier aboyeur
Chevalier cul-blanc
Chevalier sylvain
Chevalier guignette

Arenariinae

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Laridae

Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus genei

Mouette melanocéphale
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Goéland railleur

.../...

Larus audouini

Goéland d'Audouin

Larus fuscus

Goéland brun

Larus cachinnans

Goéland leucophée

Sternidae

Chlidonias hybrida

Guifette moustac

Chlidonias niger

Guifette noire

ESPECES RENCONTREES

Ixobrycus minutus Butor blongios

Ce petit héron est noté le 24 avril, 1 ind.

Nycticorax nycticorax Héron bihoreau

Noté par deux fois à la vasière, 2 individus le 25 avril, 1 le 3 mai.

Ardeola ralloïdes Héron crabier

Ce migrateur peu abondant ^{en Corse} est noté par deux fois : 1 ind. le 12/04, 2 ind. le 21/04.

Egretta garzetta Aigrette garzette

Cette espèce a été observée très régulièrement à la vasière, dès fin mars, bien qu'en nombre n'excédant jamais 6 individus.

Ardea cinerea Héron cendré

Cet oiseau est noté régulièrement pendant toute la période observée. Il est à noter que sa migration est possible à l'étang.

Ardea purpurea Héron pourpré

Ce héron a été peu observé à Tambolo Bianco, probablement en raison de la superficie limitée des roselières de l'étang (1 ind. les 21/03 et 3/05, 1 imm. le 10/07).

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle

1 individu est observé, survolant la vasière le 3 avril.

Anas penelope Canard siffleur

Observé régulièrement aux mois de mars et d'avril, il disparaît le 3 mai (1 couple). Le groupe le plus important est noté les 12 et 14 avril (30 ind.).

Anas crecca Sarcelle d'hiver

1 mâle est observé le 12 avril.

Anas acuta Canard pilet

1 mâle est noté les 14 et 21 avril.

.../...

Anas platyrhynchos Canard colvert

Observé en petit nombre (sauf le 3/05 : 20 mâles) tout au long du printemps et de l'été. Il est à remarquer l'observation le 7/08 d'une femelle accompagnée de sept jeunes.

Anas querquedula Sarcelle d'été

Cet oiseau est noté tout au long des mois de mars, avril et début mai. Le plus fort passage signalé est vu les 12 et 14 avril (60 ind.). Elle ne sera plus observée après le 3 mai.

Anas clypeata Canard souchet

Quelques individus les 14 (2 mâles et 3 femelles) et 19 mars.

Haematopus ostralegus Huitrier-pie

Cet oiseau est observé régulièrement tout au long des mois de mars et avril (1 ind. les 19 et 21/03, 2 ind. le 22, 1 les 24, 25, 27, 28/04). ; 1 ind. reste stationné les 1, 2, 3, 6 et 9 mai);

Himantopus himantopus Echasse blanche

Observée à partir de début avril, elle disparaît fin mai (3 ind. le 12/04, 2 le 24, 4 le 27, 2 ind. le 1er/05, 2 femelles et 2 mâles le 20 mai).

Recurvirostra avosetta Avocette

Par 5 fois cette espèce a été observée à la vasière cette année (1 ind. les 21 et 22/03, 1 ind. le 28, 2 ind. le 28/05 et 3 ind. le 10/08).

Charadrius dubius Petit gravelot

Comme les années précédentes, cette espèce a peu été signalée à Tambolo Bianco. (5 ind. le 27/04, 1 ind. le 28, 6 ind. le 10/07, 1 ind. le 10/08 et 1 juv. le 11/08).

Charadrius hiaticula Grand gravelot

Cette espèce est très régulière lors de sa migration en Corse ; nous remarquerons le plus fort passage début mai (20 à 30 ind.). (2 ind. les 14 et 21/03, 8 le 28, 6 ind. le 20/04, 1 ind. le 21, 15 ind. le 28, 20 le 1er/05, 30 le 2, 20 le 3, 6 le 6, 20 ind. le 9, 5 le 14/05, 10 le 17, 6 le 20 et 1 ind. le 28/05).

Charadrius alexandrius Gravelot à collier interrompu

Malgré une migration régulière, il a peu été noté et, en nombre restreint. (1 ind. le 1/05, 2 le 28, 1 ind. le 3/07, 1 ind. le 10/08).

.../...

Pluvialis apricaria Pluvier doré

Une observation d'un individu en mue est signalée le 2/05.

Pluvialis squatarola Pluvier argenté

Il n'a été observé qu'au mois de mai et en nombre assez limité malgré la régularité de sa migration (1 ind. en plumage d'hiver les 17, 20 et 22, un autre en plumage d'été le 28).

Calidris canutus Bécasseau maubèche

1 ind. (en mue) de ce bécasseau rare en Corse, est noté les 2, 3 et 6 mai.

Calidris alba Bécasseau sanderling

1 individu est signalé le 6/05.

Calidris minuta Bécasseau minute

Ce migrateur régulier est vu tout au long de la période, à partir de début avril. Le passage le plus important est noté début mai.

(3 ind. le 14/04, 1 ind. le 26, 3 ind. le 28, 25 ind. le 1er/05, 30 le 2, 20 le 3, 10 le 6, aucun le 14, 20 le 9, 6 le 17, 13 le 20, 5 le 22, 4 le 28; 16 ind. le 10/08, 2 ind. le 11/08).

Calidris ferruginea Bécasseau cocorli

Ce bécasseau, fréquent à la vasière, est noté régulièrement à partir de fin avril. Les concentrations les plus importantes sont relevées mi mai.

(3 ind. le 25/04, 15 le 27, 5 le 28, 6 le 1er/05, 20 le 2, 10 le 3, 7 le 6, 30 ind. le 9, 10 le 14 et le 17, 19 le 22, 2 ind. le 28, 3 ind. le 10/08, 6 ind. le 11/08).

Calidris alpina Bécasseau variable

Cet oiseau n'a été observé que deux fois. (1 ind. les 9/05 et 11/08).

Philomachus pugnax Combattant

Dès fin mars cette espèce est régulièrement vue jusqu'au début mai où elle disparaît. Le plus gros passage est signalé les 12 et 14 avril : 100 individus environ (7 ind. le 21/03, 5 le 22, 100 les 12 et 14/04, 20 ind. le 20, 15 le 24, 10 le 25, 4 le 26, 6 le 28, 3 ind. le 2/05, et 2 ind. le 3/05).

.../...

Gallinago gallinago Bécassine des marais

Cet oiseau est noté à 5 reprises à la vasière au cours des mois de mars et avril (1 ind. les 12/03 et 12/04, 2 ind. le 14/04, 1 ind. les 24 et 25/04).

Limosa limosa Barge à queue noire

Cette espèce est observée régulièrement à la vasière; elle stationne habituellement quelques jours lors de son passage (17 ind. les 10 et 11/03, 16 puis 21 ind. le 14, 10 ind. le 21, 8 les 22 et 28, 2 ind. les 14 et 24/04, 4 ind. les 2 et 3/05, 1 ind. les 10 et 11/08).

Limosa lapponica Barge rousse

1 ind. en plumage d'hiver stationne du 3 au 9 mai.

Numenius arquata Courlis cendré

Un individu est noté le 3 avril.

Numenius phaeopus Courlis corlieu

1 ind. est observé le 3 avril et un autre le 11 août.

Tringa erythropus Chevalier arlequin

1 ind. est noté les 21 et 28 avril.

Tringa totanus Chevalier gambette

Ce chevalier est noté régulièrement tout au long de la migration, mais en nombre n'excédant jamais la dizaine (1 ind. les 15 et 19/03, 5 les 22 et 28, 3 ind. le 3/04, 6 ind. le 21, 5 le 24, 3 le 25, 1 le 26, 5 le 27, 7 le 28, 6 ind. le 1er/05, 2 ind. le 2, 6 les 6 et 9, 4 le 14, 10 le 10/07, 7 le 10/08, et 5 le 11/08).

Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile

Ce chevalier rare a été signalé par deux fois au mois d'août. 2 ind. le 11 et 1 le 23.

Tringa nebularia Chevalier aboyeur

Cet oiseau régulier est signalé fréquemment mais par unité seulement (1 ind. le 3/04, 5 le 12, 2 le 14, 10 le 21, 5 le 25, 2 le 27, 1 ind. le 28/05, 1 ind. le 10/08, 3 ind. le 11/08).

.../...

Tringa ochropus Chevalier cul-blanc

1 ind. est observé le 21 avril.

Tringa glareola Chevalier sylvain

Ce chevalier a été peu signalé, bien qu'il soit régulier d'habitude (1 ind. les 1, 9/05 et 10/07, 4 ind. le 10/08).

Actitis hypoleucos Chevalier guignette

Observé régulièrement à partir de fin avril en nombre restreint (1 ind. le 24/04, 3 ind. les 25, 28 et 6/05, 2 le 14/05, 3 ind. le 10/08, et 2 ind. le 11/08).

Arenaria interpres Tournepietre à collier

1 ind. a stationné à la vasière du 1er au 9 mai.

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale

1 imm. est signalé le 27 avril.

Larus minutus Mouette pygmée

1 imm est observé le 26/04 et un autre les 6/05 et 9/05.

Larus ridibundus Mouette rieuse

Cette mouette est observée tout au long de la période au nombre de quelques dizaines. Le plus fort passage était en mars (10 ind. le 1/03, 1.000 ind. le 10/03, 300 ind. le 14/03 et 21/03, 100 le 22, 20 les 12 et 14/04, 30 le 21, 10 le 24, 6 le 25, 20 le 26, 50 le 27, 20 le 28, 10 le 1er/05, 20 les 2, 3 et 6/05, 10 le 9, 7 le 14 et quelques dizaines les 10 et 11/08).

Larus genei Goéland railleur

C'est la première observation à Tambolo Bianco de cette espèce rare en Corse (1 ind. adulte le 11/08).

Larus audouini Goéland d'Audouin

1 ad. et 1 imm. sont notés le 11/08.

Larus fuscus Goéland brun

1 ind. de la forme L. f. fuscus est noté le 13/06.

.../...

Larus cachinnans Goéland leucophée

Cette espèce est notée tout au long des observations.

(10 ind. le 1er/03, 100 ind. le 10, 50 le 14, 100 les 21 et 22, 10 le 12/04, 100 le 21, 3 le 24, 10 le 25, 3 le 26, 10 le 28, 20 le 6/05, 1 le 22, 10 ind. le 13/06, quelques dizaines le 10/08).

Chlidonias hybridus Guifette moustac

2 ind. sont notés le 21/04.

Chlidonias niger Guifette noire

Seulement 1 observation a été faite cette année.

(1 ind. imm. est noté le 3/05).

C O N C L U S I O N

La vasière de Tambolo Bianco reste un endroit privilégié pour l'arrêt et le repos des Larolimicoles en migration. 47 espèces ont été observées cette année. Il est important de souligner la présence d'espèces peu fréquentes sur notre île comme le Chevalier stagnatile, la Guifette moustac et le Goéland railleur. On remarquera toutefois que le passage de printemps fut caractérisé par une faible migration.

L'installation, fin 1981, d'un mirador facilite grandement les observations sur Tambolo Bianco et permet la venue d'un nombre plus grand d'observateurs, de groupes scolaires, etc...

